Cân bằng hóa học

Hóa học · Bài luyện 1 · Dữ liệu mẫu

Biểu thức hằng số cân bằng

Xét phản ứng $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$. Viết biểu thức Kc theo nồng độ cân bằng của các chất.

Nếu $[N_2] = 0{,}20$ mol/L, $[H_2] = 0{,}30$ mol/L và $[NH_3] = 0{,}10$ mol/L, tính giá trị Kc.

Bài giải và ghi chú

Cân bằng hóa học

Hóa học · Bài luyện 2 · Dữ liệu mẫu

Đơn vị của hằng số cân bằng

Xét phản ứng $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$. Tại cân bằng: $[H_2] = [I_2] = 0{,}10$ mol/L và $[HI] = 0{,}80$ mol/L. Tính Kc.

Dùng quy ước biểu thức nồng độ trong bài tập phổ thông, xét đơn vị suy ra của Kc. Phân biệt với hằng số nhiệt động dùng hoạt độ không thứ nguyên.

Bài giải và ghi chú

Cân bằng hóa học

Hóa học · Bài luyện 3 · Dữ liệu mẫu

Sự chuyển dịch cân bằng

Xét cân bằng $2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$, chiều thuận tỏa nhiệt. Dự đoán chiều chuyển dịch khi hạ nhiệt độ.

Dự đoán chiều chuyển dịch khi giảm thể tích ở nhiệt độ không đổi. Phân biệt thay đổi Kc và thay đổi thành phần cân bằng.

Bài giải và ghi chú