

定义 设 X 和 Y 为二集合且 $f: X \rightarrow Y$ 。

- (1) 若有 $g: Y \rightarrow X$ 使 $g \circ f = I_X$ ，则称 f 为左可逆的，
并称 g 为 f 的一个左逆函数，简称左逆。
- (2) 若有 $g: Y \rightarrow X$ 使 $f \circ g = I_Y$ ，则称 f 为右可逆的，
并称 g 为 f 的一个右逆函数，简称右逆。
- (3) 若有 $g: Y \rightarrow X$ 使 $g \circ f = I_X$ 且 $f \circ g = I_Y$ ，则称 f 为可逆的，
并称 g 为 f 的一个逆函数，简称逆。


定理 设 X 和 Y 为二集合且 $X \neq \emptyset$ 。若 $f: X \rightarrow Y$ ，则下列条件等价：

- (1) f 为内射；
- (2) $f: X \rightarrow Y$ 为左可逆
- (3) f 可左消去，即对任意集合 Z 及任意的 $g: Z \rightarrow X$ 和 $h: Z \rightarrow X$ ，当 $f \circ g = f \circ h$ 时，皆有 $g = h$ 。

定理: 设 X 和 Y 为二集合, 若 $f: X \rightarrow Y$, 则下列条件等价:

- (1) f 为满射;
- (2) f 右可逆;
- (3) f 可右消去, 即对任意集合 Z 及任意的 $g: Y \rightarrow Z$ 和 $h: Y \rightarrow Z$, 当 $g \circ f = h \circ f$ 时, 皆有 $g = h$ 。

证明: (1) \rightarrow (2) 若 f 为满射, 则对任意的 $b \in Y$, 有 $a \in X$, 使得 $b = f(a)$, 即 $f^{-1}[\{b\}] \neq \emptyset$ 。



如下定义函数 $g: Y \rightarrow X$, 使得对任意的 $b \in Y$, 任取 $x_b \in f^{-1}[\{b\}]$, 定义 $g(b) = x_b$ 。

则有对任意的 $b \in Y$, $(f \circ g)(b) = f \circ (g(b)) = f(x_b) = b$ 。

因此 $f \circ g = I_Y$, 从而 f 是右可逆。

定理: 设 X 和 Y 为二集合, 若 $f: X \rightarrow Y$, 则下列条件等价:

(1) f 为满射;

(2) f 右可逆;

(3) f 可右消去, 即对任意集合 Z 及任意的 $g: Y \rightarrow Z$ 和 $h: Y \rightarrow Z$, 当 $g \circ f = h \circ f$ 时, 皆有 $g = h$ 。

证明: (2) \rightarrow (3) 若 f 右可逆, 则存在 $f': Y \rightarrow X$, 使得

$$f \circ f' = I_Y.$$

又由 $g \circ f = h \circ f$, 得

$$g = g \circ (f \circ f') = (g \circ f) \circ f' = (h \circ f) \circ f' = h \circ (f \circ f') = h.$$

定理: 设 X 和 Y 为二集合, 若 $f: X \rightarrow Y$, 则下列条件等价:

(1) f 为满射;

(2) f 右可逆;

(3) f 可右消去, 即对任意集合 Z 及任意的 $g: Y \rightarrow Z$ 和 $h: Y \rightarrow Z$, 当 $g \circ f = h \circ f$ 时, 皆有 $g = h$ 。

证明: (3) \rightarrow (1) 假设 f 不是满射, 则存在 $b \in Y$, 使得 $b \notin f[X]$ 。

(1) 若 $X = \emptyset$, 则由 $f: X \rightarrow Y$, 可知 $f = \emptyset$. 令 $Z = \{1, 2\}$, 且

$g: Y \rightarrow Z$, 满足 $g(y) = 1$, $h: Y \rightarrow Z$, 满足 $h(y) = 2$ 。

此时, $g \neq h$, 但 $g \circ f = h \circ f = \emptyset$, 与(3)矛盾。

(2) 若 $X \neq \emptyset$, 则有 $f[X] \neq \emptyset$. 任取 $b' \in f[X]$, 显然有 $b \neq b'$ 。

定义 $h: Y \rightarrow X$, 满足 $h(y) = \begin{cases} y, & y \in Y, y \neq b \\ b', & y = b \end{cases}$, 有 $h \neq I_Y$, 且

$h \circ f = I_Y \circ f$, 与(3)矛盾。

综上所述, f 为满射。

定理: 设 X 和 Y 为二集合, 若 $f: X \rightarrow Y$ 既是左可逆的, 又是右可逆的, 则 f 是可逆的, 且 f 的左逆和右逆都等于 f 的唯一的逆。

证明: 设 $g_1: Y \rightarrow X$, $g_2: Y \rightarrow X$ 分别是 f 的左逆与右逆, 即 $g_1 \circ f = I_X$, $f \circ g_2 = I_Y$ 。

则 $g_1 = g_1 \circ I_Y = g_1 \circ (f \circ g_2) = (g_1 \circ f) \circ g_2 = I_X \circ g_2 = g_2$ 。

因此, g_1 是 f 的逆。

下面证明唯一性。假设 g' 是 f 的逆, 即 $g' \circ f = I_X$, $f \circ g' = I_Y$ 。

同理可证 $g_1 = g'$ (略)。

定义: 设 X 和 Y 为二集合。若 $f: X \rightarrow Y$ 为可逆的, 则 f 的逆函数用 f^{-1} 表示。

定理：若 X 和 Y 为二集合 且 $f:X \rightarrow Y$, 则下列条件等价：

- (1) f 是双射；
- (2) f 既是左可逆的，又是右可逆的；
- (3) f 是可逆的；
- (4) f 的逆关系 f^{-1} 即为 f 的逆函数。

证明：(1) \rightarrow (2)，(2) \rightarrow (3)都可由前面的定理直接得到。

(3) \rightarrow (4) 若 f 是可逆的，则存在逆 $f^{-1}: Y \rightarrow X$, 使得

$f \circ f^{-1} = I_Y$, 且 $f^{-1} \circ f = I_X$ 。

因此 f 是双射。则其逆关系也是双射，即为 f 的逆。

(4) \rightarrow (1) 因为 f^{-1} 是 f 的逆函数，故 f^{-1} 既是 f 的左逆又是 f 的右逆，即 $f^{-1} \circ f = I_X$, $f \circ f^{-1} = I_Y$ 。

因此 f 既是内射又是满射，即 f 是双射。

定理: 设 X, Y, Z 为三集合。若 $f: X \rightarrow Y$ 和 $g: Y \rightarrow Z$ 都是可逆的, 则 $g \circ f$ 也是可逆的, 且 $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ 。

证明: 因为:

$$\begin{aligned}(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) &= g \circ (f \circ f^{-1}) \circ g^{-1} \\ &= g \circ I_Y \circ g^{-1} = g \circ g^{-1} = I_Z\end{aligned}$$

同理可得 $(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = I_X$

故 $g \circ f$ 是可逆的, 且 $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ 。

例：设 A 为有限集 且 $f: A \rightarrow A$ ，证明：

(1) 若有自然数 $n \geq 1$ 使 $f^n = I_A$ ，则 f 为双射；

(2) 若 f 为双射，则有自然数 $n \geq 1$ 使 $f^n = I_A$ 。

证明：(1) 由 $f^n = I_A$ ，有 $f^{n-1} \circ f = f \circ f^{n-1} = I_A$ ，且 I_A 为双射。

由 $f^{n-1} \circ f = I_A$ 为内射可知 f 为内射，

由 $f \circ f^{n-1} = I_A$ 为满射可知 f 为满射，故 f 为双射。

(2) 因 f 为双射，由归纳法可知：对每个 $n > 0$ ， f^n 均为双射。

设 $n(A)=m$ ，则 A 上的双射有 $m!$ 个，

由抽屉原理可知：在 $f, f^2, f^3, \dots, f^{m!+1}$ 这 $m!+1$ 个

双射中，必有两个相等，不妨设为： $f^j = f^k (1 \leq k < j)$ ，

因为 f 为双射，故有逆函数 f^{-1} ，得

$$f^{j-k} = f^j \circ (f^{-1})^k = f^k \circ (f^{-1})^k = I_A。$$

例：设 $f: A \rightarrow B$ ，且 $n(A) \geq 2$ 。证明 f 是可逆的当且仅当 f 有唯一的左（右）逆。

证明：假设 f 是可逆的，则 f 的逆 f^{-1} 是 f 的唯一的左（右）逆。

假设 f 有唯一的左逆 g ，则 $g \circ f = I_A$ 。

由于 I_A 是内射，得 f 是内射。

下面证明 f 是满射。

（反证法）若 f 不是满射，则存在 $b' \in B$ ，使得 $b' \notin f[A]$ 。

假设 $g(b') = a$ 。由于 $n(A) \geq 2$ ，则一定存在 $a' \in A$ 且 $a' \neq a$ 。

如下定义 $g': B \rightarrow A$ ：对任意的 $b \in B$ ，

$$g'(b) = \begin{cases} g(b), & \text{若 } b \neq b' \\ a', & \text{若 } b = b' \end{cases}$$

对任意的 $a \in A$ ， $g' \circ f(a) = g'(f(a)) = g(f(a)) = a$ 。

因此 $g' \circ f = I_A$ ，即 g' 也是 f 的左逆，矛盾。

故 f 是满射，得 f 是双射，因此 f 可逆。

例：设 f, g, h 都是从 \mathbb{N} 到 \mathbb{N} 的函数，其中 $f(x)=3x$,
 $g(x)=3x+1$, $h(x)=3x+2$ 。找出它们的一个共同左逆。

解：令 $p: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, 满足对任意 $x \in \mathbb{N}$, $p(x) = \lfloor x/3 \rfloor$,
即 $p(x)$ 是小于 $x/3$ 的最大整数。

可证：

$$p \circ f = p \circ g = p \circ h = I_{\mathbb{N}},$$

因此 p 是 f, g, h 的一个共同左逆。

3.4 特征函数

□ 用函数来确定集合与集合间的关系

定义：设 X 为任意集合， f 和 g 都是从 X 到 \mathbf{R} 的函数，

(1) $f \leq g$ 表示对每个 $x \in X$, 皆有 $f(x) \leq g(x)$;

(2) $f + g: X \rightarrow \mathbf{R}$, 对每个 $x \in X$, 皆有 $(f+g)(x)=f(x)+g(x)$, 称 $f+g$ 为 f 和 g 的**和**;

(3) $f - g: X \rightarrow \mathbf{R}$, 对每个 $x \in X$, 皆有 $(f-g)(x)=f(x)-g(x)$, 称 $f-g$ 为 f 和 g 的**差**;

(4) $f * g: X \rightarrow \mathbf{R}$, 对每个 $x \in X$, 皆有 $(f*g)(x)=f(x)*g(x)$, 称 $f*g$ 为 f 和 g 的**积**。

定义 (特征函数) 设 U 是全集, A 是 U 的子集, A 的特征函数 χ_A 为如下定义的从 U 到 \mathbf{R} 的函数:

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{若 } x \in A \\ 0 & \text{若 } x \notin A \end{cases}$$

例: 设 U 是某大学全体学生的集合, A 是计算机学院学生的集合, 求 $\chi_A(x)$ 。

解: 若 x 是计算机学院的学生, 则 $\chi_A(x) = 1$,
若 x 不是计算机学院的学生, 则 $\chi_A(x) = 0$ 。

例: 设 $U = \{a, b, c, d\}$, $A = \{a, c\}$, $\chi_A(x)$ 是特征函数, 求 $\chi_A(x)$ 。

解: $\chi_A(a) = 1$, $\chi_A(b) = 0$, $\chi_A(c) = 1$, $\chi_A(d) = 0$

特征函数的性质： 设 A 与 B 是全集 U 的任意两个子集， 0 表示从 U 到 R 的函数 $\{ \langle x, 0 \rangle \mid x \in U \}$ ， 1 表示从 U 到 R 的函数 $\{ \langle x, 1 \rangle \mid x \in U \}$ 。

(1) $0 \leq \chi_A \leq 1$

(2) $\chi_A = 0$ 当且仅当 $A = \emptyset$

$$\forall x (\chi_A(x) = 0) \Leftrightarrow A = \emptyset$$

(3) $\chi_A = 1$ 当且仅当 $A = U$

$$\forall x (\chi_A(x) = 1) \Leftrightarrow A = U$$

(4) $\chi_A \leq \chi_B$ 当且仅当 $A \subseteq B$

$$\forall x (\chi_A(x) \leq \chi_B(x)) \Leftrightarrow A \subseteq B$$

(5) $\chi_A = \chi_B$ 当且仅当 $A = B$

$$\forall x (\chi_A(x) = \chi_B(x)) \Leftrightarrow A = B$$

(6) $\chi_{\sim A} = 1 - \chi_A$

$$\forall x, \chi_{\sim A}(x) = 1 - \chi_A(x)$$

(7) $\chi_{A \cap B} = \chi_A * \chi_B$

$$\forall x, \chi_{A \cap B}(x) = \chi_A(x) * \chi_B(x)$$

(8) $\chi_{A \cup B} = \chi_A + \chi_B - \chi_A * \chi_B$ $\forall x, \chi_{A \cup B}(x) = \chi_A(x) + \chi_B(x) - \chi_A(x) * \chi_B(x)$

(9) $\chi_{A - B} = \chi_A - \chi_A * \chi_B$ $\forall x, \chi_{A - B}(x) = \chi_A(x) - \chi_A(x) * \chi_B(x)$

(10) $\chi_A * \chi_B = \chi_A$ 当且仅当 $A \subseteq B$ $\forall x (\chi_A(x) * \chi_B(x) = 1 \Leftrightarrow \chi_A(x) = 1)$

(11) $\chi_A * \chi_A = \chi_A$

$$\forall x, \chi_A(x) * \chi_A(x) = \chi_A(x)$$

应用

例：证明 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

证明： $\chi_{A \cap (B \cup C)}$

$$= \chi_A * \chi_{B \cup C}$$

$$= \chi_A * (\chi_B + \chi_C - \chi_{B \cap C})$$

$$= \chi_A * \chi_B + \chi_A * \chi_C - \chi_A * \chi_{B \cap C}$$

$$= \chi_{A \cap B} + \chi_{A \cap C} - \chi_{A \cap (B \cap C)}$$

$$= \chi_{A \cap B} + \chi_{A \cap C} - \chi_{(A \cap B) \cap (A \cap C)}$$

$$= \chi_{(A \cap B) \cup (A \cap C)}$$

例：证明 $\sim\sim A = A$

$$\begin{aligned}\text{证明： } \chi_{\sim\sim A} &= 1 - \chi_{\sim A} \\ &= 1 - (1 - \chi_A) \\ &= \chi_A\end{aligned}$$

故 $\sim\sim A = A$ 。

例：证明 $\sim(A \cup B) = \sim A \cap \sim B$ 。

$$\begin{aligned}\text{证明： } \chi_{\sim(A \cup B)} &= 1 - \chi_{A \cup B} \\ &= 1 - \chi_A - \chi_B + \chi_A * \chi_B\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\chi_{\sim A \cap \sim B} &= \chi_{\sim A} * \chi_{\sim B} \\ &= (1 - \chi_A) * (1 - \chi_B) \\ &= 1 - \chi_A - \chi_B + \chi_A * \chi_B\end{aligned}$$

$$\text{所以 } \chi_{\sim(A \cup B)} = \chi_{\sim A \cap \sim B}$$

$$\text{从而 } \sim(A \cup B) = \sim A \cap \sim B$$

例：用特征函数求 $(A-B) \cup (A-C)=A$ 成立的充分必要条件。

解： $\chi_{(A-B) \cup (A-C)} = \chi_{(A-B)} + \chi_{(A-C)} - \chi_{(A-B) \cap (A-C)}$

$$= \chi_A - \chi_A * \chi_B + \chi_A - \chi_A * \chi_C - \chi_{(A-B)} * \chi_{(A-C)}$$

$$= 2\chi_A - \chi_A * \chi_B - \chi_A * \chi_C$$

$$- (\chi_A - \chi_A * \chi_B) * (\chi_A - \chi_A * \chi_C)$$

$$= 2\chi_A - \chi_A * \chi_B - \chi_A * \chi_C - (\chi_A * \chi_A - \chi_A * \chi_A * \chi_C - \chi_A * \chi_B * \chi_A + \chi_A * \chi_B * \chi_A * \chi_C)$$

$$= \chi_A - \chi_A * \chi_B - \chi_A * \chi_C - \chi_A + \chi_A * \chi_C + \chi_A * \chi_B - \chi_A * \chi_B * \chi_C$$

$$= \chi_A - \chi_A * \chi_B * \chi_C$$

因此 $(A-B) \cup (A-C)=A$ 当且仅当 $\chi_A * \chi_B * \chi_C = 0 = \chi_{A \cap B \cap C}$

当且仅当 $A \cap B \cap C = \emptyset$ 。