

Instrucciones Postoperatorias: Extracciones

Es normal sentir algunas molestias, así como sangrado leve y supuración durante varios días después de una extracción.

Llame de inmediato si presenta estos síntomas

- Sangrado abundante o que aumenta
- Dolor o hinchazón que aumenta o continúa más allá de tres días
- Mal sabor u olor en la boca
- Reacción al medicamento

Llame al (225) 925-2118. En caso de emergencia, incluida la dificultad para respirar, llame al 911 o acuda al servicio de urgencias más cercano.

Es importante que se forme un coágulo de sangre en el sitio de la extracción para detener el sangrado, reducir el dolor y acelerar la cicatrización. Para proteger el coágulo y evitar el dolor de una alveolitis seca, haga lo siguiente.

Primeras 24 horas

- Muerda la gasa con firmeza y cámbiela a medida que se sature, hasta que el sangrado se detenga y la gasa quede de un color rosa muy claro. La sangre mezclada con saliva puede dar la impresión de que hay más sangrado del que realmente hay. El sitio puede supurar hasta por 24 horas.
- Tome el medicamento antes de que se pase la anestesia o según se le haya indicado.
- Para controlar la hinchazón, aplique una bolsa de hielo sobre el área, 20 minutos con hielo y 20 minutos sin hielo.
- NO escupa, no chupe dulces ni use popote o pajilla, y no se enjuague. Si necesita enjuagarse, deje que el agua circule por la boca y caiga sola. NO haga gárgaras ni escupa.
- NO se cepille ni use hilo dental junto al sitio de la extracción.
- NO fume ni use tabaco durante al menos 72 horas, porque retrasa la cicatrización.
- Trate de no estornudar ni toser, así que tenga a la mano su medicamento para la alergia sinusal.
- Límitese a actividades tranquilas.
- Eleve la cabeza con almohadas cuando se acueste para reducir el sangrado.
- NO tome bebidas calientes, carbonatadas ni alcohólicas.
- Evite las comidas calientes o picantes.
- Cuando el entumecimiento haya desaparecido por completo, tome muchos líquidos y coma únicamente alimentos blandos y nutritivos, con cuidado de masticar del lado opuesto.

Después de las primeras 24 horas

- Si se le recetaron antibióticos, continúe tomándolos según las indicaciones aunque todos los síntomas hayan desaparecido.
- Comience a comer normalmente en cuanto le resulte cómodo.
- Reanude el cepillado y el uso de hilo dental de forma habitual, pero sea delicado alrededor del sitio durante aproximadamente una semana.
- Reduzca el dolor o la hinchazón aplicando calor húmedo. Por lo general, la hinchazón baja después de 48 horas.
- Enjuáguese suavemente con agua tibia con sal, una cucharadita de sal por vaso de agua tibia, 2 a 3 veces al día durante una semana después de la extracción.
- El sitio puede tardar de 7 a 12 semanas en sanar por completo.
- Antes de salir del consultorio se le dará una cita de control a las dos semanas. Si tiene alguna pregunta o duda antes de esa fecha, por favor llame al consultorio.

Si tiene preguntas o dudas, llame al (225) 925-2118. Fuera del horario de atención o los fines de semana, deje un mensaje y alguien le devolverá la llamada a la brevedad.

En caso de emergencia médica, incluida la dificultad para respirar, llame al 911 o acuda al servicio de urgencias más cercano.

Revisado el 2026-08-18 por Infintech Designs. Borrador para revisión de la Dra. Luong, aún no aprobado para uso con pacientes.