

Instrucciones Postoperatorias: Frenectomía

Es indispensable que usted

- Mantenga presión firme y continua con gasas directamente sobre el sitio quirúrgico durante 30 minutos.
- Descanse hoy en casa y hable lo menos posible.
- Use las compresas frías durante el resto del día de hoy aunque no tenga hinchazón o esta sea mínima.
- No escupa, no use popote o pajilla y no se cepille los dientes hoy.
- No fume durante al menos 3 días.
- Tome el medicamento para la molestia antes de que se pase la anestesia.

Sangrado

La mayor parte del sangrado habrá disminuido para cuando salga de nuestro consultorio. Que continúe supurando durante 24 horas después de la cirugía es bastante normal. Una vez en casa, si todavía sangra, cambie la gasa por una limpia, relájese y mantenga la cabeza elevada durante 30 minutos. Por lo general, con 2 o 3 cambios es suficiente. No use gasas si el sangrado es mínimo o leve.

Enjuagues bucales

A partir de mañana, enjuáguese la boca cada 4 a 6 horas con agua tibia ligeramente salada (media cucharadita en un vaso grande de agua) durante la semana siguiente. Comience a cepillarse los dientes al día siguiente de la cirugía, evitando las zonas con puntos.

Hinchazón y moretones

La hinchazón y los moretones son frecuentes después de la cirugía y son completamente normales. Por lo general, la hinchazón aumenta durante los primeros 3 a 4 días y luego disminuye gradualmente en los 3 a 7 días siguientes. Aplicar compresas frías o de hielo durante todo el día de la cirugía ayuda mucho a reducir la hinchazón que tendrá. Úselas aunque le parezca que hay poca hinchazón al principio. Mantenga las compresas frías contra el labio durante 30 minutos y luego vuelva a aplicarlas.

Molestia

Después de una cirugía oral puede esperar cierto grado de molestia. Por lo general dura de 2 a 6 días y se siente muy parecido a una sensibilidad con calambres. El grado varía según la dificultad o la extensión de la cirugía. En general, mientras más joven es el paciente, menor es la molestia y más corto el periodo de cicatrización.

Medicamentos

Tome los medicamentos según las indicaciones del frasco. El medicamento recetado debe mantenerlo relativamente cómodo y es mejor tomarlo con líquido o con algo de comida en el estómago. Para molestias leves se puede usar Tylenol o Advil (ibuprofeno). Algunos analgésicos pueden causar mareo; no conduzca.

Alimentación

La mayoría de las personas pueden comenzar a tomar líquidos una vez en casa. Empiece con líquidos claros y avance a sopa (como caldo de pollo o de res) y jugo de fruta o de verdura. La noche de la cirugía está bien comenzar con productos lácteos como malteadas, yogur y budín. Tome tanto líquido como pueda. Debe tomar cantidades pequeñas con frecuencia. Avance en su dieta durante los días siguientes para incluir alimentos más blandos como pasta, huevos revueltos, verduras bien cocidas, pescado y alimentos similares. Evite los popotes o pajillas durante los primeros días, ya que la succión puede provocar sangrado. Evite los alimentos ácidos y picantes, que podrían causar molestia en la herida.

Cuándo llamarnos | (propuesto, pendiente de aprobación de la Dra. Luong)

Llame al consultorio de inmediato si presenta cualquiera de estos síntomas:

- Sangrado abundante o que aumenta, o sangrado que no cede
- Dolor o hinchazón que aumenta o continúa más allá de tres días
- Mal sabor u olor en la boca
- Una reacción a su medicamento
- Fiebre
- **Dificultad para respirar**

Llame al (225) 925-2118. En caso de emergencia, llame al 911 o comuníquese con su servicio de urgencias.

Si tiene preguntas o dudas, llame al (225) 925-2118. Fuera del horario de atención o los fines de semana, deje un mensaje y alguien le devolverá la llamada a la brevedad.

En caso de emergencia médica, incluida la dificultad para respirar, llame al 911 o acuda al servicio de urgencias más cercano.

Revisado el 2026-08-18 por Infintech Designs. Borrador para revisión de la Dra. Luong, aún no aprobado para uso con pacientes.