

Instrucciones Postoperatorias: Frenuloplastia

Después de la cirugía

Los pacientes deben esperar algo de hinchazón leve, dolor o molestia como parte normal del proceso de cicatrización de la herida. El dolor a menudo se controla con analgésicos de venta libre, y los demás síntomas por lo general se resuelven solos en el transcurso de 1 a 2 semanas con el reposo adecuado y la terapia miofuncional. Las complicaciones posibles (aunque muy poco frecuentes) de la frenuloplastia pueden incluir sangrado, dolor, entumecimiento, falla del procedimiento, cicatrices y lesión de estructuras cercanas que puede resultar en disfunción de las glándulas salivales.

Inmediatamente después de la cirugía

1. Sangrado. Es normal presentar algo de supuración con sangre durante los primeros 1 o 2 días. Si el sangrado es constante, coloque una gasa debajo de la lengua para hacer presión y llame a nuestro consultorio al (225) 925-2118, o acuda a su servicio de urgencias local.

2. Hinchazón e inflamación. Es normal presentar algo de hinchazón e inflamación en los primeros 3 a 5 días después de la cirugía. Puede sentir la lengua más grande de lo habitual y que duele más al moverla. Recomendamos usar Tylenol e ibuprofeno según sea necesario para el dolor.

3. Higiene bucal. Por favor continúe cepillándose los dientes como de costumbre. Recomendamos enjuagarse con agua con sal y/o con un enjuague bucal sin alcohol varias veces al día para mantener la herida limpia y reducir el riesgo de infección.

4. Comida y bebida. Durante los primeros días puede resultarle útil consumir alimentos blandos y frescos. Puede resultarle difícil consumir alimentos calientes o picantes, o alimentos que requieran masticar mucho.

5. Suturas. Usamos suturas absorbibles que por lo general se caen o se disuelven solas en un plazo de 3 a 5 días, y a veces entre 1 y 10 días después de la cirugía. A medida que las suturas se caen, un tejido de granulación llenará las heridas abiertas. Si el tejido de granulación crece por encima de la herida, recomendamos cepillar el sitio quirúrgico con un cepillo suave para retirar cualquier residuo. No es necesario retirar por completo el tejido de granulación. A medida que el tejido de granulación cicatriza, comenzará a contraerse alrededor del día 5 a 7. Es entonces cuando los ejercicios de terapia miofuncional se vuelven más importantes.

6. Ejercicios de terapia miofuncional. Recomendamos que descanse los primeros 3 días después del procedimiento y se concentre en reducir el dolor al mínimo. Una vez que el dolor esté bien controlado, lo animamos a hacer movimientos suaves con la lengua, llevándola hacia los dientes delanteros con la boca bien abierta, de lado a lado dentro de la mejilla, alrededor de los dientes y haciendo succión sostenida. Evite sacar la lengua durante los primeros 5 a 7 días y comience estos ejercicios más avanzados solo cuando su terapeuta miofuncional lo haya autorizado. Es sumamente importante realizar los estiramientos y ejercicios tal como se los indique su terapeuta para obtener los mejores resultados posibles.

7. Estiramientos de la herida. Los estiramientos de la herida solo se recomiendan para heridas que se dejan abiertas para cicatrizar por segunda intención, o si el paciente no puede realizar los ejercicios de terapia

miofuncional con la máxima eficacia debido al dolor o a la contracción. Los estiramientos de la herida consisten en envolver la lengua en una toalla de papel o gasa y jalarla hacia afuera, hacia abajo, hacia arriba y hacia cada lado, sosteniendo el estiramiento durante 10 segundos.

8. Frenillos labiales y bucales. Recomendamos que se lo tome con calma los primeros días. Después, pase la lengua por el vestíbulo oral varias veces al día. También recomendamos inflar las mejillas con aire. Después de una semana, puede hacer estiramientos de elevación y masaje manual dentro de la boca.

9. Terapia física. Muchos pacientes se benefician de la terapia física de fascia, la terapia craneosacral, la manipulación osteopática y otras formas de terapia física después de la cirugía, según el caso clínico.

Llame a nuestro consultorio de inmediato si presenta cualquiera de los siguientes

- Dolor intenso que no mejora con el medicamento
- Sangrado que no cede
- Hinchazón intensa en el sitio de la cirugía
- **Dificultad para respirar**
- Fiebre mayor de 101 grados F (unos 38 C)

Llame al (225) 925-2118. En caso de emergencia, llame al 911 o comuníquese con su servicio de urgencias.

Si tiene preguntas o dudas, llame al (225) 925-2118. Fuera del horario de atención o los fines de semana, deje un mensaje y alguien le devolverá la llamada a la brevedad.

En caso de emergencia médica, incluida la dificultad para respirar, llame al 911 o acuda al servicio de urgencias más cercano.

Revisado el 2026-08-18 por Infintech Designs. Borrador para revisión de la Dra. Luong, aún no aprobado para uso con pacientes.