

Instrucciones Postoperatorias: Implantes Dentales

Las primeras 2 semanas después de la cirugía son muy importantes. La cicatrización del hueso alrededor de los implantes tarda de 3 a 6 meses.

Alimentación

Debe seguir una dieta blanda, suave y nutricionalmente balanceada durante 2 a 4 días (o más tiempo si es necesario) después de la cirugía. Debe masticar del lado opuesto al que se colocó el implante durante 2 semanas (si es posible). A medida que el tejido alrededor del implante cicatrice, podrá volver a su alimentación normal.

Hinchazón

La hinchazón después de una cirugía oral es normal y alcanza su punto máximo a las 48 horas. Mantener la cabeza elevada con 2 almohadas al acostarse puede reducir la hinchazón facial. La hinchazón también se puede reducir aplicando compresas frías en la cara (30 minutos con compresa y 30 minutos sin ella) durante las primeras 48 horas. Después de 48 horas, las compresas tibias ayudarán a reducir la hinchazón. Estas deben continuarse (30 minutos con compresa y 30 minutos sin ella) hasta que la hinchazón haya bajado.

Enjuagues

Evite enjuagarse la boca durante 24 horas después de la cirugía, ya que puede alterar el coágulo. Si se le recetó gluconato de clorhexidina (Peridex), empape una gasa y colóquela sobre el sitio quirúrgico durante 1 minuto, dos veces al día, de 7 a 10 días.

Cepillado

Si un implante sobresale a través de la encía, el metal debe mantenerse limpio. Use un aplicador con punta de algodón o un cepillo dental suave y limpie con cuidado el implante y las superficies de los dientes vecinos. Tenga cuidado alrededor de las suturas.

Dentadura postiza o prótesis provisional (flipper)

El día de la cirugía se le darán instrucciones específicas sobre cuándo debe usar su dentadura postiza o prótesis provisional. Las opciones posibles pueden incluir:

- Dejar la dentadura o la prótesis provisional fuera de la boca hasta que se le indique usarla. Debe ajustarse antes de usarla.
- Dejar la dentadura o la prótesis provisional colocada durante 48 horas.
- Usar la dentadura o la prótesis provisional según se le indique.

Las precauciones generales incluyen:

- Si aparecen llagas o hinchazón alrededor o debajo de la dentadura o la prótesis provisional, déjelas fuera de la boca y llame al consultorio.

- Si no puede volver a colocarse la dentadura o la prótesis provisional en la boca, déjelas fuera y llame al consultorio.

Sangrado

Si presenta sangrado abundante, por lo general significa que está apretando las gasas entre los dientes en lugar de que estas hagan presión sobre el área quirúrgica. Intente recolocar gasas limpias de modo que la presión quede directamente sobre el área quirúrgica y que los dientes restantes queden ligeramente separados por la gasa.

Dolor

La mayoría de los procedimientos de cirugía oral vienen acompañados de cierto grado de molestia. Hay muchas buenas estrategias para sobrellevar el proceso. Debe tomar algún tipo de analgésico antes de que se pase el entumecimiento. Los medicamentos de venta libre como el ibuprofeno (Advil o Motrin) o el acetaminofén (Tylenol) son adecuados si no hay alergias, si los ha tolerado en el pasado y si no interfieren con ningún otro medicamento. Para procedimientos más complejos, se puede tomar un narcótico recetado. El narcótico también se puede alternar o tomar junto con el ibuprofeno si no hay alergias y si se ha tolerado en el pasado. Tomar los medicamentos con alimentos disminuirá la probabilidad de náuseas. Recuerde que los analgésicos narcóticos afectan el juicio y los reflejos, por lo que debe evitar conducir y operar maquinaria pesada.

Antibióticos

Es posible que se le receten antibióticos para prevenir infecciones. Si es así, tome todo el medicamento según las indicaciones. Si presenta alguna reacción adversa, como náuseas, sarpullido o picazón, suspenda el medicamento. Un sarpullido o picazón puede indicar una reacción alérgica a un medicamento. Los antihistamínicos (Benadryl) por lo general contrarrestan las ronchas, el sarpullido y la picazón. La hinchazón de los labios o la lengua o la dificultad para respirar pueden representar una reacción alérgica más grave, y debe buscar atención médica de inmediato.

Infección

Aunque se receten antibióticos para prevenir una infección, puede presentarse una infección de la herida un día o varios días después de la cirugía. Puede sospechar una infección si hay un aumento repentino de la hinchazón, dolor pulsátil o un drenaje de mal sabor procedente de la herida. Si sospecha que hay una infección, llame al consultorio lo antes posible.

Tabaco y alcohol

El tabaco y el alcohol deben eliminarse durante las primeras 2 semanas después de la cirugía.

Si tiene preguntas o dudas, llame al (225) 925-2118. Fuera del horario de atención o los fines de semana, deje un mensaje y alguien le devolverá la llamada a la brevedad.

En caso de emergencia médica, incluida la dificultad para respirar, llame al 911 o acuda al servicio de urgencias más cercano.

Revisado el 2026-08-18 por Infintech Designs. Borrador para revisión de la Dra. Luong, aún no aprobado para uso con pacientes.