



---

Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità  
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

---

# Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 49  
Sintesi nazionale

---

Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020)  
Dati relativi alla settimana  
12/4/2021-18/4/2021 (aggiornati al 21/4/2021)

---

Appendice - Tabella 1 – Quadro sintetico con i principali indicatori del monitoraggio e compatibilità con gli Rt puntuali con gli scenari ai sensi del documento "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale", dati al 21 aprile 2021 relativi alla settimana 12/4/2021-18/4/2021

Regione.PA	Nuovi casi segnalati nella settimana	Trend settimanale COVID-19		Stima di Rt-puntuale (calcolato al 07/04/2021)	Dichiarata trasmissione non gestibile in modo efficace con misure locali (zone rosse)	Valutazione della probabilità	Valutazione di impatto	Allerte relative alla resilienza dei servizi sanitari territoriali	Compatibilità Rt sintomi puntuale con gli scenari di trasmissione*	Classificazione complessiva di rischio	Classificazione Alta e/o equiparata ad Alta per 3 o più settimane consecutive
		Casi (Fonte ISS)	Focolai								
Abruzzo	1345	-2.7	-133	0.84 (CI: 0.79-0.89)	No	Bassa	Bassa	0 allerte segnalate	1	Bassa	No
Basilicata	1163	15.4	2	1.24 (CI: 1.08-1.42)	No	Moderata	Bassa	1 allerta segnalata. Ind 21 in aumento e sopra 10%	2	Moderata	No
Calabria	2790	16.6	10	1.03 (CI: 0.96-1.1)	No	Moderata	Alta	1 allerta segnalata. Ind 2.6 in diminuzione e sotto 90%	1	Alta	No
Campania	13156	16.2	133	0.92 (CI: 0.89-0.95)	No	Moderata	Bassa	1 allerta segnalata. Ind 21 in aumento e sopra 10%	1	Moderata	No
Emilia-Romagna	6630	-12.6	-272	0.73 (CI: 0.71-0.75)	No	Bassa	Alta	0 allerte segnalate	1	Moderata	No
FVG	1413	-17.0	-253	0.61 (CI: 0.58-0.64)	No	Bassa	Bassa	0 allerte segnalate	1	Bassa	No
Lazio	8060	-6.9	-67	0.78 (CI: 0.76-0.81)	No	Bassa	Alta	0 allerte segnalate	1	Moderata	No
Liguria	2162	-10.8	-80	0.82 (CI: 0.78-0.86)	No	Bassa	Alta	0 allerte segnalate	1	Moderata	No
Lombardia	14457	-4.4	-1281	0.72 (CI: 0.7-0.73)	No	Bassa	Alta	0 allerte segnalate	1	Moderata	No
Marche	1893	-8.1	-58	0.69 (CI: 0.63-0.75)	No	Bassa	Moderata	1 allerta segnalata. Ind 21 in aumento e sopra 10%	1	Moderata	No
Molise	245	26.6	-2	1.49 (CI: 0.99-2.1)	No	Moderata	Moderata	1 allerta segnalata. Ind 21 in aumento e sopra 5%	1	Moderata ad alta probabilità di progressione	No
Piemonte	7109	-19.1	-877	0.66 (CI: 0.64-0.68)	No	Bassa	Alta	0 allerte segnalate	1	Moderata	No
PA Bolzano/Bozen	373	-28.5	0	0.75 (CI: 0.67-0.83)	No	Bassa	Bassa	0 allerte segnalate	1	Bassa	No
PA Trento	592	-1.3	-7	0.77 (CI: 0.69-0.85)	No	Bassa	Moderata	0 allerte segnalate	1	Moderata	No
Puglia	8510	-1.8	-4	0.84 (CI: 0.82-0.86)	No	Bassa	Moderata	0 allerte segnalate	1	Moderata	No
Sardegna	1806	-10.2	157	0.97 (CI: 0.92-1.01)	No	Moderata	Bassa	2 allerte segnalate. Ind 2.1 in aumento e sopra 5%. Ind 2.6 in	1	Alta (molteplici allerte di resilienza)	No



Ministero della Salute



Regione.PA	Nuovi casi segnalati nella settimana	Trend settimanale COVID-19		Stima di Rt-puntuale (calcolato al 07/04/2021)	Dichiarata trasmissione non gestibile in modo efficace con misure locali (zone rosse)	Valutazione della probabilità	Valutazione di impatto	Allerte relative alla resilienza dei servizi sanitari territoriali	Compatibilità Rt sintomi puntuale con gli scenari di trasmissione*	Classificazione complessiva di rischio	Classificazione Alta e/o equiparata ad Alta per 3 o più settimane consecutive
		Casi (Fonte ISS)	Focolai								
								diminuzione e sotto 90%			
Sicilia	8217	7.9	492	1.12 (CI: 1.08-1.17)	No	<b>Moderata</b>	Bassa	0 allerte segnalate	2	<b>Moderata ad alta probabilità di progressione</b>	No
Toscana	6751	2.8	-274	0.88 (CI: 0.86-0.9)	No	Bassa	<b>Alta</b>	1 allerta segnalata. Ind 21 in aumento e sopra 15%	1	<b>Moderata</b>	No
Umbria	752	-17.5	-73	0.89 (CI: 0.83-0.95)	No	Bassa	Bassa	0 allerte segnalate	1	Bassa	No
V.d'Aosta/V.d'Aoste	329	-5.7	-22	0.94 (CI: 0.85-1.03)	No	Bassa	<b>Moderata</b>	1 allerta segnalata. Ind 21 in aumento e sopra 20%	1	<b>Moderata</b>	No
Veneto	6327	-0.3	-1220	0.71 (CI: 0.69-0.73)	No	Bassa	Bassa	0 allerte segnalate	1	Bassa	No

PA: Provincia Autonoma; gg: giorni

\* ai sensi del documento "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale"

## Dimensione 1 - completezza dei dati

### Indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio:

Settore	N	Indicatore	Soglia	Allerta	Allerta
<b>Capacità di monitoraggio (indicatori di qualità dei sistemi di sorveglianza con raccolta dati a livello nazionale)</b>	1.1	Numero di casi sintomatici notificati per mese in cui è indicata la data inizio sintomi / totale di casi sintomatici notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo	Almeno il 60% con trend in miglioramento Un valore di almeno 50% con trend in miglioramento sarà considerato accettabile nelle prime 3 settimane dal 4 maggio 2020	<60%	Sorveglianza integrata nazionale
	1.2	Numero di casi notificati per mese con storia di ricovero in ospedale (in reparti diversi dalla TI) in cui è indicata la data di ricovero/totale di casi con storia di ricovero in ospedale (in reparti diversi dalla TI) notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo			
	1.3	Numero di casi notificati per mese con storia di trasferimento/ricovero in reparto di terapia intensiva (TI) in cui è indicata la data di trasferimento o ricovero in TI/totale di casi con storia di trasferimento/ricovero in terapia intensiva notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo			
	1.4	Numero di casi notificati per mese in cui è riportato il comune di domicilio o residenza/totale di casi notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo			



Ministero della Salute



Appendice - Tabella 2 – Indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio, monitoraggio per Regione, dati al 21 aprile 2021 relativi alla settimana 12/4/2021-18/4/2021

Regione.PA	Ind1.1 settimana precedente (%)	Ind1.1 settimana di riferimento (%)	Variazione	Ind1.2 (%)	Ind1.3 (%)	Ind1.4 (%)
<b>Abruzzo</b>	95.2	97.2	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	99.6
<b>Basilicata</b>	99.3	99.9	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	100.0
<b>Calabria</b>	85.4	82.0	Stabilmente sopra-soglia	99.6	100	99.6
<b>Campania</b>	99.6	99.6	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	99.7
<b>Emilia-Romagna</b>	100.0	100.0	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	99.7
<b>FVG</b>	99.5	99.8	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	99.8
<b>Lazio</b>	94.3	93.8	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	96.6
<b>Liguria</b>	92.9	95.1	Stabilmente sopra-soglia	99.9	100	97.9
<b>Lombardia</b>	84.5	85.3	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	98.4
<b>Marche</b>	96.6	100.0	Stabilmente sopra-soglia	99.8	100	100.0
<b>Molise</b>	97.8	98.7	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	100.0
<b>Piemonte</b>	80.6	80.5	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	99.0
<b>PA Bolzano/Bozen</b>	94.5	94.9	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	97.0
<b>PA Trento</b>	94.5	95.1	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	96.9
<b>Puglia</b>	97.5	97.5	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	100.0
<b>Sardegna</b>	89.0	89.3	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	100.0
<b>Sicilia</b>	97.8	97.8	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	100.0
<b>Toscana</b>	98.1	98.4	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	99.3
<b>Umbria</b>	96.3	96.7	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	99.0
<b>V.d'Aosta/V.d'Aoste</b>	98.0	98.9	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	100.0
<b>Veneto</b>	95.0	96.8	Stabilmente sopra-soglia	100.0	100	100.0



## Dimensione 2 - la classificazione della trasmissione ed impatto

### Indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione

Settore	N	Indicatore	Soglia	Allerta	Fonte dati
Stabilità di trasmissione	3.1	Numero di casi riportati alla protezione civile negli ultimi 14 giorni	Numero di casi con trend settimanale in diminuzione o stabile	Casi in aumento negli ultimi 5gg (% di aumento settimanale con soglie standard da utilizzare come "cruscotto informativo")	Ministero della salute
	3.2	Rt calcolato sulla base della sorveglianza integrata ISS (si utilizzeranno due indicatori, basati su data inizio sintomi e data di ospedalizzazione)	Rt regionale calcolabile e $\leq 1$ in tutte le Regioni/PPAA in fase 2 A	Rt >1 o non calcolabile	Database ISS elaborato da FBK
	3.4	Numero di casi per data diagnosi e per data inizio sintomi riportati alla sorveglianza integrata COVID-19 per giorno	Trend settimanale in diminuzione o stabile	Casi in aumento nell'ultima settimana (% di aumento settimanale con soglie standard da utilizzare come "cruscotto informativo")	ISS - Sistema di Sorveglianza integrata COVID-19
	3.5	Numero di nuovi focolai di trasmissione (2 o più casi epidemiologicamente collegati tra loro o un aumento inatteso nel numero di casi in un tempo e luogo definito)	Mancato aumento nel numero di focolai di trasmissione attivi nella Regione  Assenza di focolai di trasmissione sul territorio regionale per cui non sia stata rapidamente realizzata una valutazione del rischio e valutata l'opportunità di istituire una "zona rossa" sub-regionale	Evidenza di nuovi focolai negli ultimi 7 giorni in particolare se in RSA/case di riposo/ospedali o altri luoghi che ospitano popolazioni vulnerabili. La presenza nuovi focolai nella Regione richiede una valutazione del rischio ad hoc che definisca qualora nella regione vi sia una trasmissione sostenuta e diffusa tale da richiedere il ritorno alla fase 1	ISS - Monitoraggio dei focolai e delle zone rosse con schede di indagine
	3.6	Numero di nuovi casi di infezione confermata da SARS-CoV-2 per Regione non associati a catene di trasmissione note	Nel caso vi siano nuovi focolai dichiarati, l'indicatore può monitorare la qualità del contact-tracing, nel caso non vi siano focolai di trasmissione la presenza di casi non collegati a catene di trasmissione potrebbe essere compatibile con uno scenario di bassa trasmissione in cui si osservano solo casi sporadici (considerando una quota di circolazione non visibile in soggetti pauci- sintomatici)	In presenza di focolai, la presenza di nuovi casi di infezione non tracciati a catene note di contagio richiede una valutazione del rischio <i>ad hoc</i> che definisca qualora nella regione vi sia una trasmissione sostenuta e diffusa tale da richiedere il ritorno alla fase 1	Valutazione periodica settimanale
Servizi sanitari e assistenziali non sovraccarichi	3.8	Tasso di occupazione dei posti letto totali di Terapia Intensiva (codice 49) per pazienti COVID-19	$\leq 30\%$	>30%	Piattaforma rilevazione giornaliera posti letto MdS.
	3.9	Tasso di occupazione dei posti letto totali di Area Medica per pazienti COVID-19	$\leq 40\%$	> 40%	



### **Nota Metodologica**

**NB Classificazioni non valutabili nella attuale situazione sono da considerarsi equiparabili a classificazioni di rischio alto/molto alto**

**Stima di Rt:** La renewal equation che è alla base del metodo per il calcolo di Rt considera "il numero di nuovi casi locali con inizio sintomi al giorno t" (x) trasmessi dai "casi con inizio sintomi nei giorni precedenti" (y). Quando abbiamo dei casi importati, questi vengono contati insieme a tutti gli altri casi in y, in quanto potenziali "infettori" di nuovi casi locali, ma non in x, in quanto infezioni che sono state trasmesse altrove. Dal punto di vista computazionale è sufficiente, per le regioni, continuare ad utilizzare gli script basati sul software EpiEstim, avendo cura di inserire nella terza colonna del file di input il numero corretto di casi giornalieri che sono stati importati da un'altra regione o dall'estero.

**Valutazione del Rischio:** nel caso in cui venga riscontrato un aumento in entrambi i flussi di sorveglianza ma questo sia attribuibile esclusivamente a casi importati e immediatamente isolati al loro arrivo sul territorio regionale, questo non porta automaticamente ad un aumento nel livello di rischio.

**Dati sui focolai:** appurato ormai il consolidamento del dato sui focolai riportati da ciascuna Regione/PA, il trend nel numero di focolai per settimana è utilizzato dal report numero 12 nella valutazione del rischio in linea con quanto riportato alla Figura 1 del DM Salute del 30 aprile 2020.

**Casi importati:** La completezza del dato sulla provenienza dei casi (autoctoni, importati da altra Regione, importati da Stato estero) è considerata sufficiente e ne è quindi tenuto conto nel calcolo dell'Rt e nella valutazione del rischio (interpretazione dell'indicatore 3.4).

**Scenario settimanale di riferimento:** viene introdotta la analisi dello scenario settimanale sulla base del dato Rt sintomi (puntuale) in base a quanto definito nel documento [Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale](#) :

- **Compatibile con Scenario 1:** Rt regionali sopra soglia per periodi limitati (inferiore a 1 mese)
- **Compatibile con Scenario 2:** Rt regionali significativamente compresi tra  $R_t=1$  e  $R_t=1,25$
- **Compatibile con Scenario 3:** Rt regionali significativamente compresi tra  $R_t=1,25$  e  $R_t=1,5$
- **Compatibile con Scenario 4:** Rt regionali significativamente maggiori di 1,5

**Probabilità di raggiungere soglie di occupazione posti letto:** Viene introdotto il dato **stimato a 1 mese** in base all'Rt di ospedalizzazione sulla probabilità di raggiungere le soglie previste negli indicatori 3.8 e 3.9 relative al tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva ed area medica **qualora si mantengano le condizioni osservate nella settimana di monitoraggio corrente**. Viene fornito il dato categorizzato come segue: <5%, 5-50%, > 50%. Sono integrate nelle stime di proiezione i posti letto attivabili nel periodo compatibile con la stima stessa.

**Occupazione posti letto:** si riporta in questa relazione il dato più recente trasmesso dalle Regioni/PA alla DG Programmazione del Ministero della Salute. Il tasso di occupazione è calcolato dal mese di maggio tenendo conto dei soli posti letto attivi al momento della rilevazione.



Ministero della Salute



Appendice - Tabella 3 – Indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione, dati al 21 aprile 2021 relativi alla settimana 12/4/2021-18/4/2021

Regione.PA	Ind3.1	Trend 3.1 (% variazione settimanale)	Trend 3.4 (% variazione settimanale)	Ind3.2 (Rt puntuale)	Ind3.5	Ind3.6	Ind3.8*	Ind3.9*
Abruzzo	2790	-1.8	-2.7	0.84 (CI: 0.79-0.89)	280	454	26%	34%
Basilicata	2189	<b>26.6</b>	<b>15.4</b>	<b>1.24 (CI: 1.08-1.42)</b>	11	2	11%	39%
Calabria	6085	<b>19.1</b>	<b>16.6</b>	<b>1.03 (CI: 0.96-1.1)</b>	31	531	<b>31%</b>	<b>49%</b>
Campania	24589	<b>19.3</b>	<b>16.2</b>	0.92 (CI: 0.89-0.95)	1493	2985	25%	35%
Emilia-Romagna	15414	-9.1	-12.6	0.73 (CI: 0.71-0.75)	84	2564	<b>38%</b>	33%
FVG	3606	-9.4	-17.0#	0.61 (CI: 0.58-0.64)	272	419	29%	27%
Lazio	18121	-6.4	-6.9	0.78 (CI: 0.76-0.81)	120	148	<b>37%</b>	<b>43%</b>
Liguria	4811	-11.6	-10.8	0.82 (CI: 0.78-0.86)	292	181	<b>31%</b>	33%
Lombardia	30476	-8.0	-4.4	0.72 (CI: 0.7-0.73)	2314	7161	<b>48%</b>	38%
Marche	4314	-12.1	-8.1	0.69 (CI: 0.63-0.75)	131	691	<b>36%</b>	40%
Molise	444	<b>45.3</b>	<b>26.6</b>	<b>1.49 (CI: 0.99-2.1)</b>	10	0	<b>33%</b>	19%
Piemonte	16430	-21.8	-19.1	0.66 (CI: 0.64-0.68)	1150	1653	<b>45%</b>	<b>47%</b>
PA Bolzano/Bozen	970	-36.7	-28.5	0.75 (CI: 0.67-0.83)	7	330	10%	12%
PA Trento	1269	-1.7	-1.3	0.77 (CI: 0.69-0.85)	14	495	<b>33%</b>	21%
Puglia	19036	<b>3.9</b>	-1.8	0.84 (CI: 0.82-0.86)	199	4521	<b>44%</b>	<b>50%</b>
Sardegna	4565	<b>14.2</b>	-10.2#	0.97 (CI: 0.92-1.01)	437	232	27%	24%
Sicilia	16863	<b>15.3</b>	<b>7.9</b>	<b>1.12 (CI: 1.08-1.17)</b>	1105	3574	22%	32%
Toscana	14834	-1.3	<b>2.8</b>	0.88 (CI: 0.86-0.9)	769	2917	<b>43%</b>	31%
Umbria	1677	-16.7	-17.5	0.89 (CI: 0.83-0.95)	129	254	28%	25%
V.d'Aosta/V.d'Aoste	720	-24.0	-5.7	0.94 (CI: 0.85-1.03)	55	165	<b>40%</b>	23%
Veneto	12664	-2.8	-0.3	0.71 (CI: 0.69-0.73)	1219	615	22%	20%

\* dato aggiornato al giorno 20/04/2021

# Regioni/PPAA dove è stato rilevato un forte ritardo di notifica dei casi nel flusso ISS che potrebbe rendere la valutazione di questi indicatori meno affidabile.



## Dimensione 3 - Resilienza dei servizi sanitari preposti nel caso di una recrudescenza dell'epidemia da COVID-19

### Indicatori di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti

Settore	N	Indicatore	Soglia	Allerta	Fonte dati
<b>Abilità di testare tempestivamente tutti i casi Sospetti</b>	2.1	% di tamponi positivi escludendo per quanto possibile tutte le attività di screening e il "re-testing" degli stessi soggetti, complessivamente e per macro-setting (territoriale, PS/Ospedale, altro) per mese.*  *Il calcolo di questo indicatore, senza modificarne la definizione, sarà oggetto di rivalutazione in collaborazione con le Regioni/PA alla luce delle modifiche previste nella definizione internazionale di caso per gli aspetti legati all'accertamento diagnostico dei casi COVID-19	Trend in diminuzione e in setting ospedalieri/PS  Valore predittivo positivo (VPP) dei test stabile o in diminuzione	Trend in aumento in setting ospedalieri/PS  VPP in aumento	Valutazione periodica settimanale
	2.2	Tempo tra data inizio sintomi e data di diagnosi	Mediana settimanale ≤ 5gg	Mediana settimanale > 5gg	ISS - Sistema di Sorveglianza integrata COVID-19
	2.3 (opzionale)	Tempo tra data inizio sintomi e data di isolamento	Mediana settimanale ≤ 3gg	Mediana settimanale > 3gg	ISS - Sistema di Sorveglianza integrata COVID-19 con integrazione di questa variabile
<b>Possibilità di garantire adeguate risorse per contact-tracing, isolamento e quarantena</b>	2.4	Numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona dedicate in ciascun servizio territoriale al contact-tracing	Numero e tipologia di figure professionali dedicate a ciascuna attività a livello locale progressivamente allineato con gli standard raccomandati a livello europeo	Numero e tipologia di figure professionali dedicate a livello locale riportato come non adeguato in base agli standard raccomandati a livello europeo	Relazione periodica (mensile)
	2.5	Numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona dedicate in ciascun servizio territoriale alle attività di prelievo/invio ai laboratori di riferimento e monitoraggio dei contatti stretti e dei casi posti rispettivamente in quarantena e isolamento			
	2.6	Numero di casi confermati di infezione nella regione per cui sia stata effettuata una regolare indagine epidemiologica con ricerca dei contatti stretti/totale di nuovi casi di infezione confermati	Trend in miglioramento o con target finale 100%		

Appendice - Tabella 4 – Indicatori di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti e valutazione della resilienza dei servizi sanitari territoriali

Regione.PA	Ind2.1* (precedente)	Ind2.1 (settimana di riferimento)	Ind2.2 (mediana giorni tra inizio sintomi e diagnosi**)	Ind2.3 (mediana)	Ind2.4	Ind2.5	Totale risorse umane	Ind2.6	Resilienza dei servizi sanitari territoriali
<b>Abruzzo</b>	9%	7.4%	3	1	0.8 per 10000	1 per 10000	1.8 per 10000	97.9%	0 allerte segnalate
<b>Basilicata</b>	11.2%	<b>12.5%</b>	4	0	1.5 per 10000	5.2 per 10000	6.8 per 10000	93%	<b>1 allerta segnalata.</b> Ind 21 in aumento e sopra 10%
<b>Calabria</b>	13.5%	13.5%	6	0	0.9 per 10000	0.6 per 10000	1.4 per 10000	<b>82.8%</b>	<b>1 allerta segnalata.</b> Ind 2.6 in diminuzione e sotto 90%
<b>Campania</b>	13.6%	<b>13.7%</b>	1	2	0.8 per 10000	1.6 per 10000	2.4 per 10000	92.8%	<b>1 allerta segnalata.</b> Ind 21 in aumento e sopra 10%
<b>Emilia-Romagna</b>	13.8%	12%	2	Non calcolabile	1.3 per 10000	1.6 per 10000	2.9 per 10000	89.6%	0 allerte segnalate
<b>FVG</b>	11%	8.7%	3	1	1.2 per 10000	1.2 per 10000	2.4 per 10000	98.9%	0 allerte segnalate
<b>Lazio</b>	19.8%	16.9%	3	1	0.9 per 10000	1 per 10000	1.9 per 10000	96.5%	0 allerte segnalate
<b>Liguria</b>	9.3%	8.2%	3	1	0.8 per 10000	0.8 per 10000	1.6 per 10000	93.2%	0 allerte segnalate
<b>Lombardia</b>	12.9%	9%	3	Non calcolabile	0.9 per 10000	1 per 10000	1.9 per 10000	94.5%	0 allerte segnalate
<b>Marche</b>	12.5%	<b>13.1%</b>	0	0	0.8 per 10000	1.4 per 10000	2.3 per 10000	100%	<b>1 allerta segnalata.</b> Ind 21 in aumento e sopra 10%
<b>Molise</b>	6%	<b>9.4%</b>	-3	-3	1.1 per 10000	2.6 per 10000	3.7 per 10000	99.5%	<b>1 allerta segnalata.</b> Ind 21 in aumento e sopra 5%
<b>Piemonte</b>	10.7%	9%	5	1	1.5 per 10000	2.1 per 10000	3.6 per 10000	96%	0 allerte segnalate
<b>PA Bolzano/Bozen</b>	23.8%	21.1%	2	2	2.2 per 10000	3.7 per 10000	5.8 per 10000	98%	0 allerte segnalate
<b>PA Trento</b>	14.8%	12.9%	2	2	1.1 per 10000	1.6 per 10000	2.7 per 10000	100%	0 allerte segnalate

Regione.PA	Ind2.1* (precedente)	Ind2.1 (settimana di riferimento)	Ind2.2 (mediana giorni tra inizio sintomi e diagnosi**)	Ind2.3 (mediana)	Ind2.4	Ind2.5	Totale risorse umane	Ind2.6	Resilienza dei servizi sanitari territoriali
<b>Puglia</b>	20.1%	18.6%	3	3	0.9 per 10000	1 per 10000	1.9 per 10000	84.6%	0 allerte segnalate
<b>Sardegna</b>	9%	<b>9.2%</b>	4	2	0.5 per 10000	1.8 per 10000	2.3 per 10000	<b>82.8%</b>	<b>2 allerte segnalate.</b> Ind 2.1 in aumento e sopra 5%. Ind 2.6 in diminuzione e sotto 90%
<b>Sicilia</b>	18.7%	13.1%	2	1	0.7 per 10000	2.4 per 10000	3 per 10000	98.1%	0 allerte segnalate
<b>Toscana</b>	18.2%	<b>18.3%</b>	0	2	2 per 10000	1.7 per 10000	3.7 per 10000	100%	<b>1 allerta segnalata.</b> Ind 2.1 in aumento e sopra 15%
<b>Umbria</b>	11.1%	10%	2	1	0.9 per 10000	3 per 10000	4 per 10000	100%	0 allerte segnalate
<b>V.d'Aosta/V.d'Aoste</b>	18.6%	<b>23.5%</b>	2	0	1.7 per 10000	1.7 per 10000	3.5 per 10000	99.9%	<b>1 allerta segnalata.</b> Ind 2.1 in aumento e sopra 20%
<b>Veneto</b>	6.4%	6.1%	1	0	1 per 10000	1.8 per 10000	2.8 per 10000	89.4%	0 allerte segnalate

\* le diverse politiche di offerta di "testing" e l'uso di test alternativi al test molecolare nelle Regioni/PPAA non rendono questo indicatore confrontabile tra le stesse.

\*\* in presenza di numerosi casi che vengono diagnosticati prima dell'inizio dei sintomi (asintomatici alla diagnosi) è possibile il riscontro di tempi mediani molto brevi o, in casi estremi, negativi. Si ricorda che tutti i dati degli indicatori di monitoraggio sono validati con i referenti delle rispettive Regioni/PA prima della finalizzazione delle relazioni settimanali.

#la Regione Sicilia comunica che in relazione all'invio dei valori sugli indicatori di cui al monitoraggio settimanale precedente che è in corso una verifica sull'accuratezza della procedura di selezione del denominatore dell'indicatore 2.1 che sono stati consultati dalla piattaforma dati aggregati giornalieri protezione civile.



---

Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità  
Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020

---

# Monitoraggio Fase 2 Report settimanale

Report 49  
Sintesi nazionale

---

Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020)  
Dati relativi alla settimana  
12/4/2021-18/4/2021 (aggiornati al 21/4/2021)

---



## **Aggiornamento 21 aprile 2021 - Periodo di riferimento: 12/4/2021-18/4/2021**

### ***Headline della settimana:***

*Si conferma la lenta discesa dei nuovi casi e del numero di pazienti ricoverati, ma il quadro complessivo resta ancora ad un livello molto impegnativo.*

*Complessivamente, l'incidenza resta elevata e ancora ben lontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il contenimento dei nuovi casi.*

*Di conseguenza, è necessario continuare a ridurre il numero di casi e progredire con la campagna vaccinale.*

*La ormai prevalente circolazione in Italia di una variante virale caratterizzata da una trasmissibilità notevolmente maggiore, richiede di continuare a mantenere particolare cautela e gradualità nella gestione dell'epidemia.*

*È fondamentale che la popolazione continui a rispettare tutte le misure raccomandate di protezione individuale e distanziamento in tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo per ridurre il rischio di contagio.*



### Punti chiave:

- Si riporta una analisi dei dati relativi al periodo 12 aprile – 18 aprile 2021. Per i tempi che intercorrono tra l'esposizione al patogeno e lo sviluppo di sintomi e tra questi e la diagnosi e successiva notifica, verosimilmente molti dei casi notificati in questa settimana hanno contratto l'infezione nella terza decade di marzo.
- **Questa settimana si osserva ancora una lievissima diminuzione della incidenza settimanale** (157,4 per 100.000 abitanti (12/04/2021-18/04/2021) vs 160,5 per 100.000 abitanti (05/04/2021-11/04/2021), dati flusso ISS). Sebbene la campagna vaccinale progredisca significativamente, complessivamente, l'incidenza resta elevata e ancora ben lontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il contenimento dei nuovi casi.
- Nel periodo 31 marzo – 13 aprile 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a **0,81 (range 0,77– 0,89), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e sotto l'uno anche nel limite superiore**. Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell'Rt riportato si rimanda all'approfondimento disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità ([https://www.iss.it/primo-piano/-/asset\\_publisher/o4oGR9qmvUz9/content/id/5477037](https://www.iss.it/primo-piano/-/asset_publisher/o4oGR9qmvUz9/content/id/5477037)).
- **Si osserva un lieve miglioramento generale del rischio**, con due Regioni (Calabria e Sardegna) che hanno un livello di rischio alto secondo il DM del 30 Aprile 2020. Quattordici Regioni/PPAA hanno una classificazione di rischio moderato (di cui due ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e cinque Regioni che hanno una classificazione di rischio basso. Quattro Regioni (vs cinque la settimana precedente) hanno un Rt puntuale maggiore di uno. Tra queste, due Regioni (Basilicata e Sicilia) hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2. Le altre Regioni/PPAA hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo uno.
- **Rimane alto il numero di Regioni/PPAA che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica** (12 Regioni/PPAA vs 14 della settimana precedente). Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è sopra la soglia critica (35%), anche se il numero di persone ricoverate in **terapia intensiva è in diminuzione** da 3.526 (13/04/2021) a 3.151 (20/04/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è sotto la soglia critica (36%) per la prima volta dopo varie settimane. Il numero di persone ricoverate in queste aree passa da 26.952 (13/04/2021) a 23.255 (20/04/2021).
- **Tredici Regioni/PPAA non hanno riportato allerte di resilienza**. Una Regione (Calabria) ha riportato molteplici allerte.
- **Si osserva una ulteriore diminuzione nel numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione** (29.892 vs 32.921 la settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è in lieve aumento (37,9% vs 37,0% la scorsa settimana). E' invece stabile il numero di casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (38,4% vs 38,1%). Infine, il 23,7% è stato diagnosticato attraverso attività di screening.



## Conclusioni:

- Si conferma la lenta discesa dei nuovi casi e del numero di pazienti ricoverati, ma il quadro complessivo resta ancora ad un livello molto impegnativo.
- L'indice di trasmissibilità  $R_t$  calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,81 (range 0,77– 0,89), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e sotto l'uno anche nel limite superiore. Quattro Regioni hanno un  $R_t$  puntuale maggiore di uno. Tra queste, due Regioni (Basilicata e Sicilia) hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2.
- L'incidenza è in lenta diminuzione ma ancora molto elevata per consentire sull'intero territorio nazionale una gestione basata sul contenimento ovvero sull'identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti. Di conseguenza, è necessario continuare a ridurre il numero di casi anche attraverso le misure di mitigazione volte a ridurre la possibilità di aggregazione interpersonale.
- La ormai prevalente circolazione in Italia di una variante virale caratterizzata da una trasmissibilità notevolmente maggiore, richiede di continuare a mantenere particolare cautela e gradualità nella gestione dell'epidemia.
- È fondamentale che la popolazione continui a rispettare tutte le misure raccomandate di protezione individuale e distanziamento in tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo per ridurre il rischio di contagio. Si ricorda che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine. Si ribadisce la necessità di rispettare le misure raccomandate dalle autorità sanitarie compresi i provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi.