Oceňovanie európskych opcií: Black-Scholesov model a metóda Monte Carlo

Technická správa s aplikáciou na reálne dáta (AAPL)

Ian Spika

2026-11-06

Obsah

1 Úvod **1**

2 Teoretické pozadie **1**
2.1 Geometrický Brownov pohyb 1
2.2 Black-Scholesova formula 2
2.3 Monte Carlo oceňovanie 2

3 Implementácia v R **2**
3.1 Funkcie a parametre úlohy 2

4 Validácia: konvergencia Monte Carlo odhadu **3**
4.1 Tabuľka konvergencie 3
4.2 Grafická ilustrácia konvergencie 4
4.3 Bonus: ázijská opcia 5

5 Aplikácia na reálne dáta: Apple Inc. **6**
5.1 Vývoj ceny akcie 6
5.2 Odhad volatility z historických dát 7
5.3 Test predpokladu normality 7
5.4 Porovnanie modelových cien s trhovými 8
5.5 Volatility smile 11
5.6 Diskusia výsledkov 12

6 Záver **12**

Literatúra **13**

1 Úvod

Oceňovanie finančných derivátov patrí medzi najvýznamnejšie aplikácie matematiky v ekonómii. Európska kúpna opcia (call) dáva majiteľovi právo, nie však povinnosť, kúpiť podkladové aktívum za vopred dohodnutú cenu K v stanovenom čase T. Otázka, koľko má taká opcia stáť dnes, viedla v roku 1973 k zverejneniu slávneho modelu, ktorý získal Nobelovu cenu za ekonómiu — Black-Scholesovho modelu (Black a Scholes 1973; Merton 1973).

Hoci pre vanilkové európske opcie existuje uzavretá analytická formula, v praxi sa stretávame s mnohými variantmi opcií (ázijské, bariérové, americké, koš opcií), pre ktoré vzorec neexistuje a nutne sa musíme uchýliť k numerickým metódam. Najflexibilnejšou z nich je metóda Monte Carlo, ktorú do oceňovania opcií zaviedol Boyle (1977).

Cieľom tejto správy je:

1. predstaviť teoretické pozadie Black-Scholesovho modelu,
2. implementovať obe metódy oceňovania v jazyku R,
3. empiricky overiť konvergenciu Monte Carlo odhadu k analytickej hodnote a kvantifikovať jeho štatistickú chybu,
4. ukázať, prečo je Monte Carlo nevyhnutné pre exotické opcie, na príklade ázijskej opcie,
5. **aplikovať obe metódy na reálne trhové dáta** akcie Apple Inc. (AAPL) a porovnať modelové ceny so skutočnými trhovými kotáciami, čo vedie ku konceptu *implikovanej volatility*.

2 Teoretické pozadie

2.1 Geometrický Brownov pohyb

Black-Scholesov model predpokladá, že cena podkladového aktíva S_t sa riadi stochastickou diferenciálnou rovnicou

$$dS_t = \mu S_t \, dt + \sigma S_t \, dW_t, \tag{1}$$

kde μ je očakávaný výnos, σ volatilita a W_t štandardný Wienerov proces. Riešením rovnice Rovnica 1 je geometrický Brownov pohyb

$$S_T = S_0 \exp\!\left[\left(\mu - \tfrac{1}{2}\sigma^2\right) T + \sigma W_T\right], \tag{2}$$

čo plynie z Itôovej lemy (Hull 2018, kap. 14). Pre účely oceňovania v rizikovo-neutrálnej miere nahrádzame μ bezrizikovou úrokovou mierou r.

2.2 Black-Scholesova formula

Cena európskej kúpnej opcie podľa Black-Scholesovho modelu je

$$C_{\mathrm{BS}} = S_0 \, \Phi(d_1) - K e^{-rT} \, \Phi(d_2), \tag{3}$$

kde Φ je distribučná funkcia štandardného normálneho rozdelenia a

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \tfrac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}. \tag{4}$$

2.3 Monte Carlo oceňovanie

Cena opcie je v rizikovo-neutrálnej miere $\mathbb{Q}$ definovaná ako diskontovaná očakávaná výplata:

$$C = e^{-rT}\,\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[(S_T - K)^+]\,. \tag{5}$$

Monte Carlo odhad spočíva v generovaní n nezávislých realizácií ceny $S_T^{(i)}$ podľa rovnice Rovnica 2 a v aproximácii očakávania aritmetickým priemerom:

$$\hat{C}_{\mathrm{MC}} = e^{-rT}\,\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(S_T^{(i)} - K\right)^+. \tag{6}$$

Podľa centrálnej limitnej vety je štandardná chyba odhadu rádu $\mathcal{O}(1/\sqrt{n})$ a 95 % konfidenčný interval má tvar $\hat{C}_{\mathrm{MC}} \pm 1{,}96 \cdot \hat{s}/\sqrt{n}$, kde $\hat{s}$ je výberová smerodajná odchýlka diskontovaných výplat (Glasserman 2003, kap. 1).

3 Implementácia v R

3.1 Funkcie a parametre úlohy

Pre základnú validáciu metód použijeme modelové parametre typické pre krátkodobé akciové opcie. Reálne dáta AAPL spracujeme v Sekcia 5.

```
S0    <- 100      # aktualna cena podkladu
K     <- 100      # realizacna cena (at-the-money)
r     <- 0.05     # bezrizikova urokova miera
sigma <- 0.20     # volatilita
T_    <- 1        # cas do expiracie (v rokoch)
```

```
bs_call <- function(S0, K, r, sigma, T_) {
  d1 <- (log(S0 / K) + (r + 0.5 * sigma^2) * T_) / (sigma * sqrt(T_))
  d2 <- d1 - sigma * sqrt(T_)
  S0 * pnorm(d1) - K * exp(-r * T_) * pnorm(d2)
}

mc_call <- function(S0, K, r, sigma, T_, n, seed = NULL) {
  if (!is.null(seed)) set.seed(seed)
  Z       <- rnorm(n)
  ST      <- S0 * exp((r - 0.5 * sigma^2) * T_ + sigma * sqrt(T_) * Z)
  payoff  <- pmax(ST - K, 0)
  disc    <- exp(-r * T_) * payoff
  est     <- mean(disc)
  se      <- sd(disc) / sqrt(n)
  list(estimate = est, se = se,
       ci_lo = est - 1.96 * se, ci_hi = est + 1.96 * se)
}

C_bs <- bs_call(S0, K, r, sigma, T_)
mc_result <- mc_call(S0, K, r, sigma, T_, n = 100000, seed = 42)
```

Pre modelové parametre dostávame analytickú cenu $C_{\text{BS}} = 10.4506$ a Monte Carlo odhad $\hat{C}_{\text{MC}} = 10.4345$ s 95 % konfidenčným intervalom $[10.3433,\ 10.5257]$.

4 Validácia: konvergencia Monte Carlo odhadu

4.1 Tabuľka konvergencie

Aby sme overili rýchlosť konvergencie odhadu Rovnica 6, zopakujme simuláciu pre rôzne hodnoty n. Výsledky sú zhrnuté v Tabuľka 1.

```
ns <- c(1e2, 1e3, 1e4, 1e5, 1e6)

tab <- do.call(rbind, lapply(ns, function(n) {
  res <- mc_call(S0, K, r, sigma, T_, n, seed = 2026)
  data.frame(n = n, odhad = res$estimate, se = res$se,
             chyba = abs(res$estimate - C_bs))
}))

knitr::kable(
  tab,
  col.names = c("n", "Odhad MC", "Štand. chyba", "|MC - BS|"),
  digits = 5, align = "rrrr"
)
```

Tabuľka 1: Konvergencia Monte Carlo odhadu k Black-Scholesovej cene.

n	Odhad MC	Štand. chyba	$\lvert MC - BS \rvert$
1e+02	9.27585	1.42180	1.17474
1e+03	10.51848	0.47218	0.06789
1e+04	10.49570	0.15020	0.04512
1e+05	10.50374	0.04678	0.05316
1e+06	10.44387	0.01471	0.00672

Z Tabuľka 1 vidíme, že štandardná chyba aj absolútna odchýlka od analytickej ceny klesajú približne ako $1/\sqrt{n}$ — pri zvýšení n o faktor 100 sa chyba zníži približne 10-násobne.

4.2 Grafická ilustrácia konvergencie


Konvergencia bodového odhadu spolu s pásmom 95 % konfidenčného intervalu je znázornená na Obrázok 1.

```
set.seed(2026)
n_max  <- 50000
Z      <- rnorm(n_max)
ST     <- S0 * exp((r - 0.5 * sigma^2) * T_ + sigma * sqrt(T_) * Z)
disc   <- exp(-r * T_) * pmax(ST - K, 0)
```

```r
cumul_mean <- cumsum(disc) / seq_along(disc)
cumul_var  <- (cumsum(disc^2) - seq_along(disc) * cumul_mean^2) /
              pmax(seq_along(disc) - 1, 1)
cumul_se   <- sqrt(cumul_var / seq_along(disc))

idx <- seq(100, n_max, by = 50)

plot(idx, cumul_mean[idx], type = "l", lwd = 1.5, col = "steelblue",
     ylim = c(C_bs - 1.5, C_bs + 1.5),
     xlab = "počet simulácií n", ylab = "odhad ceny opcie")
polygon(c(idx, rev(idx)),
        c(cumul_mean[idx] - 1.96 * cumul_se[idx],
          rev(cumul_mean[idx] + 1.96 * cumul_se[idx])),
        col = adjustcolor("steelblue", alpha.f = 0.2), border = NA)
abline(h = C_bs, lty = 2, lwd = 1.2)
legend("topright", legend = c("MC odhad", "95 % CI", "BS hodnota"),
       col = c("steelblue", adjustcolor("steelblue", 0.4), "black"),
       lty = c(1, 1, 2), lwd = c(1.5, 6, 1.2), bty = "n")
```



Obrázok 1: Konvergencia Monte Carlo odhadu ceny opcie k analytickej hodnote (čierna prerušovaná čiara) so zväčšujúcim sa počtom simulácií. Šedé pásmo predstavuje 95 % konfidenčný interval.

4.3 Bonus: ázijská opcia

Pre exotické opcie analytická formula vo všeobecnosti neexistuje a metóda Monte Carlo sa stáva nevyhnutnou. Ako príklad uvažujme **ázijskú priemerovaciu kúpnu opciu**, ktorej výplata závisí od priemeru ceny počas životnosti opcie:

$$\text{payoff} = \left(\overline{S} - K\right)^{+}, \qquad \overline{S} = \frac{1}{m}\sum_{j=1}^{m} S_{t_j}. \tag{7}$$

```r
mc_asian <- function(S0, K, r, sigma, T_, n, m, seed = NULL) {
  if (!is.null(seed)) set.seed(seed)
  dt <- T_ / m
  Z  <- matrix(rnorm(n * m), nrow = n, ncol = m)
  log_inc <- (r - 0.5 * sigma^2) * dt + sigma * sqrt(dt) * Z
  log_S   <- t(apply(log_inc, 1, cumsum))
  S_paths <- S0 * exp(log_S)
  S_avg   <- rowMeans(S_paths)
  payoff  <- pmax(S_avg - K, 0)
  disc    <- exp(-r * T_) * payoff
  list(estimate = mean(disc), se = sd(disc) / sqrt(n))
}

asian <- mc_asian(S0, K, r, sigma, T_, n = 50000, m = 50, seed = 7)
```

Cena ázijskej opcie (5.8569) je nižšia než cena európskej opcie (10.4506): priemerovanie znižuje volatilitu výplaty, a teda aj cenu opcie (Glasserman 2003, kap. 4).

5 Aplikácia na reálne dáta: Apple Inc.

V tejto sekcii aplikujeme obe metódy na akciu **Apple Inc. (NASDAQ: AAPL)**. Dáta sú stiahnuté zo služby Yahoo Finance pomocou packagu `quantmod` a uložené v adresári `data/`. V projekte sú dáta automaticky aktualizované každý deň cez GitHub Actions.

```r
prices  <- read.csv("data/aapl_prices.csv")
prices$date <- as.Date(prices$date)

# Meta-info
meta_lines <- readLines("data/meta.txt")
meta <- setNames(
  trimws(sub("^[^:]+:\\s*", "", meta_lines)),
  trimws(sub(":.*$", "", meta_lines))
)


S0_real     <- as.numeric(meta["spot_price"])
spot_date   <- meta["spot_date"]
fetched_at  <- meta["fetched_at"]
```

Aktuálna cena akcie ku dňu **2026-11-05** je **$344.17**.

5.1 Vývoj ceny akcie

Obrázok 2 zobrazuje vývoj ceny AAPL za posledné 2 roky.

```r
plot(prices$date, prices$close, type = "l", lwd = 1.2, col = "steelblue",
     xlab = "dátum", ylab = "zatváracia cena (USD)",
     main = "")
grid(col = "gray80")
abline(h = S0_real, lty = 3, col = "darkgray")
```



Obrázok 2: Vývoj zatváracej ceny AAPL za posledné 2 roky. Dáta: Yahoo Finance.

5.2 Odhad volatility z historických dát

Volatilita σ je v Black-Scholesovom modeli kľúčový parameter, ktorý nie je priamo pozorovateľný. Tradičný spôsob jej odhadu je z historických logaritmických denných výnosov

$$r_t = \ln \frac{S_t}{S_{t-1}}. \tag{8}$$

Anualizovaná volatilita sa získa škálovaním smerodajnej odchýlky denných výnosov faktorom $\sqrt{252}$, kde 252 je typický počet obchodných dní v roku.

```r
log_returns <- diff(log(prices$close))
log_returns <- log_returns[is.finite(log_returns)]
sigma_daily <- sd(log_returns)
sigma_hist  <- sigma_daily * sqrt(252)

mu_daily    <- mean(log_returns)
mu_annual   <- mu_daily * 252
```


Empirické hodnoty:

- denná smerodajná odchýlka výnosov: 0.0182
- **anualizovaná historická volatilita:** $\hat{\sigma}_{\text{hist}} = 0.2885$ (28.85 %)
- anualizovaný priemerný výnos: 0.2194

5.3 Test predpokladu normality

Black-Scholesov model predpokladá, že logaritmické výnosy sú normálne rozdelené. Obrázok 3 porovnáva empirické rozdelenie výnosov AAPL s prispôsobenou normálnou hustotou.

```
hist(log_returns, breaks = 50, freq = FALSE,
     col = adjustcolor("steelblue", 0.6), border = "white",
     xlab = "log výnos", ylab = "hustota", main = "")
xs <- seq(min(log_returns), max(log_returns), length.out = 200)
lines(xs, dnorm(xs, mean = mu_daily, sd = sigma_daily),
      col = "red", lwd = 2)
legend("topright",
       legend = c("empirické dáta", "N(ˆ, ˆ²)"),
       fill = c(adjustcolor("steelblue", 0.6), NA),
       border = c("white", NA),
       lty = c(NA, 1), col = c(NA, "red"), lwd = c(NA, 2),
       bty = "n")
```



Obrázok 3: Histogram denných logaritmických výnosov AAPL s nadprispôsobenou normálnou hustotou (červená čiara). Empirické dáta vykazujú výraznejšie chvosty než predpokladá normálne rozdelenie — znak tzv. *fat tails*, dobre známy problém Black-Scholesovho modelu.

Vizuálne aj kvantitatívne (Jarque-Bera test, p-hodnota $< 0e+00$) zamietame normalitu výnosov. Špicatosť (kurtóza) je výrazne vyššia než 3 — extrémne pohyby na trhu sa vyskytujú častejšie, než by predpovedalo normálne rozdelenie. Tento jav sa nazýva *fat tails* a je jednou z hlavných výhrad voči Black-Scholesovmu modelu.

5.4 Porovnanie modelových cien s trhovými

Teraz aplikujeme obe metódy na konkrétnu sériu kúpnych opcií na AAPL. Dáta sú stiahnuté z aktuálneho option chain.

```
options_path <- "data/aapl_options.csv"
have_options <- file.exists(options_path) &&
                file.size(options_path) > 0
```

```
opts <- read.csv(options_path)

T_real <- as.numeric(meta["years_to_expiry"])
expiry <- meta["option_expiry"]
r_real <- 0.045   # bezrizikova miera ~ 3M T-bill yield

# Implikovana volatilita: hladame sigma t.z. BS(sigma) = market_price.
# Vraciame NA ak cena lezi mimo arbitrážnych hranic alebo bisekcia zlyha.
implied_vol <- function(market_price, S0, K, r, T_) {
  if (is.na(market_price) || market_price <= 0) return(NA_real_)
  # Arbitražne hranice: max(0, S - K*e^-rT) <= C <= S
  lower <- max(0, S0 - K * exp(-r * T_))
  if (market_price < lower * 0.99 || market_price > S0) return(NA_real_)

  f <- function(sigma) bs_call(S0, K, r, sigma, T_) - market_price
  # Hladame v intervale (1%, 300%)
  tryCatch({
    res <- uniroot(f, interval = c(0.01, 3.0), tol = 1e-6)
    res$root
  }, error = function(e) NA_real_)
}

# Pre kazdu opciu spocitame: BS cenu, MC cenu, IV
opts$bs_hist <- bs_call(S0_real, opts$strike, r_real, sigma_hist, T_real)

opts$mc_hist <- sapply(opts$strike, function(K_i) {
  res <- mc_call(S0_real, K_i, r_real, sigma_hist, T_real,
                 n = 50000, seed = 1)
  res$estimate
})

opts$iv_implied <- mapply(function(price, K_i) {
  implied_vol(price, S0_real, K_i, r_real, T_real)
}, opts$market_price, opts$strike)

opts$diff_bs <- opts$market_price - opts$bs_hist
```

```
display_tab <- data.frame(
  Strike     = opts$strike,
  Bid        = opts$bid,
  Ask        = opts$ask,
  Last       = opts$last,
```

```
  Trh         = opts$market_price,
  BS          = opts$bs_hist,
  MC          = opts$mc_hist,
  Rozdiel     = opts$diff_bs,
  IV          = opts$iv_implied
)

knitr::kable(display_tab,
             col.names = c("K", "Bid", "Ask", "Last", "Cena trhu",
                           "BS ( _hist)", "MC ( _hist)",
                           "Trh - BS", "IV"),
             digits = 4, align = "r")
```

Tabuľka 2: Porovnanie trhových cien call opcií na AAPL s modelovými cenami. *Cena trhu* je mid (bid+ask)/2 ak je trh otvorený, inak posledná obchodovaná cena. *BS* a *MC* používajú historickú volatilitu. *IV* je implikovaná volatilita získaná inverziou Black-Scholesovej formule.

K	Bid	Ask	Last	Cena trhu	BS (_hist)	MC (_hist)	Trh − BS	IV
245	99.55	102.00	101.75	100.775	101.3074	101.2335	-0.5324	NA
250	94.85	96.80	96.10	95.825	96.3726	96.3002	-0.5476	NA
255	90.35	92.35	91.30	91.350	91.4506	91.3803	-0.1006	NA
260	84.90	87.65	86.55	86.275	86.5468	86.4778	-0.2718	NA
265	80.40	82.35	81.65	81.375	81.6685	81.6016	-0.2935	NA
270	75.75	77.30	76.75	76.525	76.8247	76.7613	-0.2997	0.2158
275	71.30	73.30	72.50	72.300	72.0264	71.9679	0.2736	0.3130
280	65.95	68.40	68.00	67.175	67.2865	67.2340	-0.1115	0.2792
285	61.80	64.00	63.05	62.900	62.6198	62.5716	0.2802	0.3048
290	57.10	58.65	59.20	57.875	58.0426	57.9971	-0.1676	0.2798
295	52.60	54.70	53.40	53.650	53.5724	53.5314	0.0776	0.2917
300	48.00	50.15	49.97	49.075	49.2274	49.1986	-0.1524	0.2831
305	43.45	45.30	45.00	44.375	45.0260	45.0115	-0.6510	0.2681
310	39.65	41.15	40.62	40.400	40.9862	40.9843	-0.5862	0.2727
315	35.65	37.05	36.67	36.350	37.1247	37.1357	-0.7747	0.2699
320	31.25	33.40	32.55	32.325	33.4566	33.4808	-1.1316	0.2638
325	27.80	29.35	29.32	28.575	29.9949	30.0294	-1.4199	0.2600
330	23.90	25.60	25.17	24.750	26.7497	26.7929	-1.9997	0.2510
335	21.25	22.25	21.84	21.750	23.7282	23.7798	-1.9782	0.2534
340	18.05	18.55	18.50	18.300	20.9345	20.9885	-2.6345	0.2434
345	14.90	15.25	15.35	15.075	18.3696	18.4262	-3.2946	0.2333
350	12.65	12.85	12.95	12.750	16.0313	16.0877	-3.2813	0.2339
355	10.20	10.45	10.57	10.325	13.9146	13.9685	-3.5896	0.2282
360	8.30	8.55	8.45	8.425	12.0119	12.0646	-3.5869	0.2266
365	6.45	6.75	6.79	6.600	10.3135	10.3711	-3.7135	0.2217
370	5.20	5.30	5.25	5.250	8.8079	8.8702	-3.5579	0.2207
375	3.90	4.10	4.05	4.000	7.4822	7.5495	-3.4822	0.2170
380	3.00	3.20	3.07	3.100	6.3229	6.3917	-3.2229	0.2164
385	2.26	2.40	2.33	2.330	5.3156	5.3842	-2.9856	0.2146
390	1.60	1.75	1.70	1.675	4.4460	4.5160	-2.7710	0.2111

Tabuľka 2: Porovnanie trhových cien call opcií na AAPL s modelovými cenami. *Cena trhu* je mid (bid+ask)/2 ak je trh otvorený, inak posledná obchodovaná cena. *BS* a *MC* používajú historickú volatilitu. *IV* je implikovaná volatilita získaná inverziou Black-Scholesovej formule.

K	Bid	Ask	Last	Cena trhu	BS (_hist)	MC (_hist)	Trh − BS	IV
395	1.23	1.33	1.25	1.280	3.7002	3.7667	-2.4202	0.2122
400	0.93	1.01	0.89	0.970	3.0644	3.1262	-2.0944	0.2132
410	0.49	0.58	0.54	0.535	2.0717	2.1307	-1.5367	0.2142
420	0.26	0.35	0.28	0.305	1.3750	1.4250	-1.0700	0.2174
430	0.16	0.24	0.20	0.200	0.8966	0.9375	-0.6966	0.2251
440	0.10	0.16	0.17	0.130	0.5749	0.6006	-0.4449	0.2318

i Poznámka

Zdroj cien: mid (bid+ask)/2 · Posledná aktualizácia dát: 2026-11-06 21:09:19.414117

5.5 Volatility smile


Implikovaná volatilita ako funkcia strike-u zvyčajne nie je konštantná, hoci Black-Scholesov model predpokladá opak. Empiricky pozorovaný tvar sa nazýva **volatility smile** alebo **smirk** (Hull 2018, kap. 20).

```
valid <- !is.na(opts$iv_implied) & opts$iv_implied > 0.05 & opts$iv_implied < 2.0

if (sum(valid) >= 3) {
  # Auto-skala s rozumnym minimom
  iv_range <- range(c(opts$iv_implied[valid], sigma_hist), na.rm = TRUE)
  y_lo <- max(0, iv_range[1] - 0.05)
  y_hi <- iv_range[2] + 0.05

  plot(opts$strike[valid], opts$iv_implied[valid],
       type = "b", pch = 19, col = "steelblue", lwd = 2,
       ylim = c(y_lo, y_hi),
       xlab = "strike K (USD)", ylab = "implikovaná volatilita  _imp")
  abline(h = sigma_hist, lty = 2, col = "darkgray", lwd = 1.5)
  abline(v = S0_real, lty = 3, col = "tomato", lwd = 1.5)
  legend("topright",
         legend = c("  implikovaná", "  historická", "spot S "),
         col = c("steelblue", "darkgray", "tomato"),
         lty = c(1, 2, 3), lwd = c(2, 1.5, 1.5),
         pch = c(19, NA, NA), bty = "n")
} else {
  plot.new()
  text(0.5, 0.5,
       sprintf("Nedostatok validných opcií pre smile graf (%d).\nSkúste rerun keď je trh otv
               sum(valid)),
```

```
        cex = 1.1)
}
```



Obrázok 4: Implikovaná volatilita call opcií AAPL ako funkcia strike-u. Vodorovná čiara označuje historickú volatilitu odhadnutú z výnosov za posledné 2 roky. Zakrivený tvar (smile/smirk) je znakom, že trh oceňuje extrémne pohyby vyššie, než predpokladá Black-Scholesov model s konštantnou volatilitou.

5.6 Diskusia výsledkov

Z Tabuľka 2 a Obrázok 4 vyplývajú tri pozorovania:

1. **Modelová cena s historickou volatilitou systematicky podhodnocuje trhové ceny.** Priemerný rozdiel je $-1.521. Trh teda implicitne oceňuje volatilitu vyššie ako historický odhad.
2. **Implikovaná volatilita nie je konštantná.** Krivka v Obrázok 4 má charakteristický tvar smile/smirk: out-of-the-money put a call opcie majú vyššiu IV než at-the-money opcie.
3. **Priemerná implikovaná volatilita** je 0.245 (24.5 %), čo je o -0.044 viac než historická volatilita (0.288). Tento rozdiel sa niekedy nazýva **volatility risk premium**.

Tieto pozorovania motivujú ďalší vývoj v oblasti finančnej matematiky: modely so stochastickou volatilitou (Heston), modely s skokmi (Merton-jump-diffusion) a lokálnou volatilitou (Dupire).

6 Záver

V tejto správe sme porovnali dve metódy oceňovania európskej kúpnej opcie: analytickú Black-Scholesovu formulu a numerickú Monte Carlo simuláciu. Empiricky sme overili teoretickú rýchlosť konvergencie $\mathcal{O}(1/\sqrt{n})$ — pri $n = 10^6$ sa Monte Carlo odhad líši od analytickej hodnoty rádovo o tisíciny.

Hlavný prínos tejto práce je však v aplikácii oboch metód na **reálne trhové dáta** akcie Apple Inc. Ukázali sme, že:

- empirické rozdelenie denných výnosov AAPL nie je normálne — má výraznejšie chvosty (*fat tails*),
- Black-Scholesov model s historickou volatilitou systematicky podhodnocuje trhové ceny opcií,
- implikovaná volatilita vykazuje charakteristický tvar *volatility smile*, čo priamo protirečí predpokladu modelu o konštantnej volatilite.

Tieto pozorovania zhrnujú jeden z najdôležitejších poznatkov modernej finančnej matematiky: hoci je Black-Scholes elegantný a stále základným nástrojom, jeho predpoklady sú v reálnom svete porušené, a praktické oceňovanie vyžaduje pokročilejšie modely. Monte Carlo simulácia pritom zostáva univerzálnym nástrojom — funguje rovnako pre Black-Scholes ako aj pre Heston či Merton-jump-diffusion, kde uzavreté formule neexistujú.

Ďalšie smery, ktorými by sa práca dala rozšíriť, zahŕňajú: techniky redukcie rozptylu (antitetické a kontrolné premenné), oceňovanie amerických opcií metódou Longstaff-Schwartz, alebo kalibráciu modelu so stochastickou volatilitou (Glasserman 2003).

Literatúra

BLACK, Fischer a Myron SCHOLES, 1973. The Pricing of Options and Corporate Liabilities. *Journal of Political Economy*. 1973, roč. 81, č. 3, s. 637–654.

BOYLE, Phelim P., 1977. Options: A Monte Carlo Approach. *Journal of Financial Economics*. 1977, roč. 4, č. 3, s. 323–338.

GLASSERMAN, Paul, 2003. *Monte Carlo Methods in Financial Engineering*. New York: Springer. ISBN 978-0-387-00451-8.

HULL, John C., 2018. *Options, Futures, and Other Derivatives*. 10. vyd. New York: Pearson. ISBN 978-0-13-447208-9.

MERTON, Robert C., 1973. Theory of Rational Option Pricing. *The Bell Journal of Economics and Management Science*. 1973, roč. 4, č. 1, s. 141–183.