

MASARYKOVA UNIVERZITA  
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

# Diplomová práce

Brno 2018

Petra Hrozková



MASARYKOVA UNIVERZITA  
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

---



# Studium elektronové struktury fosfosilikátů a jejich silikáto- vých prekurzorů metodou DFT

Diplomová práce

**Petra Hrozková**

Vedoucí práce: doc. Markéta Munzarová Dr. rer. nat.

Brno 2018

## Bibliografický záznam

**Autor:** Petra Hrozková  
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita  
Ústav chemie

**Název práce:** Studium elektronové struktury fosfosilikátů a jejich silikátových prekurzorů metodou DFT

**Studijní program:** Fyzikální chemie

**Obor:** Fyzikální chemie

**Vedoucí práce:** doc. Markéta Munzarová Dr. rer. nat.

**Akademický rok:** 2017/2018

**Počet stran:** ix + ??

**Klíčová slova:** klíčové slovo 1, klíčové slovo 2, ...

## Bibliographic record

**Author:** Petra Hrozková  
Faculty of Science, Masaryk University  
Department of Chemistry

**Title of Thesis:** A DFT study of the Electronic Structure of  
Silicate Precursors for Phosphosilicates

**Degree Programme:** Physical Chemistry

**Field of study:** Physical Chemistry

**Supervisor:** doc. Markéta Munzarová Dr. rer. nat.

**Academic Year:** 2017/2018

**Number of Pages:** ix + ??

**Keywords:** keyword1, keyword2, ...

## **Abstrakt**

This is the abstract of my thesis, which can span multiple paragraphs.

## **Abstract**

This is the English abstract of my thesis, which can span multiple paragraphs.

*Nastavte pomocí klíče «assignment» název PDF souboru s oficiálním podepsaným zadáním práce.*

## **Poděkování**

These are the acknowledgements for my thesis, which can span multiple paragraphs.

## **Prohlášení**

Prohlašuji, že jsem svoji diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím informačních zdrojů, které jsou v práci citovány.

Brno, 6. května 2018

---

Podpis autora



# Obsah

## Seznam tabulek

## Seznam obrázků

# 1 Úvod

Tato práce vznikla za podpory projektů CERIT Scientific Cloud (LM2015085) a CESNET (LM2015042) financovaných z programu MŠMT Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI.

## 1.1 Experimentální motivace

Cílem této práce je podat vysvětlení některých experimentálních jevů, které byly pozorovány u silikofosfátových polymerů. Studium vysoce porézních silikofosfátů je jedním ze zaměření skupiny anorganické a materiálové chemie na našem ústavu. Studie prezentované v této práci se zaměřuje na přítomnost hypervalentního, tj. pěti nebo šesti-koordinovaného křemíku, v jednotlivých strukturách. Obecný pohled na hypervalency poskytuje Rundleovo a Piementelovo schéma, kde se objevují elektronově-bohaté tří-centerní vazby [1] [2].

Amorfní struktura silikofosfátových xerogelů však neumožňuje jejich přímou strukturní charakterizaci. Důležitou součástí práce bylo navržení vhodných strukturních modelů. Modely navržené v této práci byly motivovány rentgenovými strukturními analógickými periodických struktur [3] [4] anebo příbuznými strukturami, které budou dále popsány. Dále byla využita data z NMR spektroskopie, z nichž byly odvozeny informace o výši koordinace křemíku a složení ligandů (fosfátové vs. organické estery) [5]. Druhou součástí práce byl podrobnější pohled na chemickou vazbu ve zvolených modelech silikofosfátových polymerů. Pro analýzu chemické vazby byla použita teorie přirozených orbitalů a Mullikenova populační analýza.


## 1.2 Silikofosfátové polymery


Nejčastější formou výskytu křemíku v přírodě jsou křemičitany, sloučeniny obsahující křemík tetraedricky koordinovaný čtyřmi atomy kyslíku. Existují však i minerály s vyšší koordinací, např. thaumasit [6]. Vzhledem k vysokému významu křemíku v přírodě jsou křemičitany rozsáhle připravovány a studovány i laboratorně. Oxid křemičitý  $\text{SiO}_2$  je po vodě nejvíce studovanou sloučeninou. Díky tomu, že  $\text{Si}^{4+}$

je velikostně snadno zaměnitelný za  $\text{Al}^{3+}$  nebo  $\text{P}^{5+}$ , vznikají pak hlinitokřemičitany, obsahující Si-O-Al (zeolity), nebo fosfokřemičitany, obsahující Si-O-P, tj. silikofosfáty. Obě skupiny sloučenin jsou rozsáhle studovány. Konkrétně silikofosfátové polymery mají zajímavé fyzikální a chemické vlastnosti. Příkladem je Brønstedovská kyselost nebo vysoká protonová vodivost. Několik z možných uplatnění silikofosfátových polymerů mohou být konduktory, elektrolyty, optická vlákna a biokompatibilní materiály.


Silikofosfáty i hlinitokřemičitany jsou charakteristické svojí trojrozměrnou porézní strukturou. Naše pozornost je v této práci soustředěna na silikofosfáty. Předpokládaná struktura připravených silikofosfátů studovaných v předchozích experimentálních pracích je znázorněna na obrázku 1.2 [5]. Charakteristickou vlastností struktur silikofosfátů je uspořádání jednotek Si-O-P do cyklů.

Ačkoliv nejnovější struktura zahrnuje dvanáctičlenové cykly vzniklé trojnásobným opakováním motivu Si-O-P-O (Pinkas et. al. Inorganic Chemistry), struktury s hypervalentním křemíkem obsahují osmičlenné cykly vzniklé dvojnásobným opakováním jednotky Si-O-P-O. Obrázek 1.2 znázorňuje předpokládanou strukturu silikofosfátového xerogelu se třemi druhy křemíkových center (koordinace čtyřmi fosfáty, šesti fosfáty, anebo čtyřmi fosfáty a dvěma organickými estery současně) a osmičlennými cykly Si-O-P. Konkrétní podoba osmičlenného cyklu byla ověřena metodou RTG [4]. Stupeň koordinace křemíku a současně velikost pórů se ukázala být silně závislá na typu prekursoru. Pokud byl ve výchozích sloučeninách jeden z fosfátů nahrazen methylovou skupinou přímo vázanou na křemík, ve výsledném xerogelu se nevyskytovaly oktaedricky koordinované křemíky a velikost pórů byla větší. Konkrétní podobu okolí křemíku je ukázáno ve schématu níže. Koordinační okolí bylo získáno kombinací NMR dat a IR dat [4].






Obrázek 1.1: RTG struktura cyklu Si-O-P-O, [4]; Legenda: ● Si, ● O, ● C, ● P, ○ H.



[5]. Silikofosfátové cykly jsou pak dále organizovány do vyšší struktury skeletu mikroporézního (šířka pórů do 2 nm) až mezoporézního (šířka pórů 2-50 nm). Potvrzená struktura šestikoordinovaného křemíku je uvedena obrázku. Struktura byla získána metodou rentgenové difrakce 1.3 [3].

Konkrétní metody příprav silikofosfátových sloučenin jsou uvedeny například v práci Aleše Stýskalíka.




Obrázek 1.2: Silikofosfátová síť, [5].

### 1.3 Hypervalence p-prvků

První kvantitativní popis chemické vazby zavedl Lewis v roce 1916, kdy vazbu považoval za sdílení elektronového páru mezi dvěma atomy. Cílem párování bylo zaplnění valenční vrstvy a dosažení konfigurace vzácného plynu, tzv. oktetové pravidlo. Pro vodík platí dubletové pravidlo, Pravidlo elektronového oktetu říká, že prvky *p* skupiny chtějí mít ve své valenční vrstvě právě osm elektronů. Toho lze docílit vytvořením chemické vazby, excitací, nebo ionizací. Spárované elektrony, které se neúčastní vazby, se nazývají volné elektronové páry. Přísná lokalizace elektronů s pomocí vazebných orbitálů v Lewisovské teorii ovšem nesouhlasila s pozorování pro organické sloučeniny s uhlíkem. Vysvětlení podal L. Pauling pomocí teorie valenčních vazeb a teorii hybridizace [7].

Podle klasické teorie valenční vazby mohou *p* prvky tvořit čtyři vazby. Z experimentálních pozorování je ale známo, že prvky *p* tvoří i více než je číslo jejich atomových orbitalů, obvykle pět nebo šest. Příkla-



Obrázek 1.3: Struktura silikofosfátu získaná z RTG,[4]; Legenda: ● Si, ● O, ● C, ● P, ○ H.

dem můhou být sloučeniny xenonu, například  $\text{XeF}_6$ . Sloučeniny, kde se vyskytuje jeden nebo více atomů s více než osmi elektrony (oktet) se nazývají hypervalentní/hyperkoordinované. Konkrétně křemík může vytvářet 4-, 5- a 6- koordinované sloučeniny a stát se hypervalentní. Pro vysvětlení hypervalence p-prvků lze použít teorii hybridizace. Obecně se čtyřkoordinované sloučeniny vyskytují jako tetraedry, hybridizace  $sp^3$ . Pětikoordinované sloučeniny tvoří trigonální bipyramidu, hybridizace  $sp^3d$ . A šestikoordinované sloučeniny tvoří oktaedr, hybridizace  $sp^3d^2$ .

Čtyřkoordinovaný křemík splňuje tetraedrické uspořádání. Při zvýšení koordinace na pět by měla být pozorována trigonální bipyramida,  $sp^3d$ . Výskyt  $d$  orbitalu ve vazbě ale způsobuje nárůst energie



vazby na více než 200 kcal/mol. Z tohoto důvodu se předpokládá, že  $d$  orbitály se podílejí pouze na polarizaci orbitalů. Pentavalentní koordinace by měla být realizována jako  $3sp^2$  hybridizace doplněna třicenterní, čtyřelektronovou vazbou  $3c - 4e$  s  $p$  orbitalem. V pěťikordinovaných sloučeninách se ale spíše uvažuje hybridizace  $sp^2$  a jedna vazba  $3c - 4e$  s  $p$  orbitalem, právě kvůli energii  $d$  orbitalů.

Hypervalentní sloučeniny jsou lepší Lewisovské kyseliny díky  $d +$  efektu na centralním křemíku. Důvodem je přesun elektronové hustoty na ligandy skrz nevazebné MO a podpora  $3c - 4e$  vazby. Rozložení elektronové hustoty molekulu stabilizuje a z tohoto důvodu se v hypervalentních sloučeninách vyskytují jako ligandy prvky s vysokou elektronegativitou. Tento jev dobře popisuje tzv. Bentovo pravidlo: "Elektronegativní prvek dává přednost vazbě s větším  $p$ -charakterem." [8].

Pro křemík v koordinaci šest lze také předpokládat, že význam  $d$  orbitalů nebude významný vzhledem k jejich energii. I zde se do vazby zapojí  $3c - 4e$  vazby [9].

Další možnost interpretace hypervalence je založena na vysoké iontovosti vazby na křemíku. Obecně iontovost s koordinačním číslem roste. Navíc chování vazby Si-ligand silně závisí na samotném ligandu a sterickém a elektronovém uspořádání. Hovoříme o Lewisovské kyselosti křemíkové vazby s elektronegativním atomem. Chování křemíku lze rozdělit na iontové, sigma vazebné a donor interakci [9].

## 1.4 Hypervalence sloučenin křemíku

V případě čtyřkoordinovaných sloučenin křemík poskytuje do vazeb všechny své valenční elektrony. Ve vyšším koordinačním stupeni už může křemík poskytnout pouze prázdné orbitály a proto chová se jako Lewisovská kyselina. Obecně mají Lewisovské kyseliny prázdné molekulové orbitály, které leží dostatečně blízko obsazeným MO<sup>1</sup> konjugované báze.

Z experimentu je známo, že  $\text{SiO}_4$  je dostatečnou Lewisovskou kyselinou, aby křemík mohl přímo reagovat s Lewisovskou bazí. Pokud je jeden z kyslíků ve struktuře nahrazen uhlíkem, schopnost navyšovat

1. MO = Molekulový orbital

koordinaci je ztracena. Stejný jev pozoroval Aleš Sýskalík a spol. [5] a to vedlo k hypotéze o snížení Lewisovské kyselosti křemíku při tvorbě přímé vazby Si-C. Naopak pětikoordinovaný křemík je lepší Lewisovskou kyselinou než čtyřkoordinovaný a hypervalency podporuje. Atomy jako uhlík, dusík, kyslík, fluor nebo chlor podporují navyšování koordinace křemíku [9].

Existující, experimentálně připravené hypervalentní sloučeniny s křemíkem lze rozdělit podle jednotlivých ligandů a jejich poloze v periodické tabulce. Křemík je schopen tvořit hypervalentní sloučeniny s fluorem, příkladem může být struktura  $(\text{SiF}_6)^{2-}$  1.4A [10]. Tato struktura byla připravena v 19. století a považuje se za první připravenou sloučeninu křemíku v koordinaci šest. Pokud budeme postupovat ve skupině halogenů dolů, dalším ligandem by měl být logicky chlor. Sloučenina  $\text{SiCl}_6^{2-}$  není známá, naopak  $\text{GeCl}_6^{2-}$  ano. Schopnost atomu tvořit hypervalentní sloučeniny roste ve skupině dolů. Germanium má tedy vysokou schopnost tvořit hypervalentní sloučeniny. Oproti tomu křemík potřebuje ligand s výrazně vyšší elektronegativitou. Hypervalentní sloučeniny s chlorem byly proto připraveny až později, například 1.4B [11].






Ve sloučeninách s křemíkem může být fluor nahrazen dalšími *p* prvky, například kyslíkem 1.4C [12] nebo kyslíkem a vodíkem 1.4H [13]. Jako ligand společně s fluorem může být použit i dusík 1.4D [12] nebo uhlík 1.4E [14].

Schopnost křemíku navyšovat koordinaci existuje i ve sloučeninách s kyslíkem 1.4F [15]. Struktura  $\text{SiO}_6$  se vyskytuje také v přírodě v minerálu thaumasite [6]. Kyslík může být nahrazen dusíkem 1.4I [9] nebo uhlíkem a dusíkem 1.4G [9].

Je zajímavostí, že existují i sloučeniny pouze s vazbou křemík-uhlík 1.4J [16][9].

## 1.5 Formulace teoretického problému

Postupně jsme hlavní otázku, řešenou v této práci, zformulovali do následující podoby: Jaká je souvislost mezi kombinací ligandů na čtyřkoordinovaném Si a Lewisovskou kyselostí těchto čtyřkoordinovaných sloučenin, vedoucí ke sklonu křemíku zvýšit svoji koordinaci na pět nebo šest ligandů. Z tohoto důvod jsme se rozhodli porovnávat



Lewisovskou kyselost, abychom určili stabilitu jednotlivých částí silikofosfátů. Navíc jsme se snažili najít parametr, který by umožnil určit velikost póru v závislosti na okolí křemíku. Pro tuto práci jsem zvolila tři úrovně zkoumání silikofosfátů, rozdělené podle velikosti modelů. Velké modely sloužily jako odhad skutečné struktury silikofosfátů, včetně jednotlivých pórů. Středně velké modely byly stále dost komplexní, ale již umožňovaly podrobnější pohled na chemickou vazbu Si-C. Malé modely byly snadné pro porozumění.

Jako prostředek ke zkoumání silikofosfátů jsem zvolila molekulové orbitály, které poskytují široké spektrum informací o molekule, vazbách, struktuře, kyselosti, ... Analýza byla provedena s pomocí teorie funkcionální hustoty (DFT)<sup>2</sup>, která se řadí mezi kvantově-chemické metody. Pro porovnání byla stejná analýza udělána s pomocí teorie Přirozených molekulových orbitalů (NBO)<sup>3</sup>. Výhoda přístupu NBO je snadnější převod čísel do chemického významu. Pro určení Lewisovské kyselosti bylo stěžejní určení procenta *s* a *p* orbitalů křemíku v antivazebných orbitalech. V NBO analýze jsme určovali procento vazebných orbitalů (BD) ligandu. V MPA analýze jsme určovali procento *s* a *p* orbitalů křemíku a ligandech.

---

2. DFT - Density Functional Theory, česky Teorie funkcionálu hustoty

3. NBO - Natural Bond Orbitals, česky Přirozené Molekulové orbitály

## 2 Metody kvantové chemie

Chování elektronů v molekulách však nelze popsat rovnicemi ani jazykem klasické mechaniky. Elektrony totiž vykazují typické kvantově-mechanické chování, projevují se diskretním spektrem energií, vlnovým chováním ve smyslu difrakce nebo např. fotoelektrického jevu. Nelze je proto charakterizovat jejich jednotlivými polohami a hybnostmi, jediný přijatelný popis lze udělat pomocí tzv. vlnové funkce.

### 2.1 Kvantově-mechanický popis elektronové struktury

Současné chápání struktury, reaktivity a spektroskopického chování úátek je založeno na detailní znalosti rozložení a energií elektronů v atomech a molekulách. Vlnová funkce se zpravidla označuje řeckým písmenem  $\Psi$  a je řešením Schrödingerovy vlnové rovnice 2.1. Levá strana Schrödingerovy rovnice vyjadřuje působení tzv. Hamiltoniánu ( $\hat{H}$ ) neboli operátoru energie na vlnovou funkci  $\Psi$ . Pravá strana Schrödingerovy rovnice vyjadřuje fakt, že lze nalézt takové vlnové funkce  $\Psi$ , které se působením  $\hat{H}$  pouze vynásobí konstantou  $E$ , která má význam energie. Řešením Schrödingerovy rovnice jsou tedy jednak možné hodnoty energie elektronů systému a jednak samotná vlnová funkce  $\Psi$ , která v sobě dle tzv. Bornovy interpretace obsahuje informaci o rozložení pravděpodobnosti výskytu elektronů v prostoru.

$$\hat{H}\Psi = E\Psi \quad (2.1)$$

Analytické řešení Schrödingerovy rovnice jsou dostupná pouze pro velmi malý okruh jednoduchých modelových Hamiltoniánů, jejichž nejdůležitější reprezentaty jsou kvantově chemický oscilátor, částice v jámě, atom vodíku a kation  $\text{H}_2^+$ . Dokonce ani pro atomu helia, který obsahuje pouze o jeden elektron více než atom vodíku, není dostupné plně analytické řešení Schrödingerovy rovnice. Z tohoto důvodu je v fyzikálních i chemických aplikacích nutno použít zjednodušení. Základní aproximací, kterou je třeba aplikovat pro všechny molekuly (včetně zmiňovaného iontu  $\text{H}_2^+$ , pro nějž lze vlnovou funkci elektronu vyjádřit analyticky) je tzv. Born-Oppenheimerova aproximace (B-O) 2.4. Její podstatou je oddělení pohybu elektronů od pohybu jader

a lze ji dobře vysvětlit na základě termodynamické analogie vratného děje. Je-li například expanze plynu proti vnějšímu tlaku prováděna vratně, pohybuje se píst ve válci tak pomalu, že plyn je stále v rovnováze s okolím. Jeho tlak pak závisí pouze na pozici pístu. Podobně se jádra pohybují vzhledem k elektronům tak pomalu, že elektrony zaujmou pro každé rozmístění jader okamžitě nejvýhodnější rozložení. Proto můžeme energii elektronů považovat za závislou pouze na polohách jader. V rámci B-O aproximace lze tedy vlnovou funkci zapsat ve tvaru rovnice 2.4.  $R_\alpha$  a  $r_i$  jsou souřadnice elektronů.  $R_\alpha$  souřadnice jader,  $\Psi_{el}(r_i, R_\alpha)$  je elektronová vlnová funkce, závisící explicitně na polohách elektronů a parametricky na polohách jader,  $\Psi_N(R_\alpha)$  je jaderná vlnová funkce závislá pouze na polohách jader.  $\Psi_N(r_i, R_\alpha)$  je celková vlnová funkce [17]. Vlnová funkce elektronů je řešením Schröngerovy rovnice, jež v operátoru energie zahrnuje pro každý elektron jeho kinetickou energii, přitahování jádry a jeho odpuzování se všemi ostatními elektrony. Posledně jmenovaný člen řídí pohyb každého elektronu závislejícím na pohybu všech ostatních elektronů. V důsledku toho není elektronová Schrödingerova rovnice analyticky řešitelná. Druhou základní aproximací kvantové chemie je přístup, v němž se okamžitá repulze jednoho elektronu s druhým nahrazuje repulzí prvního elektronu v časově rozmazanou distribuci druhého elektronu. Cílem je pak nalézt takové vlnové funkce obou (a všech dalších) jednotlivých elektronů, aby pro jeden elektron byla vlnová funkce tzv. orbital-optimální z hlediska minimalizace celkové energie. Tady například vlnová funkce pro elektron 1 musí být optimální mj. vzhledem k repulzím s elektronem 2 a obráceně, vlnová funkce pro elektron 2 musí být optimální mj. vzhledem k repulzím s elektronem 1. Celková vlnová funkce daného počtu elektronů, která se vyjadřuje jako tzv. Slaterův determinat z obsazených orbitalů, musí být z tohoto hlediska konzistentní sama se sebou, a proto se výše pospaná metoda nazývá Hartee-Fockova metoda selkonzistentního pole (HF-SCF). Vlnovou funkci lze zapsat jako Slaterův determinant, který zaručuje antisymetrii vlnové funkce vůči výměně polohových a

spinových souřadnic. 2.2.

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{n!}} \begin{vmatrix} \psi_1(1)\alpha(1) & \psi_1(1)\beta(1) & \dots & \psi_{n/2}(1)\beta(1) \\ \psi_1(2)\alpha(2) & \psi_1(2)\beta(2) & \dots & \psi_{n/2}(2)\beta(2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \psi_1(n)\alpha(n) & \psi_1(n)\beta(n) & \dots & \psi_{n/2}(n)\beta(n) \end{vmatrix} \quad (2.2)$$

$\psi_i$  jsou prostorové části jednotlivých orbitalů,  $1, 2, \dots, n$  jsou jednotlivé elektrony  $i$ ,  $\alpha(i)$  resp.  $\beta(i)$  jsou spinové funkce těchto elektronů a  $\frac{1}{\sqrt{n!}}$  je normovací konstanta.

Výsledná vlnová funkce se hledá následujícím způsobem: Na počátku výpočtu je zvolena určitá sada orbitalů, která jsou postupně jednotlivě optimalizována v poli elektronové hustoty zbylých orbitalů. Tím získáme novou sadu orbitalů, která se liší od původní sady orbitalů. Celý postup je opakován až do okamžiku, kdy mezi předchozí a následující sadou orbitalů rozdíl v energiích a elektronové hustotě klesnou pod předem zvolenou, dostatečně nízkou mez. Protože jsou výsledné energie vlastními funkcemi tzv. Fockova operátoru, který patří mezi tzv. Hermitovské operátory, jsou vypočítané orbitály  $\Psi_i$  a  $\Psi_j$  příslušející různým vlastním hodnotám energie  $\varepsilon$  a  $\varepsilon_j$  orthogonální, tj. platí rovnice 2.3. Navíc lze zajistit, aby byly orthogonální každé dvě vlnové funkce příslušející stejné vlastní hodnotě energie  $\varepsilon$ , a také, aby každá vlnová funkce  $\varphi_i$  tj. 2.3.

$$S_{ii} = \int \psi_i * \psi_i dx dy dz = 1 \wedge S_{ij} = \int \psi_i * \psi_j dx dy dz = 0 \quad (2.3)$$

$$\Psi_{r_i, R_\alpha} = \Psi_{electronic}(r_i, R_\alpha) \cdot \Psi_{nuclear}(R_\alpha) \quad (2.4)$$

Nejnižší energie se hledá pomocí selfkonzistentní metody (viz. výše). Nevýhoda HF-SCF přístupu je fakt, že neuvažuje korelaci elektronového pohybu, tj. fakt, že vybraný elektron nevnímá ostatní elektrony v jejich časově zprůměrovaném rozložení, nýbrž že vnímá okamžité polohy ostatních elektronů a přizpůsobuje jim svoji polohu.

Korelační energii lze vyjádřit jako rozdíl mezi přesnou nerelativistickou energií a HF limitou tzv. Hartree-Fockovou limitou, což je je energie Slaterova determinant, vyjádřeného v limitě nekonečné báze.

Ačkoliv korelační energie představuje méně než 1% celkové tzv. energie elektronů, nemůže být zanedbána, pokud požadujeme chemickou přesnost tj. 1 – 2 kcal/mol. Korelační energii lze do výpočtu zahrnout tak, že výsledná vlnová funkce obsahuje mimo Slaterův determinant pro základní stav také příspěvky Slaterových determinantů pro excitované stavy. Hovoříme pak o Post-Hartree-Fockových metodách. Mísením excitovaných determinantů lze započítat třemi základními způsoby. Předně jde o tzv. metodu konfigurační interakce (CI)<sup>1</sup>, v níž jsou příspěvky excitací optimalizovány pomocí variační metody. Jiným možným způsobem započtení excitovaných determinantů je poruchová teorie zavedená Møllerem a Plessetem. Poslední (a v reálné praxi nejpřesnější) metodou zahrnutí korelace pohybu elektronů prostřednictvím jejich excitací do protivazebných MO je tzv. metoda spřažených klastrů. Její výhoda oproti CI je její správné škálování s velikostí systému díky tomu, že jednotlivými excitacemi zahrnuje i jejich superpozice.

## 2.2 Teorie funkcionálu hustoty

Systémy studované v této práci mají za cíl modelovat trojrozměrnou silikofosfátovou síť. Skládají se tedy ze silikátových a fosfátových jednotek, z nichž na každou připadá cca. 50 elektronů. Je proto velice důležité zvolit metodu, která bude spojovat vysokou přesnost s vysokou výpočetní efektivností. Současně je našim cílem porozumění sklonu křemíku k hypervalenci, což indikuje pokud možno fyzikálně průzračný jednoelektronový model. Všechny tyto požadavky splňuje Kohn-Shamova formulace metody funkcionálu hustoty<sup>2</sup>[18].

Základní myšlenka teorie funkcionálu hustoty pohlíží na systém elektronů a jader ze zcela jiného úhlu než tradiční *ab initio* metody kvantové chemie, zahrnující metodu HF-SCF a její nadstavby. Posledně zmíněné metody zahajují popis molekuly od znalosti tzv. externího potenciálu (nejčastěji daného polohami a náboji jader) a pokračují přes konstrukci Hamiltoniánu, nalezení energií a vlnových funkcí až k výpočtu výsledné elektronové hustoty.

1. Configuration Interaction

2. Z matematické analýzy je funkcionál operátor zobrazení z množiny funkcí do množiny obecně komplexních čísel.



Základní teoremy metody funkcionálu hustoty (1. a 2. Hohenberg-Kohnův teorém) ukazují, že lze postupovat i opačně. Výsledná elektronová hustota zpětně jednoznačně určuje externí potenciál, a tedy i vlnovou funkci a všechny z ní odvozené měřitelné vlastnosti. Protože je elektronová hustota funkcí pouze tří souřadnic v prostoru (a nevztahuje se narozdíl od vlnové funkce k jednotlivým elektronům), lze metody funkcionálu hustoty využít k výpočtům, které jsou do výpočetní náročnosti srovnatelné s metodou HF-SCF, ale co do přenosti popisu metodu HF-SCF dalece převyšují. [19]

Moderní DFT metody se začaly objevovat po roce 1964 jako výsledek Hohenberg-Kohnův teorémů. Aplikace v kvantově-chemických výpočtech se datují až od 90. let. Prvním Hohenberg-Kohn teorém (H-K) mluví o základním stavu. "Vnější potenciál  $V_{ext}$  je až na konstantu jednoznačným funkcionálem  $\rho(\vec{r})$ , protože  $V_{ext}$  určuje  $\hat{H}$ , je úplný popis mnohačasticového základního stavu jednoznačným funkcionálem  $\rho(\vec{r})$ ." [20] První H-K teorém můžeme schématicky vyjádřit takto:

$$\rho_0 \Rightarrow \{N, Z_A, R_A\} \Rightarrow \hat{H} \Rightarrow \Psi_0 \Rightarrow E_0 \quad (2.5)$$

Všechny vlastnosti základního stavu mnohaelektronového systému jsou tedy jednoznačně určeny elektronovou hustotou.

Návodem pro získání elektronové hustota je druhý teorém. Obsahem druhého H-K teorému je tedy variační princip, který lze v našem kontextu vyjádřit následovně.

$$E_0 < E[\tilde{\rho}] = T[\tilde{\rho}] + E_{Ne}[\tilde{\rho}] + E_{ee}[\tilde{\rho}] \quad (2.6)$$

Kde  $\tilde{\rho}(\vec{r})$  je zkušební hustota, splňující vazbené podmínky.

Pro výpočetní chemii mají větší význam Kohn-Shamovy orbitály, které byly výsledkem geniální myšlenky o rozdělení funkcionálu. Obecně je největší problém vyjádřit kinetickou energii elektronů. Ta se rozpadla na dvě části. Exaktní a korekční část.

$$E(\rho(\vec{r})) = T_s[\rho(\vec{r})] + J[\rho(\vec{r})] + \int V_{EX}(\vec{r})\rho(\vec{r})d\vec{r} + E_{XC}[\rho(\vec{r})] \quad (2.7)$$

[19][21]

$$T_s = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \langle \psi_i | \nabla^2 | \psi_i \rangle \quad (2.8)$$

Kinetická energie  $T_s$  ale není přesným vyjádřením kinetické energie. Chybějící část je zajištěna  $E_{EX}[\rho(\vec{r})]$ , výměnná-korelační energie.  $J[\rho(\vec{r})]$  je přesná Coulombovská repulze.  $\int V_{EX}(\vec{r})\rho(\vec{r})d\vec{r}$  je přesná energie atrakce elektronů jádru [22].

### 2.2.1 DFT metody v praxi

Největším problémem při aplikaci DFT je nalzení vhodného výměnné-korelačního potenciálu. V principu přesný KS přístup neříká nic o tom, jak výměnné-korelační potenciál nalézt. Existují dva způsoby hledání tohoto parametru. První hledá vhodný  $E_{EX}$  z teorie, jedná se o čistý *abinito* přístup. Druhý přístup hledá parametry pro  $E_{EX}$ , které lze určit z experimentálních dat.

První přístup se označuje jako Aproximace lokální hustoty(LDA<sup>3</sup>) a vychází z modelu homogenního elektronového plynu. Jedná se o hypotetický stav, kde se elektorny pohybují na kladném pozadí a celkový náboj je neutrální. Celý prostor se rozdělí na jednotky objemu a elektronová hustota se počítá vždy ve středu tohoto objektu. Celkovou energii najdeme jako součet přes všechny objemy. Tento model je vhodný pro jednoduché kovy, například sodík. S jeho pomocí lze popsat valenční elektorny v kovech. Význam LDA modelu je, že je to jediný systém, pro který známe přesně  $E_{EX}$  část. Vylepšením LDA modelu je oddělená práce s elektronovou hustotou elektronů se spinem  $\alpha$  a  $\beta$ , označováno jako LSDA, Local Spin Density Approximation. Nevýhodou je, že obě metody nelze dobře použít pro nehomogenní elektrostatické pole molekul a chemických reakcí.

Druhým přístupem je metoda gradientu hustoty (GGA - Generalized Gradient Approximation). S pomocí Taylorova rozvoje lze z lokálního hodnoty elektronové hustoty v daném objemu získat gradient hustoty  $\nabla\rho(\vec{r})$ , výměnný-korelační funkcionál má obecný tvar. Nejvýznamější funkcionály je Beckeho výměnný funkcionál s jedním parametrem. Další známý je LYP nebo BLYP. Práce GGA funkcionály vedly k rozšíření DFT v kvantové chemii.

Třetí významnou skupinou funkcionálů jsou hybridní funkcionály. Hybridní funkcionály jsou kombinací čistého DFT přístupu a přesné HF výměny. Nejznámějším funkcionálem je B3LYP, navržen v roce

3. LDA = The Local Density Approximations

1994. Funkcionál B3LYP je dodnes považován za univerzální a nejpoužívanější funkcionál. Nachází využití v mnoha chemických aplikacích [21].

### 2.2.2 Spektroskopické vlastnosti atomů a molekul

Kvantově-mechanické metody popsané výše lze využít k výpočtu dovolených hladin energie a jim odpovídajících vlnových funkcí. Z vlnových funkcí ale dle postulátů kvantové mechaniky vyplývají všechny pozorovatelné vlastnosti systému, tedy například odpověď na vnější magnetické pole. Externí magnetické pole  $\vec{B}_0$  totiž interaguje s orbitalními momenty hybnosti jednotlivých elektronů. Tím se vytváří dostatečné magnetické pole  $\delta\vec{B}$  působící na jádro. Přídavné pole  $\delta\vec{B}$  odpovídá vnějšímu poli  $\vec{B}$  vztahem:

$$\delta\vec{B} = -\sigma\vec{B}_0 \quad (2.9)$$

kde  $\sigma$  je tzv. stínící konstanta (většinou kladá, někdy však záporná) [23].

$B_0$ , které je reprezentováno vektorovým potenciálem tohoto pole. V ideálním případě by neměla mít volba počátku tohoto pole vliv na výsledek. Jedním z důsledků aproximace v kvantové chemii je fakt, že volba počátku výrazně ovlivňuje výsledné chemické stínění. Problém se nazývá „Gauge origin problem“. Metoda GIAO (Gauge Including Atomic Orbitals) řeší problém způsobem, že zahrnuje počátek vektorového potenciálu do atomových orbitalů. Vhodnou bazí pro tyto výpočty je IGLO–III [24] (Individual Gauge for Localized Orbitals) [25].

## 2.3 Báze v kvantově chemických výpočtech

Základním přístupem pro hledání molekulových orbitalů je metoda MO-LCAO, která je založena na postulátu o úplnosti systému vlastních funkcí. Podle postulátu QM o úplných vlastních hodnotách úplných Hermitovských operátorů lze každý molekulový orbital sestavit jako lineární kombinaci atomových orbitalů, tzv. LCAO<sup>4</sup>. Jednotlivé molekulové orbitály jsou hledány jako lineární kombinace atomových

4. LCAO - Linear Combination of Atomic Orbitals.

orbitalů.

$$\Psi_i = \sum_{v=1}^K c_{vi} \cdot \phi_v \quad (2.10)$$

$\Psi_i$  je  $i$ -tý molekulový spinorbital,  $\phi_v$  je bázová funkce a  $c$  je rozvojový koeficient, získají se výpočtem SCF procedury. Protože jsou však atomové orbitály pro praktické výpočty příliš složitými matematickými funkcemi (například kvůli složité struktuře radiálních uzlů), nevstupují do výpočtu přímo, ale jsou v něm rozloženy do sady buď tzv. Slaterových orbitalů (STO), nebo Gaussovských orbitalů (GTO). Samotné STO nemají radiální uzly a jejich násobení není lineární. 2.11 [19].

$$\chi_{\zeta,n,l,m}(r, \theta, \varphi) = N Y_{l,m}(\theta, \varphi) r^{n-1} e^{-\zeta r} \quad (2.11)$$

$$\chi(r) = N r^n e^{-a(r-r_A)^2} \quad (2.12)$$

Naopak součin GTO je stále GTO. Výhodou STO je vhodné chování v blízkosti jádra. GTO mají v jádře nulovou derivaci, tento problém lze řešit pomocí zahrnutí většího počtu primitivních gaussiánů. Obvyklý tvar funkce.

$$\phi_\mu = \sum_{i=1}^N d_{i\mu} e^{-\alpha_{i\mu} f_\mu^2 r^2} \quad (2.13)$$

$N$  je počet primitivních funkcí,  $d$  je kontrakční koeficient,  $\alpha$  je exponent,  $f$  je škálovací faktor. Úplné vyjádření MP pomocí AO vyžaduje úplný, tj. nekonečně velký systém AO, a rozvinuté AO do STO nebo GTO vyžaduje v principu nekonečně velkou sadu těchto tzv. bázových funkcí.

Nejmenší smysluplnou sadou bázových funkcí je ta, která obsahuje jeden STO na každý orbital příslušného atomu, který může být v základním stavu obsazen. Například pro uhlík je touto nejmenší sadou - tzv. minimální bazí množina STO reprezentující orbitály  $\{1s, 2s, 2x, 2y, 2z\}$ . Pro přesnější popis chování atomů a molekul je výhodné použít rozšířené bázové funkce. Vzhledem k lepšímu matematickému chování GTO jsou STO vyjádřeny jako kombinace  $n$  primitivních gaussiánů [26]. Double Zeta (DZ) používá dvoujnásobný počet bázových funkcí než minimální báze. Triple Zeta trojnásobný počet bazí než minimální báze. Další kategorií jsou Split valence báze, příkladem je Poplový bazí 6-31G. Každý nevalenční orbital je šesti a každý valenční orbital je popsán primitivními gaussiány dvěma skupinami - jedním a třemi

gaussiany. Nadstavbou ještě bývají polarizační báze, které obsahují funkce pro  $d$  (pro  $p$  prvky) nebo  $p$  (pro vodík) orbitály. Popisují polarizaci elektornového obalu v důsledku působení ostatních jader atomů.

Poslední zmíněnou možností pro popis elektrů v systému je model efektivního jaderného pseudopotenciálu. Jedná se o nahrazení core elektronů celkovým tzv. pseudopotenciálem. Výpočet pro systém s velkým počtem core, vnitřních, elektronů, je časově náročný a zároveň s rostoucí velikostí jádra stoupá i vliv relativistických efektů. Pro atomy od 5. periody (In, Sn, Sb, I, Xe) už je zahrnutí relativistických efektů nezbytností pro správný popis chování. Pro přesný popis molekul je efektivní jaderný potenciál nezbytný zařadit od 4. periody.

Další uplatnění ECP je pro velké systémy s příliš mnoho elektrony, v našem případě silikofosfáty. Modelované silikofosfáty obsahují velké množství prvků 3. periody a tedy i velké množství elektronů. Právě velký počet elektronů navyšuje výpočetní náročnost systému. Z pohledu studia chemické vazby u silikofosfátů je možno vliv core elektronů na vlastnosti vazeb považovat za méně důležitý a proto lze použít model ECP. Výhodou přístup ECP je fakt, že v sobě zahrnuje i relativistické efekty na struktury, které ovlivňují délku zkoumaných vazeb a popis je díky němu přesnější.

## 2.4 Interpretace kvantově chemických výpočtů

Řešením Schrödingerovy rovnice získáváme hladiny energie a příslušné vlnové funkce. Mnohaelektronová vlnová funkce je však příliš složitým objektem pro obvyklou chemickou interpretaci. Ta vychází z míry kovalence resp. iontovosti jednotlivých vazeb, jejich síly resp. násobnosti nebo asymetrie rozložení náboje, popř. elektrostatickým potenciálem. Pro analýzu charakteru vazeb i rozložení náboje v molekule je v současnosti využívají dvě možná schémata populační analýzy. První z nich je založeno na tzv. kanonických Hartree–Fockových popř. (u metody DFT) Kohn–Shamových orbitalů. Jejich typickým rysem je fakt, že jsou zpravidla delokalizovány přes několik atomových center, tj. odpovídají nikoli dvojici, ale větší skupině atomů spojených vazbou. Jejich charakter se pak analyzuje pomocí Mullikenovy populační analýzy, která je popsána níže. Druhé schéma analýzy vazeb vychází

z tzv. přirozených vazebných orbitalů, které jsou taky rozebrány níže. Populační analýzu, MPA i NBO, lze použít pro analýzu chemických vazeb a následné reaktivity sloučenin. Pokud jsou orbitály již zapojené do vazby, tak již prostor pro zapojení do další vazby v chemické reakci je minimální. Proto lze z populační analýzy sloučenin určit chemickou reaktivitu. Druhým přístupem pro posouzení chemické reaktivity je teorie tvrdých a měkkých kyselin a zásad, která vychází z experimentálních pozorování.

### 2.4.1 Tvrdost a měkkost kyselin a bází

Z experimentálních pozorování je známý fakt, že určité kyseliny reagují přednostně s určitým typem bází. Na základě toho byly kyseliny a báze rozděleny na tzv. tvrdé a měkké. S pomocí analýzy globální tvrdosti/měkkosti kyselin a bází může být predikován produkt reakce a jeho stabilita. Myšlenka HSAB (Hard and Soft Acids and Bases) lze použít i pro odhadnutí tvořit hypervalentní molekuly. HSAB teorie říká, že tvrdá kyselina a tvrdá báze spolu poskytnou stabilní komplex, naopak slabá kyselina a slabá báze spolu poskytnou méně stabilní komplex. Z toho vyplývá, že ze znalosti reakčních podmínek a příslušné tvrdosti lze predikovat stabilitu vzniklého komplexu. Jeden z možností kvantitativního určení tvrdosti/měkkosti je určení parametrů  $\chi$  2.14 a  $\eta$  2.15 [27]. Způsob, jak vypočítat parametry  $\chi$  a  $\eta$  je určen tzv. Koopmansovým teorém. Tato aproximace nejprve předpokládá, že Hartree-Focků nebo Kohn-Shamův přístup popisuje systém dostatečně. V druhém kroku dochází k zanedbání relaxace elektronů při odevzdání jednoho elektronu z HOMO orbitalu. Díky této aproximaci lze parametry  $\chi$  a  $\eta$  vypočítat jako rozdíl energií HOMO a LUMO orbitalů. Tento výpočet

$$\chi = - \left( \frac{\delta E}{\delta N} \right) = \frac{IP + EA}{2} = -\mu \quad (2.14)$$

$$\eta = \frac{1}{2} \left( \frac{\delta \mu}{\delta N} \right) = \frac{1}{2} \left( \frac{\delta^2 E}{\delta N^2} \right) = \frac{I - A}{2} \quad (2.15)$$

$\chi$  je absolutní elektronegativita <sup>5</sup>,  $\mu$  je chemický potenciál,  $E$  je energie a  $N$  je počet elektronů [28]. Podle Koopmansova teorému platí  $E_{HOMO} = -IP$ ,  $IP$  je ionizační potenciál a  $E_{LUMO} = -EA$ ,  $EA$  je elektronová afinita [29].  $\eta$  je atomová tvrdost <sup>6</sup> [30]. Tvrdá kyselina a báze je charakterizována velkým rozdílem  $IP$  a  $EA$ , což se projeví jako vysoké hodnoty  $\chi$  a  $\eta$ . Při znalosti  $E_{HOMO}$  a  $E_{LUMO}$  lze predikovat ochotu reakčního centra interagovat s námi zvoleným reagentem a zároveň odhadnout stabilitu vzniklého komplexu. Systémy s velkým rozdílem  $E_{HOMO}$  a  $E_{LUMO}$  jsou tvrdší, stabilnější a méně reaktivní [28]. Hodnoty  $\eta$  a  $\chi$  byly použity v této práci pro určení tvrdosti a měkkosti silikofosfátových produktů.

Globální tvrdost a měkkost uvedená výše může být použita pro celou molekulu. Při podrobnějším pohledu na jednotlivé atomy lze získat tvrdost a měkkost lokální. Tuto vlastnost lze interpretovat jako lokální náboj na jednotlivých atomech. Určení lokálních vlastností je obtížné, protože jsou spojeny s Fukuiho rovnicí. Ty popisují, který atom v molekule přijme nebo ztratí elektron. Chemická interpretace je schopnost nukleofilního nebo elektrofilního útoku. Stejně dobře to popíše externí elektrické pole a polarizace. Toto je přímo spojené s elektronovou hustotou a DFT metodami.

Elektrofilita atomu A v molekule M s N elektrony.

$$f_A^+ = P_A(N+1) - P_A(N) \quad (2.16)$$

Nuklefilita atomu A v molekule M s N elektrony.

$$f_A^- = P - A(N) - P_A(N-1) \quad (2.17)$$

Radical attack susceptibility of atom A in molecule M with N electrons.

$$f_A^0 = \frac{1}{2}[P(N+1) - P_A(N-1)] \quad (2.18)$$

Přístup lokální tvrdosti a měkkosti je další úroveň pohledu na chemickou reaktivitu molekul. Z časových důvodů ale nebyla tato analýza v této práci provedena a bude předmět dalšího výzkumu v oblasti silikofosfátů.

5. Elektronegativity byla Paulingem definována pomocí ionizačního potenciálu a elektronové afinity

6.  $\eta = \frac{1}{\sigma}$ ,  $\sigma$  je měkkost atomu

### 2.4.2 Mullikenova populační analýza

### 2.4.3 Přírozené orbitály (tzv. Natural Bond Orbitals)

Jedná se o orbitály přírozené v tom smyslu, že jsou nejvhodnějšími vychozími orbitály pro započtení elektronové korelace tím, že diagonalizují tzv. jednočásticovou matici hustoty. Lze pracovat s jejich delokalizovanými nebo lokalizovanými variantami. Druhý přístup je mnohem častěji využíván a je aplikován i v této práci [31]. Přírozené molekulové orbitály<sup>7</sup> jsou užitečné nástrojem analýzy a interpretace vazebných i spektroskopických vlastností molekul. Koncept přírodních orbitalů navrhl v roce 1955 Per-Olov Löwdin jako výsledek tzv. Löwdinova-orthogonalizačního algoritmu pro jednočásticovou matici hustoty. Výsledkem tohoto procesu jsou jednak vlastní funkce - tzv. přírozené orbitály - a jednak příslušné vlastní hodnoty - tzv. obsazovací čísla. Přírozené orbitály jsou i v praxi hledány pomocí postupné transformace AO → NAO → NHO → NBO → NLMO, tj. z atomových orbitalů se vytvářejí přírozené atomové orbitály, z nich prostorově lokalizované přírozené hybridní orbitály, z nich dále přírozené orbitály a konečně přírozené lokalizované orbitály. Tuto proceduru lze použít jak pro metodu Hartree-Focka a nadstavby na ní založené, tak pro přístup DFT. Kohn-Shamovy orbitály jsou ideálním východiskem pro transformaci do NBO, mj. proto, že (i přes četná nesprávná tvrzení v literatuře) je fyzikální význam Kohn-Shamových orbitalů hlubší než význam Hartree-Fockových orbitalů. [ODKAZ?]

---

7. NBO - Natural Bond orbitals



### 3 Výsledky a diskuze

Následující část byla rozdělena do čtyř oddílů. První část shrnuje výpočetní detaily. Druhá část se zabývá vypočtenými strukturami, třetí část dává podrobnější pohled na vazby ve zvolených strukturách a čtvrtá, poslední, část se zaměřuje na chemický posun v NMR.

#### 3.1 Výpočetní detaily

Modely, pro jejichž prozkoumání jsme se rozhodli, byly na základě konektivity jednotlivých atomů zaneseny do vstupu programu Avogadro. V programu Avogadro byly struktury předoptimalizovány předvolenou molekulovou mechanikou [32]. Získané struktury byly plně optimalizovány metodou B3LYP [33] s bazí 6-31G\* v programu Gaussian, verze ES64L-G09RevD.01 24-Apr-2013 [25]. Pro malé modely byly ve dvou případech přidány speciální volby Opt=CalcFC a SCF=Vshift. Klíčové slovo CalcFC zajišťuje výpočet silových konstant v počátečním bodě stejnou metodou a bazí, v nichž probíhá samotná optimalizace. Předvolba totiž stanovuje, že původní odhad silových konstant je prováděn pomocí jednoduchého silového pole (tj. klasickou mechanikou). Druhé klíčové slovo SCF=VShift[N] pomáhá s nalezením vlnové funkce v případě systémů s malým energiovým rozdílem mezi energií HOMO a LUMO orbitalů. Na začátku procesu SCF jsou všechny virtuální orbitály posunuty v energii o  $N \cdot 0,0001$  miliHartree nahoru a v závěru výpočtu jsou jejich energie vráceny zpět. My jsme použili výchozí nastavení  $N=-1$ . Pro analýzu NMR parametrů byla použita speciální báze IGLO [34] a klíčové slovo nmr [25].

Pro střední modely bylo postačující základní nastavení. Optimalizace velkých modelů byla již časově poměrně náročná. Například krystalová struktura bez náboje obsahovala 349 elektronů a bylo potřeba 1309 bazových funkcí pro optimalizaci s B3LYP a funkcionálem 6-31G\*. Z tohoto důvodu byly vlekové modely nejprve předoptimalizované stejnou metodou jako menší modely (B3LYP), ale s využitím kvazirelativistického efektivního jaderné pseudopotenciálu pro implicitní zahrnutí vnitřních elektronů, klíčové slovo Pseudo=Read. Ve druhém kroku optimalizace již byl proveden výpočet se zahrnutím všech elektronů v

bázi 6-31G\*.

### 3.1.1 Populační analýza


Pro získání orbitalů pro Mullikenovu populační analýzu byla použita menší báze 3-21G, funkcionál B3LYP. Populační analýzy založené na rozkladu do bazových funkcí jsou totiž nejužitečnější pro porovnání trendů u distribucí elektronové hustoty s použitím malých nebo středně velkýchází, které obsahují relativně kontrahované funkce [19]. Pro NBO analýzu byla použita implementace NBO3 v programu Gaussian, Gaussian NBO Version 3.1; verze Gaussianu AS64L-G09RevD.01 24-Apr-2013. Volbou

```
$NBO ARCHIVE FILE=NAME $END
```

byl získán soubor NAME.47, který sloužil jako vstup do programu NBO6.0. Přidáním klíčového slova *PLOT* do NAME.47 a použitím programu NBO6.0 byly získány soubory NAME.31 až NAME.46. Pro vykreslení přirozených orbitalů programem NBO6View byl použit soubor NAME.37 [35].

## 3.2 Vypočtené struktury

Struktury pro výpočetní část jsou rozděleny podle velikosti, podle stupně koordinace křemíku a podle množství cyklů ve strukturách. Naší snahou při tvorbě modelů bylo co nejlépe modelovat možná koordináční okolí křemíku v amorfních strukturách, pro něž nejsou dostupná přímá strukturní data. Vycházeli jsme z nepřímých strukturních dat: chemických posunů křemíku (stupeň koordinace křemíku) a vibračních spekter (informace o atomech vázaných na křemík). Dále jsme využili přímá strukturní data pro strukturně podobné, avšak krystalické systémy: [3] [36]. Malé struktury měly za cíl podrobnou analýzu vazby křemík-uhlík ?? (acetoxymethyl)trifluorosilan sloužil pro porovnání s ostatními modely křemíku. Existuje v něm přímá vazba na uhlík a zároveň jsou kolem vysoce elektronegativní fluory. Jak bylo zmíněno v kapitole 1.4, křemík je ochotný navyšovat koordinaci s vysoce elektronegativními ligandy. Zároveň je (acetoxymethyl)trifluorosilan schopen tvořit intramolekulární vazbu s Si-O a tím




Obrázek 3.1:  $\text{SiCH}_3(\text{OCH}_3)_5$  Výchozí rentgenové struktury; Legenda:  
 ● Si, ● O, ● C, ● P, ○ H

navýšit koordinaci křemíku na pět. Tyto struktury jsou experimentálně pozorovány a nazývají se dragonoidy [37]. Modely střední velikosti reprezentovaly širší okolí křemíku ?? a už obsahovaly cykly, prozatím bez síťování, které je pro silikofosfáty typické.

Model  $\text{SiCH}_3(\text{PO}_4)\text{CH}_3(\text{SiP}_2\text{O}_{10})(\text{CH}_3)_4$  obsahoval jeden cyklus, volně navázaný fosfát a přímou vazbu křemík-uhlík. Model  $\text{Si}(\text{P}_2\text{SiO}_{10}(\text{CH}_3)_4)_2$  už obsahoval dva cykly, které byly pozorovány v silikofosfátových polymerech. Jednalo se o nejmenší model, který už obsahoval dva cykly.

Poslední část, velké modely, se věnovaly již pouze hypervaletnímu křemíku. Zde je klíčové zmínit, že naše modely byly pouze výseky z rozsáhlých struktur polymerů a chyběla stabilizace okolními atomy. Z tohoto důvodu byla snaha zachování neutrálního náboje pro všechny struktury. Výjimku tvořila původní rentgenová struktura křemíku [3], která byla připravena jako aniont. Výchozí strukturou byla struktura z rentgenové analýzy [3] ?? . V tomto modelu je křemík oblopen šesti




Obrázek 3.2:  $\text{Si}(\text{OCH}_3)_4$  Výchozí rentgenové struktury; Legenda: ● Si, ● O, ● C, ○ H

fosfáty, které jsou vzájemně zesíťované přes další čtyřkoordinované křemíky. Přítomnost osmičlenného cyklu v silikofosfátech byla potvrzena rentgenovou strukturou [rtg\_4] a dále podle ní byly vytvářeny cykly v dalších modelech. Z tohoto modelu vycházely všechny ostatní velké struktury se šestikoordinovaným křemíkem. V experimentálních strukturách silikofosfátů byly pozorovány krom fosfátových skupiny tak různé acetátové skupiny. Právě přítomnost acetátových skupin měla vliv na chování křemíku a jeho sklon k hypervalenci. Acetátové skupiny se v okolí struktruáchkřemíku vždy vyskytovaly po dvou a tento jev byl dodržen i v modelových strukturách. Zvolila jsem dvě možnosti umístění acetátových skupin. První případě se acetylové skupiny vůči sobě vyskytovaly v poloze trans ??, ve druhém případě se vysvytovaly v poloze cis ?. Při modelování silikofosfátů s acetátovými skupinami v polohách cis a trans jsme vycházeli z uspořádání v původní rentgenové struktuře. Naší snahou bylo zachování původních šesti cyklů. Proto v prvním kole optimalizace bylo ponecháno šest cyklů a dvě fosfátové skupiny nahrazeny acetátovými. Tento model měl problém s vazebným úhlem na atomech 50-11-52 a torzním úhlu na atomech 52 - 11 - 50 - 51 a 50 - 11 - 52 - 54. Jako řešení situace jsme zvolili odstranění dvou cyklů a uvolnění napětí. Počet dva byl zvolen z důvodu zachování symetrie. Uvolněná struktura silikofosfátu s acetáty v poloze trans byla opět optimalizována, tentokrát s pseudopotenciál-

lem z důvodu velikosti struktury. Výsledek z druhé řásti optimalizace s pseudopotenciálem a potom B3LYP/6-31G\*.

Pro model silikofosfátu s acetátem v poloze cis byla situace obdobná. Výchozí strukturou byl původní model z rtg, kde byl fosfát nahrazen acetylem. Toto uspořádání opět vedlo k přílišnému napětí na cyklech a z tohoto důvodu byla provedena stejná operace, jako pro model s acetátem v poloze trans. V modelu silikofosfátu s acetátem v poloze trans byly odstraněny nejprve dva cykly a následně ještě jeden, protože struktura stále vykazovala špatné torzní úhly. Výsledná struktura silikofosfátu s acetátem v poloze trans obsahovala pouze tři kruhy s acetáty v ekvatoriální rovině a jeden volný fosfát, také v ekvatoriální rovině. Pro strukturu s acetátem v poloze cis bylo nutno odstranit celkově čtyři cykly a výsledný počet cyklů v molekule byl dva. Acetáty byly umístěné v ekvatoriální rovině stejně jako volný fosfát.

Další koordinací, která byla experimentálně pozorována v silikofosfátech byl křemík v koordinaci pět. Tento typ nebyl příliš častý, ale jeho přítomnost je známá z IR. Proto jsem také pětikoordinovaný křemík zařadila do analýzy. První návrh struktury silikofosfátu v koordinaci pět byl získán od prof. Pinkase (soukromé sdělení), Ústav Anorganické chemie, MU. Tento model obsahoval křemík v koordinaci pět a celkový počet cyklů byl pět. Toto uspořádání vedlo k špatnému úhlu na atomech 1 - 5 - 9 a větší části špatných torzních úhlů, příkladem může být špatný torzní úhel na atomech 3 - 1 - 5 - 9. Vzhledem k lichému počtu cyklů ve struktuře pětikoordinovaného křemíku byla otázka odstranění cyklů složitější a to především díky snaze zachovat symetrii v systému. Byly zvoleny dva přístupy. První model obsahoval tři cykly a volný fosfát, zde byl špatný vazebný úhel na atomech 1 - 3 - 8. Druhý model obsahoval pouze dva cykly a jeden fosfát, zde došlo k chybě ve vazebném úhlu na atomech 1 - 2 - 7. Nalezení správné struktury s křemíkem v koordinaci pět pomohla rentgenová struktura v článku [38] ?? . Další model pětikoordinovaného křemáku byl inspirován touto rentgenovou strukturou a fosfát byl nahrazen vodíkem. Jako správné řešení se nakonec ukázalo snížení náboje z nuly na -1. Původní snaha zachování neutrálního náboje modelových struktur silikofosfátů vycházela z předpokladu, že samotné amorfní struktury jsou neutrální. V případě pětikoordinovaného křemíku a ale náboj způsobil nerovnoměrnosti v systému. Snížení náboje o jedna vedlo k




Obrázek 3.3:  $\text{SiCH}_3(\text{OCH}_3)_5$  Výchozí rentgenové struktury; Legenda:  
 ● Si, ● O, ● C, ○ H

získání správné struktury, kde se nacházely dva cykly a jeden volný fosfát.


### 3.2.1 Malé modely

Malé modely podávají podrobnější pohled na charakter vazby Si-C. Obrazky struktur jsou uvedeny na obrázku ???. Pro strukturu  $\text{SiCH}_3(\text{OCH}_3)_5$  ?? bylo nutno použít klíčové slovo Opt=CalcFC. Pro strukturu  $\text{Si}(\text{OCH}_3)_6$  ?? byl použit parametr SCF=Vshift. Pro NBO analýzu byly brány HOMO orbitály. Přehled výsledků z analýzy NBO je uveden v tabulce ??.

Na základě experimentální práce Aleše Stýskalíka jsem se zabývala křemíkem v koordinaci čtyři, který sloužil jako výchozí reaktant pro přípravu silikofosfátových polymerů.



Obrázek 3.4: Přehled malých struktur; Legedna:  $\bullet$  Si,  $\bullet$  O,  $\bullet$  C,  $\bullet$  Cl,  $\circ$  H



Obrázek 3.5: Přehled malých struktur; Legenda:  $\bullet$  Si,  $\bullet$  O,  $\bullet$  C,  $\bullet$  F,  $\bullet$  Cl,  $\circ$  H



Tabulka 3.1: HSAB analýza malých molekul


	EH	EL	X	n
si_och3_4	-7,389	1,442	2,974	4,416
si_och3_6	3,112	9,625	-6,369	3,256
si_ch3_och3_3	3,089	10,089	-6,589	3,500
si_ch3_och3_5	3,089	10,089	-6,589	3,500

### 3.2.2 Středně velké modely

Tato část se věnuje nejmenším možným modelům, které již tvoří uvnitř svých struktur cyklus. Jako referenční molekula byl použita (acetylmethoxyl)trifluorsilan z článku [37]. Struktura (acetylmethoxyl)trifluorsilan slouží jako model křemíku v koordinaci čtyři, který má ve svém okolí vysoce elektronegativní atomy. To podporuje teoretické předpoklady o hypervalenci křemíku, pokud má ve svém okolí silně elektronegativní prvek. Pro zvolené sloučeniny byla provedena analýza kanonických orbitalů, výsledky jsou uvedeny v tabulce.

Tabulka 3.2: HSAB analýza středních molekul


	EH	EL	X	n
acetylmethyltrifluorsilan	-7,825	-0,066	3,946	3,880
si_model4_methyl	-7,802	0,494	3,654	4,148
si_model_4_orezany	-8,101	-0,059	4,080	4,021



Obrázek 3.6: Přehled středně velkých modelů; Legenda: ● Si, ● O, ● C, ● P, ● F, ○ H

Tabulka 3.3: HSAB analýza

	EH	EL	X	n
struktura bez naboje	-7,318	0,176	3,571	3,747
struktura_cis	-7,351	-1,392	4,372	2,980
struktura_trans	-7,240	-1,538	4,389	2,851
struktura_puvodni_methyl	-2,521	5,120	-1,299	3,820
struktura_5_MM	-4,546	3,276	0,635	3,911



Obrázek 3.7: Přehled velkých modelů; Legenda: ● Si, ● O, ● C, ● P, ○ H

Tabulka 3.4: Analýza sich3och3

	20		33		34		35	
	S							
Si	11,8%	0,2%	11,8%	9,7%	0,2%	3,0%	3,2%	5,4%
O	2,3%	9,1%	2,3%	17,4%	0,4%	26,0%	26,5%	34,0%
O	2,5%	8,0%	2,5%	19,7%	0,8%	16,7%	17,5%	20,7%
O	2,2%	9,0%	2,2%	16,5%	0,4%	24,3%	24,7%	17,1%
C	1,7%	4,9%	1,7%	2,5%	0,1%	1,5%	1,6%	1,5%

Tabulka 3.5: Analýza sich3och35

	S	P
Si	0,2%	0,5%
O	1,7%	0,1%
O	1,3%	0,1%
O	0,2%	0,1%
O	0,9%	0,1%
O	2,5%	0,4%
C	58,9%	0,1%

Tabulka 3.6: Analýza sioch36

	S	P
Si	2,0%	0,0%
O	0,1%	0,1%
O	0,1%	0,1%
O	0,1%	0,1%
O	0,1%	0,1%
O	0,1%	0,1%
C	0,1%	0,1%

Tabulka 3.7: Analýza sioch34

	22							
	S	P	S	P	S	P	S	P
Si	11,10 %	0,0%	0,0%	12,3%	0,0%	12,3%	0,0%	2,7%
O	2,50 %	5,4%	1,7%	9,4%	3,8%	9,3%	0,2%	15,4%
O	2,50 %	5,4%	3,8%	9,3%	1,7%	9,4%	0,2%	15,4%
O	2,50 %	5,4%	1,7%	9,4%	3,8%	9,3%	0,2%	15,4%
C	2,50 %	5,4%	3,8%	9,3%	1,7%	9,4%	0,2%	15,4%

Tabulka 3.8: Analýza acetylmethyltrifluorsilan

	22							
	S	P	S	P	S	P	S	P
Si	17,9%	0,2%	0,3%	8,9%	0,0%	6,9%	0,9%	7,5%
F	4,3%	9,0%	3,4%	22,2%	0,0%	6,7%	1,9%	13,6%
F	5,4%	9,9%	1,5%	12,6%	3,3%	19,6%	0,1%	6,8%
F	5,4%	9,9%	1,5%	12,6%	3,3%	19,6%	0,1%	6,8%
C	2,6%	4,9%	0,9%	0,9%	0,0%	0,5%	0,7%	1,8%

Tabulka 3.9: Analýza model methyl

	61		68		70		106	
	S							
SI	4,2%	0,1%	4,3%	0,4%	3,9%	0,5%	0,9%	1,2%
O	0,0%	2,2%	0,2%	2,4%	0,1%	11,4%	0,6%	3,3%
O	0,1%	1,5%	0,1%	5,5%	0,2%	2,7%	0,0%	12,9%
O	0,0%	2,1%	0,2%	6,6%	0,8%	0,6%	0,0%	13,4%
C	19,7%	5,8%	6,7%	14,9%	1,8%	15,2%	3,0%	31,6%

Tabulka 3.10: Analýza model orezany

	61		68		70		106	
	S							
SI	0,0%	0,00 %	2,8%	0,01 %	0,0%	0,05 %	0,0%	0,05 %
O	0,0%	0,00 %	13,4%	0,49 %	2,5%	0,09 %	0,1%	1,14 %
O	0,0%	0,00 %	10,1%	0,28 %	0,8%	0,02 %	0,2%	0,36 %
O	0,0%	0,00 %	7,9%	0,25 %	0,3%	0,02 %	0,0%	0,04 %
O	0,0%	0,00 %	6,9%	0,19 %	0,5%	0,02 %	0,0%	0,07 %

### 3.2.3 Velké modely

## 3.3 Vazby

## 3.4 Spektroskopie

Poslední část, která se věnuje spektroskopii, dává pohled na NMR parametry křemíku a porovnává je s experimentálně získanými hodnotami.

Tabulka 3.11: Výsledky NBO pro malé modely

		vazby	O.Č	Si	X	Si(s)	Si(p)	Si(d)
A	Si-O	1-2	0,066	88,3%	11,7%	23,9%	51,9%	24,2%
		1-3	0,111	86,5%	13,5%	23,2%	73,3%	3,5%
		1-3	0,092	97,1%	2,9%	0,2%	56,7%	43,3%
		1-4	0,065	88,5%	11,5%	23,6%	50,2%	26,2%
	Si-C	1-17	0,073	75,5%	24,5%	29,3%	68,9%	1,8%
B	Si-O		0,104	86,1%	13,9%	25,0%	71,4%	3,6%
C	Si-O	1-2	0,100	92,1%	7,9%	16,0%	50,0%	33,9%
		1-3	0,104	91,9%	8,1%	15,0%	50,6%	34,4%
		1-4	0,096	91,9%	8,1%	16,5%	50,4%	33,1%
		1-5	0,095	91,9%	8,1%	16,4%	50,6%	33,0%
		1-6	0,103	92,1%	7,9%	16,1%	50,1%	33,8%
	Si-C	1-27	0,068	84,6%	15,4%	22,8%	51,2%	26,1%
D	Si-O		0,098	91,8%	8,2%	16,7%	50,0%	33,3%
E	Si-Cl	1-2	0,141	74,0%	26,0%	25,0%	72,4%	2,6%
		1-3	0,141	74,0%	26,0%	25,0%	72,4%	2,6%
		1-4	0,141	74,0%	26,0%	25,0%	72,4%	2,6%
		1-5	0,141	74,0%	26,0%	25,0%	72,4%	2,6%



Tabulka 3.12: Analýza struktura bez naboje

	S	P
Si	9,6%	0,01 %
O	3,2%	0,35 %
O	7,5%	2,35 %
O	3,7%	0,36 %
O	3,4%	0,19 %
O	6,7%	2,05 %
O	3,4%	0,37 %

Tabulka 3.13: Analýza struktura C cis

	S	P
Si	3,1%	0,92 %
O	0,0%	7,59 %
O	0,3%	0,25 %
O	0,9%	0,58 %
O	0,5%	0,08 %
O	0,1%	18,81 %
O	0,5%	0,19 %

Tabulka 3.14: Analýza struktura 5

	S	P
Si	23,9%	1,44 %
O	4,8%	0,88 %
O	10,5%	0,88 %
O	8,1%	0,56 %
O	15,9%	2,22 %
O	3,0%	0,97 %

Tabulka 3.15: Analýza struktura trans

	S	P
Si	0,5%	4,04 %
O	0,9%	0,33 %
O	0,1%	8,38 %
O	0,1%	0,17 %
O	0,0%	20,85 %
O	1,4%	0,65 %
O	0,7%	0,15 %

Tabulka 3.16: Analýza struktura puvodni

	S	P
Si	8,8%	0,00 %
O	3,5%	0,36 %
O	4,7%	0,65 %
O	4,1%	0,51 %
O	4,1%	0,42 %
O	3,9%	0,49 %
O	3,9%	0,37 %

## 4 Závěr

Tabulka 3.17: Výsledky NBO pro velké modely

			Obs.číslo	Si	X	Si(s)	Si(p)	Si(d)
A	Si-O	1-2	0,089	91,33 %	8,67 %	17,15 %	49,89 %	32,96 %
		1-3	0,105	92,66 %	7,34 %	16,06 %	50,23 %	33,72 %
		1-4	0,088	91,24 %	8,76 %	17,21 %	50,07 %	32,72 %
		1-5	0,089	91,48 %	8,52 %	16,70 %	50,16 %	33,13 %
		1-6	0,104	92,53 %	7,47 %	16,29 %	49,80 %	33,91 %
		1-7	0,088	91,29 %	8,71 %	16,98 %	49,95 %	33,08 %
B	Si-O	1-3	0,175	89,18 %	10,82 %	31,84 %	64,07 %	4,08 %
		1-4	0,171	88,78 %	11,22 %	33,01 %	63,00 %	4,00 %
		1-5	0,132	88,88 %	11,12 %	16,88 %	79,32 %	3,80 %
		1-7	0,127	88,94 %	11,06 %	16,73 %	79,55 %	3,72 %
C	Si-O	1-2	0,106	90,65 %	9,35 %	22,30 %	52,16 %	25,54 %
		1-4	0,113	90,69 %	9,31 %	22,02 %	51,83 %	26,15 %
		1-5	0,161	90,48 %	9,52 %	9,91 %	86,47 %	3,62 %
		1-6	0,111	90,57 %	9,43 %	21,86 %	52,57 %	25,57 %
		1-7	0,104	90,19 %	9,43 %	23,30 %	51,81 %	24,89 %
D	Si-O	1-2	0,092	91,57 %	8,43 %	16,92 %	50,05 %	33,03 %
		1-3	0,094	91,82 %	8,18 %	16,49 %	50,05 %	33,46 %
		1-4	0,092	91,67 %	8,33 %	16,73 %	49,90 %	33,37 %
		1-5	0,093	91,74 %	8,26 %	16,54 %	49,96 %	33,50 %
		1-6	0,093	91,73 %	8,27 %	16,72 %	49,96 %	33,32 %
		1-7	0,093	91,75 %	8,25 %	16,59 %	50,11 %	33,30 %
E	Si-O	1-2	0,091	91,63 %	8,37 %	17,13 %	50,11 %	32,76 %
		1-3	0,115	89,41 %	10,59 %	20,87 %	63,97 %	15,16 %
		1-4	0,085	91,53 %	8,47 %	17,31 %	50,82 %	31,88 %
		1-5	0,113	90,01 %	9,99 %	20,02 %	62,64 %	17,34 %
		1-6	0,093	86,99 %	13,01 %	24,67 %	65,85 %	9,48 %

Tabulka 3.18: Teoretické hodnoty NMR absolutního chemického stínění [39]

	_C_cis	_C_trans	_5_MM	_bez_naboje	_puvodni	exp [ppm]
central Si	-210,45	-211,70	-160,89	-217,13	-220,53	-101
4 Si	-161,26	-157,15	-158,78	-164,78	-161,25	-212
4. Si	-156,64	-158,48	-155,75	-166,21	-161,34	-212
4. Si	-159,50	-157,32		-164,28	-163,01	-212
4 Si		-160,50		-166,08	-161,83	-212
4 Si				-168,73	-161,46	-212
4 Si				-164,42	-161,68	-212

## 5 Přílohy

Listing 5.1: SiCl<sub>4</sub>

OPT SICL4			
0 1			
Si	-0.32396	3.43338	0.90767
Cl	1.16108	2.80375	-0.42740
Cl	-0.07911	5.47302	1.31275
Cl	-0.16812	2.34436	2.68922
Cl	-2.20970	3.11238	0.05612

Listing 5.2: Si(OCH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>

OPT SIOCH3_4			
0 1			
Si	0.0001220	0.0000330	0.0000360
O	0.9170270	0.9044730	1.0243390
O	0.9045540	-0.9169850	-1.0241690
O	-0.9169260	-0.9043800	1.0242150
O	-0.9042640	0.9169760	-1.0243770

## 5. PŘÍLOHY

C	1.8778790	1.8450600	0.5596310
H	1.4099290	2.6347680	-0.0420880
H	2.6540760	1.3617650	-0.0474960
H	2.3497270	2.3024850	1.4340000
C	1.8448590	-1.8780970	-0.5596900
H	2.6347300	-1.4104800	0.0420870
H	2.3021420	-2.3499610	-1.4341310
H	1.3614230	-2.6542840	0.0473570
C	-1.8780710	-1.8445900	0.5598200
H	-1.4105520	-2.6345220	-0.0419640
H	-2.6542740	-1.3611590	-0.0472200
H	-2.3499580	-2.3018450	1.4342710
C	-1.8450990	1.8775380	-0.5598210
H	-2.6326470	1.4101160	0.0451500
H	-2.3054470	2.3464870	-1.4342270
H	-1.3614000	2.6560330	0.0440520

Listing 5.3: Si(OCH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>

OPT SIOCH3_6			
-2 1			
Si	-0.0001880	0.0000000	0.0000090
O	1.4538820	-0.0278540	1.1035540
O	-0.7031070	1.2729320	1.1039290
O	-1.4540600	0.0280270	-1.1036250
O	-0.7499510	-1.2457500	1.1036400
O	0.7026500	-1.2730110	-1.1038840
O	0.7500560	1.2455900	-1.1036770
C	2.7508630	-0.0641930	0.6602600
H	3.3016190	-0.9676240	1.0255720
H	3.3499640	0.8087170	1.0236480
H	2.8467780	-0.0681630	-0.4391250
C	1.4321320	2.3493480	-0.6604130
H	2.4905780	2.3720690	-1.0239340
H	1.4821360	2.4316360	0.4389390
H	0.9784850	3.3052110	-1.0258190
C	-1.3199560	2.4145750	0.6605540

## 5. PŘÍLOHY

H	-0.8125060	3.3432400	1.0251720
H	-2.3751730	2.4972860	1.0246650
H	-1.3652600	2.4993680	-0.4387210
C	1.3205370	-2.4139360	-0.6601620
H	2.3764850	-2.4950820	-1.0224450
H	0.8149260	-3.3430640	-1.0263000
H	1.3639910	-2.4993900	0.4391410
C	-1.4317480	-2.3497660	0.6602990
H	-0.9773230	-3.3055130	1.0249030
H	-1.4825150	-2.4315010	-0.4390370
H	-2.4898720	-2.3731820	1.0246890
C	-2.7511880	0.0640150	-0.6605110
H	-3.3021340	0.9671760	-1.0261440
H	-2.8472450	0.0682580	0.4388330
H	-3.3499040	-0.8091620	-1.0238230

Listing 5.4: Si(CH<sub>3</sub>)(OCH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>

OPT	SI_CH3_OCH3_3		
O	1		
Si	-0.0057900	-0.2751690	0.0944170
O	-1.2911890	-0.3591420	-0.9414090
O	0.0325080	1.1726200	0.9029860
O	1.2749640	-0.4304530	-0.9393850
C	-2.6461530	-0.3563460	-0.5224090
H	-2.8864580	-1.2452270	0.0771810
H	-3.2763080	-0.3652830	-1.4169750
H	-2.8916000	0.5378680	0.0666150
C	0.0522530	2.4336310	0.2432010
H	-0.7569640	2.5164460	-0.4930990
H	1.0070220	2.5977960	-0.2722630
H	-0.0773580	3.2139310	0.9993730
C	2.6301240	-0.4198320	-0.5209890
H	2.8739190	0.4804210	0.0594790
H	3.2603990	-0.4367540	-1.4153590
H	2.8717970	-1.3021910	0.0877180
C	-0.0413080	-1.5913670	1.4184800

H	-0.9148470	-1.4785800	2.0699270
H	0.8479150	-1.5354740	2.0561060
H	-0.0762280	-2.5913100	0.9722250

Listing 5.5: Si(CH<sub>3</sub>)(OCH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>

OPT	SI_CH3_OCH3_5		
-2	1		
Si	-0.0442910	0.0299880	0.3906550
O	1.6041320	0.8332250	0.1274860
O	-0.3652860	0.0717310	-1.4254310
O	-0.7702510	1.7063270	0.5429350
O	-1.6958350	-0.7314170	0.6046580
O	0.7580360	-1.6250470	0.1881440
C	0.0771810	-2.7009530	-0.3247260
H	-0.4981070	-2.4638600	-1.2411800
H	-0.6550120	-3.1548100	0.3804970
H	0.7908670	-3.5193770	-0.5991090
C	2.8065160	0.2156100	0.3406820
H	2.8917480	-0.2922580	1.3265450
H	3.6395890	0.9634720	0.3099380
H	3.0638650	-0.5634160	-0.4100500
C	-2.7940790	-0.3743540	-0.1399660
H	-2.9533160	0.7213250	-0.1810280
H	-3.7224510	-0.8156570	0.3030120
H	-2.7565740	-0.7208350	-1.1953230
C	-0.5214160	2.7152290	-0.3578540
H	-1.0802780	3.6397660	-0.0663580
H	-0.8330540	2.4721790	-1.3940140
H	0.5494230	3.0011340	-0.4148180
C	0.6471330	-0.0054570	-2.3502550
H	1.3733840	-0.8156500	-2.1420580
H	1.2471360	0.9255920	-2.4457310
H	0.2268160	-0.2111810	-3.3665430
C	0.1878820	-0.0741790	2.3500210
H	1.2238000	0.1114870	2.6809740
H	-0.1030720	-1.0649380	2.7320130



H	-0.4503550	0.6732800	2.8443090
---	------------	-----------	-----------

Listing 5.6: (acetoxymethyl)trifluorsilan

OPT (acetoxymethyl)trifluorsilan			
O 1			
Si	1.5476220	-0.0237980	-0.0000050
F	2.6611460	1.1164950	-0.0000540
F	1.7693370	-0.9318850	-1.2880250
F	1.7694020	-0.9318360	1.2880380
C	-0.1329760	0.7872310	0.0000220
C	-2.4159310	0.1609480	0.0000880
C	-3.3600660	-1.0149960	-0.0000380
O	-1.1192530	-0.2636240	0.0000620
H	-0.2639860	1.4308430	-0.8781320
H	-0.2639460	1.4308690	0.8781640
O	-2.7218560	1.3296290	-0.0000400
H	-3.1831360	-1.6387100	-0.8822120
H	-4.3885770	-0.6532110	-0.0001400
H	-3.1833180	-1.6387350	0.8821540

Listing 5.7:  $\text{SiCH}_3(\text{PO}_4(\text{CH}_3)_2)(\text{Si}_2\text{P}_2\text{O}_9(\text{CH}_3)_4)$ 

OPT SI_MODEL_METHYL			
O 1			
Si	-0.9758930	0.0284210	1.3741960
O	-2.4238170	0.3478030	0.6459820
O	-0.4184220	-1.4046450	0.7582720
O	0.1333570	1.2170810	1.0080060
P	-3.3158730	-0.2569700	-0.5710170
P	1.0022380	-2.1311530	0.5576000
P	0.5621920	2.1509530	-0.2374980
O	-4.4707220	-1.0569590	0.1933760
O	-2.5705910	-1.0778100	-1.5441030
O	-4.0929150	1.0252800	-1.1196410
O	0.6340770	-3.4347250	-0.2647990
O	1.7381410	-1.1869930	-0.5232710

## 5. PŘÍLOHY

O	1.0384430	3.5025750	0.4600690
O	1.9171110	1.4723490	-0.7539450
O	-0.4686470	2.3573250	-1.2676760
Si	2.8049090	0.0894500	-0.5253140
O	3.6169060	0.2899460	0.8621350
O	3.8262100	-0.0954370	-1.7757460
C	3.4490420	-0.2974070	-3.1390010
C	4.5394510	-0.6371940	1.4564310
H	4.3673360	-0.3511670	-3.7284260
H	2.8373890	0.5358180	-3.5020310
H	3.9982770	-1.5086480	1.8328640
H	5.0264310	-0.1176510	2.2851700
C	-0.0912250	-3.3749110	-1.5200120
C	2.0262930	3.5065940	1.5098530
H	2.2888550	4.5529050	1.6706960
H	2.9116510	2.9374610	1.2144760
H	1.6019220	3.0827640	2.4244600
H	-0.3755280	-4.4041960	-1.7413260
H	0.5715120	-2.9954210	-2.3028770
H	-0.9771350	-2.7411250	-1.4338510
O	1.7622930	-2.3780730	1.7969580
C	-3.5395650	1.8020300	-2.2147890
H	-4.2755770	2.5810700	-2.4181280
H	-3.4152840	1.1622540	-3.0918180
H	-2.5816870	2.2381810	-1.9267070
H	2.8931430	-1.2345460	-3.2553670
H	5.3015040	-0.9423520	0.7312180
C	-1.1670530	-0.0245770	3.2110820
H	-1.8746090	-0.8089100	3.4994290
H	-1.5322610	0.9320840	3.5986460
H	-0.2042060	-0.2488710	3.6819270
C	-5.3646170	-0.4076350	1.1132060
H	-6.0197710	-1.1888300	1.5016910
H	-5.9552700	0.3538150	0.5971980
H	-4.8066070	0.0495980	1.9365650

Listing 5.8:  $\text{Si}(\text{Si}_2\text{P}_2\text{O}_9(\text{CH}_3)_4)_2$

OPT SI_MODEL_OREZANY				
0	1			
Si	-0.0023710	0.1265980	-0.5618250	
O	1.2313240	0.8615780	-1.3594930	
O	0.5844040	-1.0177330	0.4518040	
O	-0.7896750	1.2290460	0.3523440	
O	-0.9668030	-0.5145000	-1.7114130	
P	1.6309690	-2.2484760	0.4463770	
P	2.3928100	1.8748180	-0.8864420	
P	-1.6635300	1.2638940	1.7195320	
P	-2.5416530	-0.8023330	-1.9672770	
O	3.0009180	-1.5450690	0.8800290	
O	1.6658470	-3.0162750	-0.8126510	
O	3.2175900	1.0125170	0.1788880	
O	1.9583790	3.1815980	-0.3588080	
O	3.2568450	1.8787300	-2.2313300	
O	-1.2912000	2.6658770	2.3509650	
O	-3.1457020	1.4553180	1.1483990	
O	-2.5869360	-2.3602180	-2.2709000	
O	-3.1506140	-0.6593750	-0.4827420	
O	-3.1698200	0.0302280	-3.0029720	
Si	-4.1574870	0.4049440	0.3368150	
Si	4.0966380	-0.3954270	0.3680110	
O	-5.0704720	-0.4804230	1.3454460	
O	-5.0573800	1.3591110	-0.5988030	
C	-6.0290330	0.9641870	-1.5758920	
C	-4.6141110	-1.5259140	2.2115710	
O	5.1771050	-0.1440720	1.5477270	
O	4.9057510	-0.8300650	-0.9553530	
C	4.4485480	-1.4628260	-2.1594710	
C	4.9162040	0.5088720	2.7902640	
H	-6.6091700	1.8543980	-1.8289610	
H	-6.7050150	0.2023290	-1.1720880	
H	4.2900350	-0.1200050	3.4338020	
H	4.4218000	1.4737320	2.6343320	
H	4.0134730	-0.7118540	-2.8260660	

## 5. PŘÍLOHY

H	3.7096660	-2.2403990	-1.9459510
H	-3.7610230	-1.1967770	2.8131890
H	-4.3275460	-2.4064950	1.6257640
C	-1.1557110	3.8682130	1.5498680
C	-1.9007050	-3.3396540	-1.4591790
H	-2.2038540	-4.3111140	-1.8505870
H	-2.2096350	-3.2514340	-0.4130090
H	-0.8179380	-3.2222560	-1.5492780
H	-1.0288830	4.6805850	2.2656690
H	-2.0601190	4.0321790	0.9576800
H	-0.2764240	3.7855460	0.9066400
O	-1.4699330	0.1100480	2.6195620
O	1.1984580	-3.0860660	1.7200990
C	0.9615170	-2.4636790	3.0083530
H	0.6411110	-3.2714130	3.6668800
H	0.1816570	-1.7019390	2.9277400
H	1.8912330	-2.0275390	3.3848630
C	4.1978670	2.9495810	-2.4686110
H	4.4232610	2.9194040	-3.5349280
H	5.1116250	2.7785330	-1.8916190
H	3.7554590	3.9117880	-2.2011020
H	-5.5201390	0.5900330	-2.4676340
H	5.3228860	-1.9095670	-2.6382570
H	5.8780800	0.6718210	3.2816800
H	-5.4465300	-1.7884200	2.8685670

Listing 5.9: struktura koordinace 5

OPT STRUKTURA_5_KOORDINACE			
-1 1			
Si	0.1060880	-0.1323080	1.0375270
O	1.5812970	-1.0976720	0.9967660
O	0.8974450	1.1240830	0.1688940
O	-1.4165630	0.7576620	0.9394990
O	-0.6552630	-1.3997120	0.0999750
O	0.0229970	-0.0776790	2.6855410
P	2.3564980	-2.3519490	0.4722700

## 5. PŘÍLOHY

P	2.2269690	1.9772360	0.2755320
P	-2.1096190	2.0277490	0.3627980
P	-2.1452450	-1.9360200	0.0266770
O	3.6707810	-1.7043880	-0.2463190
O	3.4776350	0.9812400	0.2257760
O	-3.6426970	1.5033340	0.2028160
O	-2.9965540	-0.9029920	-0.8705620
Si	4.0555520	-0.2021450	-0.7780110
Si	-4.2433870	0.1691170	-0.5698060
O	2.7547630	-3.3666980	1.4714960
O	2.3423360	2.4397160	1.8129550
O	-2.0097180	3.2994300	1.1181510
O	-2.8194110	-2.3356030	1.2840640
O	1.5297350	-2.9105480	-0.7944340
O	2.2723240	3.0744080	-0.7257780
O	-1.6921580	2.1504180	-1.1989060
O	-1.8688940	-3.1402730	-1.0193110
H	0.5973640	-2.6169910	-0.7313210
O	3.4719850	-0.0414510	-2.2987840
O	5.6860290	-0.0341030	-0.6943040
O	-4.8922530	0.5115670	-2.0304860
O	-5.4636920	-0.4526200	0.3064560
C	3.6740590	1.1071460	-3.1249710
H	3.2180050	0.8938780	-4.0964060
H	4.7447550	1.2999890	-3.2716820
H	3.2017280	1.9912910	-2.6852800
C	6.6006900	-1.1007480	-0.9118620
H	7.5927530	-0.7573280	-0.6016910
H	6.6426240	-1.3786210	-1.9736040
H	6.3274260	-1.9850090	-0.3259560
C	-0.9849770	3.3107900	-1.6773210
H	0.0860700	3.2086990	-1.4896040
H	-1.3635080	4.2155590	-1.1940220
H	-1.1729450	3.3571590	-2.7538780
C	-2.9263860	-4.0733420	-1.2662770
H	-2.4914580	-4.8847540	-1.8535360
H	-3.7322580	-3.5983060	-1.8380380

## 5. PŘÍLOHY

H	-3.3245040	-4.4647010	-0.3252780
C	-4.1337720	0.8029070	-3.1996090
H	-3.6537510	1.7841190	-3.1197100
H	-4.8254030	0.8072490	-4.0481970
H	-3.3592180	0.0467850	-3.3704670
C	1.4798560	3.5121350	2.2509330
C	0.9413100	-0.6499850	3.6071830
H	0.4787970	-0.5857820	4.5985100
H	1.8840520	-0.0904060	3.6163660
H	1.1623230	-1.6960460	3.3772890
H	0.4247060	3.2699000	2.0910820
H	1.7314910	4.4345160	1.7187700
H	1.6728370	3.6308940	3.3186740
C	-5.4960610	-0.5265130	1.7357500
H	-6.5126110	-0.8157020	2.0201440
H	-5.2624300	0.4468630	2.1811820
H	-4.7807210	-1.2730840	2.0905780

Listing 5.10: puvodni struktura bez naboje

OPT STRUKTURA_BEZ_NABOJE			
O 1			
Si	0.0120350	0.0358270	0.0242600
O	1.3047860	-0.7167400	-0.9094090
O	1.2485030	0.9175880	1.0755690
O	0.0071770	1.3837080	-1.1071560
O	-1.2699190	0.7984460	0.9646070
O	-1.2249010	-0.8580940	-1.0153060
O	0.0265720	-1.2984910	1.1771360
P	2.7873600	-0.5273230	-1.3538350
P	1.7316220	2.3267180	1.3744360
P	-0.8884670	2.5068120	-1.7298840
P	-2.7482530	0.8146240	1.4394840
P	-1.8660670	-2.2318230	-1.0598940
P	0.8838660	-2.5167300	1.6671940
O	3.0143970	1.0469100	-1.6140040
O	2.7757900	2.8798480	0.3584280

## 5. PŘÍLOHY

O	0.5915060	3.3905520	1.4984390
O	-1.2170490	3.5245010	-0.4936090
O	-2.3386720	1.8913420	-1.9850670
O	-3.6700160	0.8363760	0.1164220
O	-3.0982940	-0.6563060	2.0010980
O	-2.5657370	-2.6821870	0.2695220
O	-0.8954760	-3.4052900	-1.4218810
O	1.1205810	-3.4334500	0.3515580
O	2.3725480	-1.9837840	1.9375890
O	3.6974500	-0.7323310	-0.0345080
O	3.2133600	-1.3625320	-2.4995560
O	2.4825190	2.3287790	2.7684150
O	-0.3068290	3.1700670	-2.9126320
O	-3.0753890	1.8766920	2.4177360
O	-2.9273170	-2.1615930	-2.2269270
O	0.3041640	-3.2345990	2.8195630
O	5.1670170	2.0769390	-0.2488950
O	3.8041170	3.5545990	-2.0383720
O	-1.2506920	5.2972690	1.5518090
O	-4.6422270	3.0630540	-1.0853360
O	-4.6859290	0.7190670	-2.3155330
O	-5.0430560	-2.0296240	0.6259080
O	-3.7160060	-3.1653580	2.6583920
O	-0.3341860	-5.6260400	0.0509660
O	1.2380300	-4.8667120	-1.9655080
O	4.2084820	-3.3521720	0.5525290
O	4.9672570	-1.3967780	2.2006730
Si	3.7282780	2.3675690	-0.9468970
Si	-0.3300940	4.4438130	0.5328210
Si	-3.8335430	1.6720710	-1.3067550
Si	-3.6385010	-2.1079060	1.4439110
Si	0.3267810	-4.3661380	-0.7265680
Si	3.8270990	-1.8957470	1.1485080
C	6.3104920	1.5577630	-0.9571930
H	5.9927770	0.7674480	-1.6485700
H	6.7523930	2.3702700	-1.5457670
C	7.3026950	1.0083430	0.0520270

## 5. PŘÍLOHY

H	7.6079390	1.7898850	0.7556380
H	8.1962520	0.6380110	-0.4634100
H	6.8569040	0.1822790	0.6147940
C	3.0040820	3.7334910	-3.2416780
H	1.9792410	3.3954270	-3.0702490
H	2.9794500	4.8138510	-3.4084760
C	3.6412040	3.0149100	-4.4188370
H	4.6695270	3.3580250	-4.5786190
H	3.0633370	3.2188950	-5.3277450
H	3.6496090	1.9317910	-4.2595110
O	0.6627470	5.3929070	-0.3283310
C	2.4586360	6.8986130	-0.8701680
H	1.8923420	7.2833950	-1.7243110
C	-1.7938140	4.9137330	2.8385340
H	-0.9590790	4.8128390	3.5434280
H	-2.2960040	3.9464490	2.7539720
C	-2.7498950	5.9997650	3.2971450
H	-2.2410150	6.9667450	3.3706900
H	-3.1574850	5.7437580	4.2815920
H	-3.5845720	6.1024480	2.5959370
C	-4.5614290	4.0146320	-0.0085710
H	-3.6720650	4.6357860	-0.1564860
H	-4.4497700	3.4820120	0.9420540
C	-5.8220840	4.8624570	-0.0176390
H	-5.9307150	5.3847210	-0.9738100
H	-5.7776230	5.6103950	0.7828150
H	-6.7096420	4.2404810	0.1387270
C	-4.4902350	0.6538080	-3.7387030
H	-3.6038240	0.0427280	-3.9403650
H	-4.3066860	1.6565530	-4.1425550
C	-5.7297590	0.0487980	-4.3754280
H	-5.9253700	-0.9500810	-3.9701600
H	-5.5946340	-0.0364560	-5.4598040
H	-6.6084500	0.6725600	-4.1823090
C	-6.2296990	-1.3410600	1.0682870
H	-6.6944010	-1.9251220	1.8717620
H	-5.9521410	-0.3600090	1.4698740



## 5. PŘÍLOHY

C	-7.1701430	-1.1848650	-0.1130840
H	-8.0807240	-0.6609150	0.1991920
H	-7.4574360	-2.1647200	-0.5101660
H	-6.6875050	-0.6083690	-0.9082410
C	-2.8427450	-3.2774350	3.8147970
H	-1.8223630	-3.4746580	3.4772710
H	-2.8534480	-2.3188940	4.3454510
C	-3.3670740	-4.3956950	4.6959460
H	-4.3913540	-4.1915600	5.0262050
H	-2.7290250	-4.4970660	5.5810400
H	-3.3598160	-5.3486340	4.1568050
C	-0.9107340	-6.7960420	-0.5478090
H	-0.2853000	-7.1261630	-1.3856390
H	-1.9030420	-6.5393820	-0.9429610
C	-1.0221020	-7.8808630	0.5092600
H	-0.0321970	-8.1420760	0.8959660
H	-1.4793660	-8.7801880	0.0808470
H	-1.6389120	-7.5389290	1.3460670
C	1.5475740	-4.1746530	-3.2023000
H	0.6180410	-3.7698580	-3.6192890
H	2.2181770	-3.3392170	-2.9865510
C	2.1799760	-5.1668470	-4.1610840
H	3.1067440	-5.5742460	-3.7443960
H	2.4196390	-4.6651380	-5.1053640
H	1.5008030	-6.0001230	-4.3724500
C	5.1120720	-3.6494420	-0.5278450
H	4.8607040	-3.0236150	-1.3908280
H	6.1362030	-3.4164020	-0.2090160
C	4.9785840	-5.1233430	-0.8695450
H	5.2267860	-5.7457240	-0.0035320
H	5.6578150	-5.3821420	-1.6904090
H	3.9525870	-5.3495090	-1.1765250
C	4.8990510	-0.2464690	3.0556490
H	3.9771620	-0.2953550	3.6482510
H	4.8675410	0.6608970	2.4414840
C	6.1153950	-0.2422120	3.9662190
H	6.1438400	-1.1516250	4.5748820

## 5. PŘÍLOHY

H	6.0841760	0.6256560	4.6351620
H	7.0381220	-0.1917810	3.3791190
C	1.5147850	6.4174500	0.2169750
H	0.8858260	7.2350530	0.5879060
H	3.0962540	7.7023980	-0.4841340
H	2.0831450	6.0134330	1.0650410
H	3.0967390	6.0783450	-1.2121890
C	1.7992780	1.8037780	3.9385130
H	0.9083750	2.4005890	4.1499160
H	2.5131340	1.8909750	4.7568880
H	1.5284300	0.7586450	3.7743100
C	-3.8956540	-3.2199840	-2.4286560
H	-4.4259910	-2.9570540	-3.3432190
H	-4.5863060	-3.2496430	-1.5841470
H	-3.3866170	-4.1793890	-2.5578170

Listing 5.11: puvodni struktura C cis

OPT STRUKTURA_C_CIS			
O 1			
Si	0.4362750	-0.3308130	0.1798660
O	0.0302110	1.4468910	0.7261310
O	-0.8564990	-0.0851840	-0.9735320
O	1.7846080	-0.3744530	1.2821930
O	-0.6146920	-1.0436500	1.3726750
O	1.6144150	0.6336900	-0.9892260
O	0.8847720	-1.7877540	-0.6288930
C	-0.3438780	2.0694820	1.7462750
C	2.1261230	0.4547880	-2.1168400
C	1.4460740	-0.1836080	-3.2746040
C	0.1437130	1.8089160	3.1263220
H	0.1330580	0.7345630	3.3131440
H	-0.4661440	2.3412640	3.8549450
H	1.1944900	2.1250230	3.1698980
O	-1.1423970	3.0922300	1.5849480
O	3.3558730	0.8717880	-2.3015790
P	-1.8581550	0.8733550	-1.6896390

## 5. PŘÍLOHY

P	-2.1537160	-0.8810520	1.7000150
P	1.1394150	-3.3042950	-0.3141620
P	3.1847420	0.2572400	1.6064990
O	-2.3569670	1.9699320	-0.6241930
O	-3.1768000	-0.0354590	-1.8132940
O	-1.4188810	1.4575590	-2.9784610
O	3.9974000	-0.8958370	2.3558520
O	4.0607640	0.3011950	0.2398030
O	3.1507920	1.5794480	2.2877420
O	1.8693300	-3.6936310	-1.7037000
O	1.8625800	-3.6820430	0.9259450
O	-2.9628540	-1.5079350	0.4757860
O	-2.5522520	0.4936190	2.1082600
Si	-3.9291290	-1.1344810	-0.8109850
Si	4.3329560	1.3821040	-0.9707700
Si	-2.0676360	3.3779690	0.1680340
O	-5.3261160	-0.5300350	-0.2355970
O	-4.2248350	-2.4817130	-1.6730560
O	-1.2080000	4.4596480	-0.6715700
O	-3.4830900	3.9756990	0.6855210
O	3.9269550	2.9239010	-0.7340590
O	5.8713020	1.2271510	-1.4640700
C	-3.2757870	-3.1504890	-2.5107140
C	-6.4428220	-0.1892290	-1.0585370
C	-1.4548990	4.8532830	-2.0302510
C	-4.5039280	3.2083100	1.3424620
C	4.4478990	3.8109950	0.2696730
C	6.6504170	0.0279030	-1.4497830
H	6.3830590	-0.6085400	-2.3006320
H	6.5030490	-0.5281290	-0.5186480
H	5.5347860	3.9038070	0.1704730
H	4.1833280	3.4413070	1.2631890
H	2.0814950	-0.1423500	-4.1590900
H	0.4893380	0.3250900	-3.4470630
H	-5.3332800	3.8893260	1.5471930
H	-4.1289850	2.7853660	2.2785850
H	-1.4666020	3.9799650	-2.6893850

## 5. PŘÍLOHY

H	-0.6411420	5.5208710	-2.3220650
H	-6.7922250	-1.0600210	-1.6237990
H	-6.1841610	0.6157000	-1.7565350
H	-2.3855900	-3.4446420	-1.9447500
H	-2.9787990	-2.5067960	-3.3462170
H	1.2280720	-1.2231410	-3.0064460
O	-2.4310020	-2.0397870	2.7810730
O	-0.2884920	-4.0561990	-0.4702960
C	-1.8387150	-1.9197020	4.0848920
H	-2.2601130	-2.7259420	4.6873340
H	-2.0902250	-0.9542090	4.5348850
H	-0.7521140	-2.0363440	4.0198160
C	-0.9103980	-4.6776960	0.6731820
H	-1.5848650	-5.4399090	0.2767870
H	-1.4827170	-3.9400780	1.2399400
H	-0.1566580	-5.1371200	1.3167040
C	3.3434860	-1.8341050	3.2376550
H	4.1487010	-2.4078190	3.7000480
H	2.6905660	-2.4915460	2.6602710
H	2.7851710	-1.3076660	4.0196210
C	2.3129820	-5.0478520	-1.8712030
H	2.8722290	-5.0766000	-2.8083250
H	1.4555660	-5.7266400	-1.9352560
H	2.9615330	-5.3473950	-1.0422170
H	-7.2437530	0.1541510	-0.3989960
H	-4.8454950	2.3891910	0.7023420
H	3.9887110	4.7870780	0.0988820
H	7.6999750	0.3183380	-1.5382370
H	-3.7652420	-4.0447310	-2.9050930
H	-2.4044580	5.3944290	-2.1044270

Listing 5.12: puvodni struktura C trans

OPT STRUKTURA_C_TRANS			
0 1			
Si	0.1568620	0.0982880	-0.4546840
O	-1.3858890	-0.0173790	-1.2768970

## 5. PŘÍLOHY

O	-0.3952950	-1.3151690	0.6399790
O	1.6543810	0.2513780	0.4670240
O	0.5816890	1.4511660	-1.6650310
O	-0.5550920	1.2242170	0.7165680
O	0.8678080	-1.0493540	-1.5450430
P	-2.7196520	-0.8175830	-1.3999680
P	-1.5614130	2.4311220	0.6006710
P	1.5991580	-2.4289430	-1.5513710
P	3.1575710	0.5538690	0.1400790
C	-0.4911750	-1.8030960	1.7766270
C	1.1168160	2.5701510	-1.5429810
O	-2.8614740	-1.8238840	-2.4689240
O	2.4652110	-2.7355600	-2.7095090
O	3.5246940	0.7921840	-1.2810010
O	-1.3775150	3.3864190	-0.5206460
O	-3.0523280	-1.4172600	0.0875580
O	-3.8310160	0.3473290	-1.4758010
O	-3.0346810	1.7728760	0.6776300
Si	-4.2709810	1.5404840	-0.4030280
O	-5.5155180	1.0761000	0.5493300
O	-4.7174780	2.8446060	-1.2603230
C	-6.8440280	0.8962360	0.0549760
H	-7.4810840	0.6455980	0.9072710
H	-6.8847240	0.0775730	-0.6733780
C	-4.0819080	3.3580460	-2.4379070
H	-3.9519420	2.5655430	-3.1827420
H	-3.1099430	3.7855500	-2.1798310
Si	-2.8613170	-2.7890720	0.9651670
O	-1.5276080	-2.5541570	2.0522850
O	-4.1505110	-2.9825080	1.9321820
C	-4.8705630	-1.9516350	2.6152870
H	-5.0445180	-1.0866570	1.9676180
H	-4.3193470	-1.6345360	3.5082770
O	2.3989500	-2.5130800	-0.1252060
O	3.9863780	-0.5947040	0.8758450
Si	3.8841800	-2.2433030	0.5209140
O	3.4932430	1.8594190	1.0534360

## 5. PŘÍLOHY

Si	2.9221630	3.3281230	0.5346430
O	1.5450890	3.0122770	-0.3922010
O	3.9902590	4.1448810	-0.3736060
O	5.1609740	-2.6986570	-0.3649740
O	3.8702300	-3.0512760	1.9399110
C	5.2331590	3.6780950	-0.9225550
H	5.5411230	4.4027560	-1.6799600
H	5.1110330	2.6919880	-1.3776890
C	5.5585970	-2.1731050	-1.6455000
H	5.6199210	-1.0806660	-1.6126190
H	4.8353460	-2.4710640	-2.4081360
C	4.9833830	-3.0947720	2.8342050
H	5.8673780	-3.5100060	2.3386400
H	4.7075330	-3.7397940	3.6724430
C	0.5272200	-1.6233640	2.8512710
H	0.9053030	-0.5994870	2.8206430
H	1.3742560	-2.2866450	2.6315300
H	0.1134810	-1.8768470	3.8277250
C	1.2031660	3.4833650	-2.7173080
H	2.1513140	4.0263560	-2.7029680
H	0.3858230	4.2068130	-2.6083180
H	1.0760720	2.9258250	-3.6451230
O	2.3967930	4.1564720	1.8176540
O	-1.4421630	3.1733550	2.0212940
O	-2.5037560	-4.1488260	0.1746090
O	0.4004360	-3.4653990	-1.2702190
C	-3.2605790	-4.7033860	-0.9189600
C	0.6784730	-4.8715240	-1.3640650
H	1.4342270	-5.1659420	-0.6269970
H	1.0237220	-5.1272260	-2.3693510
H	-0.2608670	-5.3783540	-1.1418880
C	-1.6169880	2.4590950	3.2520580
H	-1.5203120	3.1958520	4.0515040
H	-2.6102140	2.0008760	3.2924490
H	-0.8435050	1.6929060	3.3629410
C	1.4930470	5.2697650	1.7928560
H	0.5621890	5.0014240	1.2850080

## 5. PŘÍLOHY

H	1.9575300	6.1315050	1.3009770
H	-2.7733910	-5.6399930	-1.1986650
H	-3.2562860	-4.0117130	-1.7647800
H	5.2181540	-2.0938720	3.2155740
H	6.5435780	-2.5906160	-1.8677800
H	-5.8291390	-2.3749400	2.9255210
H	1.2739670	5.5282440	2.8309780
H	5.9955110	3.6342350	-0.1381040
H	-7.2153150	1.8141500	-0.4127620
H	-4.2864410	-4.9188870	-0.6010600
H	-4.7363320	4.1328280	-2.8456680

Listing 5.13: puvodni struktura puvodni methyl

OPT STRUKTURA_PUVODNI_NABOJ			
-2 1			
Si	-0.0021910	-0.0174300	0.0639600
O	0.0281760	1.3840390	1.1669940
O	1.3350740	0.6902980	-0.9055820
O	1.1754680	-0.8555940	1.1167540
O	-0.0347840	-1.4301790	-1.0437860
O	-1.3499300	-0.7187500	1.0182230
O	-1.1804520	0.8093470	-1.0027600
P	0.9014680	2.5256720	1.7543130
P	2.8194830	0.5701970	-1.3118250
P	1.7595410	-2.2300950	1.5311010
P	-0.9113250	-2.6074850	-1.5409110
P	-2.8359550	-0.5054530	1.3955710
P	-1.6575410	2.1638910	-1.5812310
O	2.3796310	1.9516450	2.0510090
O	3.7246960	0.7493770	0.0244780
O	3.1409340	-0.9679210	-1.6647870
O	2.4410230	-2.8673180	0.1870420
O	0.5524000	-3.2675720	1.7382700
O	-1.2569080	-3.5393990	-0.2531580
O	-2.3776400	-2.0594380	-1.8996230
O	-3.7300250	-0.8101060	0.0742920

## 5. PŘÍLOHY

O	-3.1134290	1.0690380	1.5751230
O	-2.5482810	2.8635640	-0.4065800
O	-0.4197990	3.1904180	-1.6320800
O	1.2341400	3.5218000	0.5089970
O	0.3360370	3.2220510	2.9315640
O	3.2669710	1.4732610	-2.4053840
O	2.6706410	-2.2220220	2.6974450
O	-0.3279740	-3.3905660	-2.6621160
O	-3.3172510	-1.2778940	2.5703220
O	-2.3652850	2.1176200	-2.8811470
O	4.3412270	3.2831630	0.8014680
O	4.9405710	1.2351610	2.3466030
O	3.6518160	-3.5084060	-2.1259680
O	0.2596330	-5.6722900	0.4455540
O	-1.5474350	-4.8218720	2.0959020
O	-4.5442720	-3.2701230	-0.7315010
O	-4.8768550	-1.2569260	-2.3141240
O	-5.0668930	2.1549190	0.0164770
O	-3.8094050	3.6155720	1.8314150
O	-0.5452710	5.3942180	-0.0238840
O	1.4714530	5.0172600	-1.7195840
Si	3.8327670	1.8111900	1.2947250
Si	3.5412980	-2.3928050	-0.9336820
Si	-0.4706540	-4.3109150	0.9805540
Si	-3.8598210	-1.8635540	-1.1941820
Si	-3.6200550	2.4047350	0.7508980
Si	0.4287340	4.2611240	-0.7098090
O	4.9960350	-2.2967760	-0.1748760
C	6.1365280	-1.7148640	-0.7872820
H	6.9868760	-1.8567430	-0.1116910
H	5.9909140	-0.6409210	-0.9496340
H	6.3679680	-2.1960250	-1.7475680
C	2.8954280	-3.4733110	-3.3454680
H	3.1869160	-4.3553630	-3.9265620
H	3.1389320	-2.5716180	-3.9187580
H	1.8186850	-3.4965350	-3.1533500
C	0.9554180	-5.8480820	-0.7884340



## 5. PŘÍLOHY

H	1.9443080	-5.3806030	-0.7435320
H	0.4002030	-5.4160460	-1.6264920
H	1.0757050	-6.9266740	-0.9423870
C	-1.8244510	-4.1549210	3.3342210
H	-0.8979190	-3.9659440	3.8871290
H	-2.4596750	-4.8274640	3.9217340
H	-2.3457590	-3.2078270	3.1669690
C	-4.5760680	-3.8242580	0.5819500
H	-3.6957770	-4.4501810	0.7525100
H	-5.4790480	-4.4419890	0.6572110
H	-4.6031260	-3.0457620	1.3512630
C	-6.1702250	1.5358300	0.6623330
H	-7.0173150	1.5595990	-0.0314820
H	-6.4513750	2.0728760	1.5782310
H	-5.9484110	0.4921850	0.9093490
C	-2.7629350	4.0831510	2.6965840
H	-3.2328570	4.7153120	3.4580360
H	-2.0320300	4.6688320	2.1325850
H	-2.2352890	3.2571780	3.1793450
C	-4.6359760	-0.0595730	-3.0620340
H	-3.6083230	-0.0039940	-3.4276210
H	-4.8240300	0.8224660	-2.4434540
H	-5.3280310	-0.0646540	-3.9117320
C	-1.5033860	6.1254650	-0.7747200
H	-1.9580760	6.8639850	-0.1057280
H	-2.2900570	5.4661260	-1.1575590
H	-1.0339230	6.6559140	-1.6146420
C	1.9570330	4.4758780	-2.9540350
H	1.1351250	4.3590240	-3.6700380
H	2.4442520	3.5072400	-2.8105580
H	2.6794630	5.1953640	-3.3562830
C	5.0853980	3.5624790	-0.3765010
H	4.9427380	4.6220330	-0.6137970
H	4.7428200	2.9604510	-1.2242870
H	6.1571230	3.3825590	-0.2075860
C	4.8670700	-0.0372140	3.0013270
H	5.6633460	-0.0571570	3.7540440

## 5. PŘÍLOHY

H	5.0150990	-0.8519110	2.2872220
H	3.8991050	-0.1876690	3.4837840

## Literatura

1. MUNZAROVÁ, Markéta; HOFFMANN, Roald. Electron-Rich Three-Center Bonding: The Role of s,p Interactions Across the p-Block. *J. Am. Chem. Soc.* 2002, roč. 124. ISSN 0002-7863.
2. MUNZAROVÁ, Markéta. *Quantum Chemical Calculations of EPR Parameters for Transition Metal Complexes*. Stuttgart, 2001.
3. JAHNIGEN, Sandra; BRENDLER, Erica; BOHME, Uwe; HEIDE, Gerhard; KROKE, Edwin. Silicophosphates containing SiO<sub>6</sub> octahedra - anhydrous synthesis under ambient conditions. *New J. Chem.* 2014, roč. 38, s. 744–751.
4. STYSKALIK, Ales; SKODA, David; MORAVEC, Zdenek; BABIAK, Michal; BARNES, Craig E.; PINKAS, Jiri. Control of micro-/mesoporosity in non-hydrolytic hybrid silicophosphate xerogels. *J. Mater. Chem. A*. 2015, roč. 3, s. 7477–7487. Dostupné z DOI: 10.1039/C4TA06823H.
5. STÝSKALÍK, Aleš. *Synthesis of metallophosphate materials by nonhydrolytic methods [online]*. 2015 [cit. 2016-05-01]. Dostupné také z: [http://is.muni.cz/th/211138/prif\\_d/](http://is.muni.cz/th/211138/prif_d/). Disertační práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno. Vedoucí práce Jiří PINKAS.
6. EDGE, R. A.; TAYLOR, H. F. W. Crystal structure of thaumasite, [Ca<sub>3</sub>Si(OH)<sub>6</sub>.12H<sub>2</sub>O](SO<sub>4</sub>)(CO<sub>3</sub>). *Acta Crystallographica Section B*. 1971, roč. 27, č. 3, s. 594–601. Dostupné z DOI: 10.1107/S0567740871002619.
7. BAUCHNEROVÁ, Markéta. *Didaktika kvalitativní teorie MO a pojem hypervalence*. 1996 [cit. 2016-05-01]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno. Vedoucí práce Pavel KUBÁČEK.
8. STORER, Ian. *Hypervalent Silicon: Bonding, Properties and Synthetic Utility*. MacMillan Group Meeting, 20th July, 2005.
9. WAGLER, Jörg; BÖHME, Uwe; KROKE, Edwin. Higher-Coordinated Molecular Silicon Compounds. In: *Functional Molecular Silicon Compounds I: Regular Oxidation States*. Ed. SCHESCHKEWITZ, David. Cham: Springer International Publishing, 2014, s. 29–105.

- ISBN 978-3-319-03620-5. Dostupné z DOI: 10.1007/430\_2013\_118.
10. D'ARCUEIL, Société; BERTHOLLET, C.L. *Mémoires de physique et de chimie de la Société d'Arcueil*. J.J. Bernard, 1809. Mémoires de physique et de chimie de la Société d'Arcueil, č. sv. 2. Dostupné také z: <https://books.google.cz/books?id=hnJKAAAYAAJ>.
  11. LAZAREV, Igor M.; OVCHINNIKOV, Yurii E.; DOLGUSHIN, Gennadii V.; STRUCHKOV, Yurii T. The (Me<sub>2</sub>N)<sub>2</sub>CO·SiCl<sub>4</sub> complex: the first case of ligand equatorial orientation in a trigonal bipyramide. *Mendeleev Communications*. 1997, roč. 7, č. 1, s. 16–17. ISSN 0959-9436. Dostupné z DOI: <https://doi.org/10.1070/MC1997v007n01ABEH000651>.
  12. GEORGE, Kathryn; HECTOR, Andrew L.; LEVASON, William; REID, Gillian; SANDERSON, George; WEBSTER, Michael; ZHANG, Wenjian. Hypervalent neutral O-donor ligand complexes of silicon tetrafluoride, comparisons with other group 14 tetrafluorides and a search for soft donor ligand complexes. *Dalton Trans.* 2011, roč. 40, s. 1584–1593. Dostupné z DOI: 10.1039/C0DT01115K.
  13. BOYER, J.; CORRIU, R.J.P.; PERZ, R.; REYE, C. Reduction selective de composés carbonyles par catalyse hétérogène à la surface des sels. *Tetrahedron*. 1981, roč. 37, č. 11, s. 2165–2171. ISSN 0040-4020. Dostupné z DOI: [https://doi.org/10.1016/S0040-4020\(01\)97975-X](https://doi.org/10.1016/S0040-4020(01)97975-X).
  14. SCHOMBURG, Dietmar; KREBS, Roland. Structural chemistry of pentacoordinated silicon. Molecular structures of the pentafluorosilicate anion and the diphenyltrifluorosilicate anion. *Inorganic Chemistry*. 1984, roč. 23, č. 10, s. 1378–1381. Dostupné z DOI: 10.1021/ic00178a016.
  15. FLYNN, John J.; BOER, F. Peter. Structural studies of hexacoordinated silicon. Tris(o-phenylenedioxy) siliconate. *Journal of the American Chemical Society*. 1969, roč. 91, č. 21, s. 5756–5761. Dostupné z DOI: 10.1021/ja01049a010.
  16. KOLOMEITSEV, Alexander; MOVCHUN, Valery; RUSANOV, Eduard; BISSKY, German; LORK, Enno; ROSCHENTHALER, Gerd-Volker; KIRSCH, Peer. Different fluoride anion sources and

- (trifluoromethyl)trimethylsilane: molecular structure of tris(dimethylamino)sulfonium bis(trifluoromethyl)trimethylsiliconate, the first isolated penta-coordinate silicon species with five Si-C bonds. *Chem. Commun.* 1999, s. 1017–1018. Dostupné z DOI: 10.1039/A901953G.
17. LEACH, Andrew R. *Molecular modelling : principles and applications*. Harlow : Prentice Hall, 2001, 2001. ISBN 0-582-38210-6. Dostupné také z: <http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,cookie,uid&db=cat02515a&AN=muc.MUB01000367636&lang=cs&site=eds-live&scope=site>.
  18. BICKELHAUPT, F Matthias; BAERENDS, Evert Jan. Kohn-Sham Density Functional Theory: Predicting and Understanding Chemistry. *Reviews in Computational Chemistry, Volume 15*. 2007, s. 1–86.
  19. JENSEN, F. *Introduction to Computational Chemistry*. Wiley, 2007. ISBN 9780470058046. Dostupné také z: <https://books.google.cz/books?id=RDIG48UcZfYC>.
  20. HOHENBERG, P.; KOHN, W. Inhomogeneous Electron Gas. *Phys. Rev.* 1964, roč. 136, s. B864–B871. Dostupné z DOI: 10.1103/PhysRev.136.B864.
  21. KOCH, Wolfram; HOLTHAUSEN, Max C. *A chemist's guide to density functional theory*. John Wiley & Sons, 2000.
  22. PARR, R.G.; WEITAO, Y. *Density-Functional Theory of Atoms and Molecules*. Oxford University Press, 1994. International Series of Monographs on Chemistry. ISBN 9780195357738. Dostupné také z: <https://books.google.cz/books?id=mG0pScSIwU4C>.
  23. ATKINS, P.; PAULA, J. de. *Atkins' Physical Chemistry*. OUP Oxford, 2010. ISBN 9780199543373. Dostupné také z: <https://books.google.cz/books?id=BV6cAQAAQBAJ>.
  24. STANDARA, Stanislav. *Výpočet NMR parametrů modifikovaných purinů [online]*. 2006 [cit. 2016-05-28]. Dostupné také z: [http://is.muni.cz/th/43015/prif\\_m/](http://is.muni.cz/th/43015/prif_m/). Diplomová práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno. Vedoucí práce Radek MAREK.

25. FRISCH, M. J. et al. *Gaussian~16 Revision B.01*. 2016. Gaussian Inc. Wallingford CT.
26. LOWE, J.P.; PETERSON, K. *Quantum Chemistry*. Elsevier Science, 2011. ISBN 9780080470788. Dostupné také z: <https://books.google.cz/books?id=00mGAwAAQBAJ>.
27. PEARSON, Ralph G. Hard and Soft Acids and Bases. *Journal of the American Chemical Society*. 1963, roč. 85, č. 22, s. 3533–3539. Dostupné také z: <http://dx.doi.org/10.1021/ja00905a001>.
28. BÖGEL, H.; LAUBE, U.; HANSEN, S (ed.). *The HSAB concept can be developed into an universal scheme based on quantum chemistry*. Jeruzalem, Izrael: WATOC, 1996. Dostupné také z: <http://www.ch.ic.ac.uk/rzepa/watoc96/abstracts/27/>.
29. KRATOCHVÍL, Milan. *Excerpta z teoretické chemie*. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6067-8. Dostupné také z: <http://excerpta.chemi.muni.cz/>.
30. PEARSON, Ralph G. Absolute electronegativity and hardness correlated with molecular orbital theory. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 1986, roč. 83, č. 22, s. 8440–8441.
31. WEINHOLD, F.; LANDIS, C.R. *Valency and Bonding: A Natural Bond Orbital Donor-Acceptor Perspective*. Cambridge University Press, 2005. ISBN 9780521831284. Dostupné také z: <https://books.google.cz/books?id=5lxezAmEnaAC>.
32. HANWELL, Marcus D.; CURTIS, Donald E.; LONIE, David C.; VANDERMEERSCH, Tim; ZUREK, Eva; HUTCHISON, Geoffrey R. Avogadro: an advanced semantic chemical editor, visualization, and analysis platform. *Journal of Cheminformatics*. 2012, roč. 4, č. 1, s. 1–17. ISSN 1758-2946. Dostupné z DOI: 10.1186/1758-2946-4-17.
33. STEPHENS, P. J.; DEVLIN, F. J.; CHABALOWSKI, C. F.; FRISCH, M. J. Ab Initio Calculation of Vibrational Absorption and Circular Dichroism Spectra Using Density Functional Force Fields. *The Journal of Physical Chemistry*. 1994, roč. 98, č. 45, s. 11623–11627. Dostupné z DOI: 10.1021/j100096a001.

34. KUTZELNIGG, Werner; FLEISCHER, Ulrich; SCHINDLER, Michael. *N M R Basic Princ. Prog.* Sv. 23, The IGLO-Method: Ab-initio Calculation and Interpretation of NMR Chemical Shifts and Magnetic Susceptibilities. 1991.
35. GLENDENING, Eric D.; LANDIS, Clark R.; WEINHOLD, Frank. NBO 6.0: Natural bond orbital analysis program. *Journal of Computational Chemistry*. Roč. 34, č. 16, s. 1429–1437. Dostupné z DOI: 10.1002/jcc.23266.
36. STÝSKALÍK, Aleš; ŠKODA, David; MORAVEC, Zdeněk; BABIAK, Michal; BARNES, Craig E.; PINKAS, Jiří. Control of micro-/mesoporosity in non-hydrolytic hybrid silicophosphate xerogels. *Journal of Materials Chemistry A*. 2015, roč. 3. ISSN 2050-7488.
37. CHIPANINA, N. N.; AKSAMENTOVA, T. N.; GAVRILOVA, G. A.; OZNOBIKHINA, L. P.; LAZAREVA, N. F. Structure of (O-Si)-(acetoxymethyl)trifluorosilane in three phase states and in solutions. *Russian Journal of General Chemistry*. 2011, roč. 81, č. 12, s. 2440–2449. ISSN 1608-3350. Dostupné z DOI: 10.1134/S107036321112005X.
38. TACKE, Reinhold; BURSCHKA, Christian; RICHTER, Ingo; WAGNER, Brigitte; WILLEKE, Reiner. Pentacoordinate Silicon Compounds with SiO<sub>5</sub> Skeletons Containing SiOH or SiOSi Groups: Derivatives of the Pentahydroxosilicate(1-) Anion [Si(OH)<sub>5</sub>]- and Its Anhydride [(HO)<sub>4</sub>Si O Si(OH)<sub>4</sub>]<sub>2</sub>-. *Journal of the American Chemical Society*. 2000, roč. 122, č. 35, s. 8480–8485.
39. STÝSKALÍK, Aleš; ŠKODA, David; MORAVEC, Zdeněk; ROUPCOVÁ, Pavla; BARNES, Craig E.; PINKAS, Jiří. Non-aqueous template-assisted synthesis of mesoporous nanocrystalline silicon orthophosphate. *RSC Advances*. 2015, roč. 5. ISSN 2046-2069.