


دهن فسفوري



دهن فسفوري

الدهن الفوسفوري أو **الليبيدات المفسفرة** (فوسفوليبيد) عبارة عن نوع من الدهون والتي تعد مكوناً أساسياً من الغشاء الخلوي حيث تدخل في تركيب الدهن ثنائي الطبقة. تتكون معظم الدهون الفوسفورية من أحماض دهنية و أحماض الفسفوريك و قواعد نيتروجينية و كحول دهنية .

مثل الكولين بالإضافة إلى حمض دهني عبارة عن أذنان أو ذيل. بنيوياً تتكون الدهون الفوسفورية من رأس محب للماء ومن أذنان كارهة للماء.


إن أول دهن فسفوري تم التعرف عليه هو ليسيتين في الأنسجة الحيوية في صفار البيض من قبل العالم تيودور نيكولا غوبلي عام 1847. يمكن إنتاج الدهون الفوسفورية صناعياً حيث تجد لها العديد من التطبيقات في تقانة الصغائر وعلوم المواد.[1]

انظر أيضاً

- دهن ثنائي الطبقة
- غشاء خلوي
- خلية بانيت

المراجع

Mashaghi S., Jadidi T., Koenderink G., Mashaghi A. (2013). "Lipid .1 Nanotechnology" (<http://www.mdpi.com/1422-0067/14/2/4242>). *Int. J. Mol. Sci.* **2013** (14): 4242–4282. doi:10.3390/ijms14024242 (<https://doi.org/10.3390/ijms14024242>). (0%2Fijms14024242



مجلوبة من "https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=دهن_فسفوري&oldid=38437429"

آخر تعديل لهذه الصفحة كان يوم 10 سبتمبر 2019، الساعة 17:44.

النصوص منشورة برخصة المشاع الإبداعي. طالع شروط الاستخدام للتفاصيل.