A1 Q4b Edward Tanurkov 20401544

Wednesday, October 14, 2026 10:24 PM

b) $\nabla_{12}^2 X_t = \nabla_{12}(X_t - X_{t-12})$
$= X_t - X_{t-12} - (X_{t-12} - X_{t-24})$
$= (a - bt)\varepsilon_t + Y_t$
$- (a + bt - 12b)\varepsilon_{t-12} + Y_{t-12}$
$- (a + bt - 12b)\varepsilon_{t-12} + Y_{t-12}$
$+ (a + bt - 24b)\varepsilon_{t-24} + Y_{t-24}$
$= Y_t - 2Y_{t-12} + Y_{t-24}$

$\nabla_{12}^2 X_t$ is stationary b/c $E[\nabla_{12}^2 X_t] = \overbrace{1 - 2 + 1}^{\text{coefs. of } Y_t} = 0$
and $\text{Cov}(\nabla_{12}^2 X_{t+h}, \nabla_{12}^2 X_t)$ = some combination of $\gamma_Y(h)$ which clearly doesn't depend on t.

ACVF

By property 4 of covariance:

$\gamma(h) = \sum_a \sum_b c_a c_b \text{Cov}(Y_{t+h-a}, Y_{t-b})$
$= \sum_a \sum_b c_a c_b \gamma_Y(h - a + b)$ by linearity of Cov., $\overbrace{(t+h-a) - (t-b) = h - a + b}^{\text{lag subscripts of } Y}$

For $a, b \in \{0, 12, 24\}$ (the Y_t lags above), and c_i is the coefficient $(-2, -1, 1)$ for the corresponding Y_i for $i = a$ or b.