

Bestellung: Marcel Landolt
Mobile 079 308 63 69
marcel.landolt@drossapharm.ch
Fax Nr. 044 660 84 34



RIVARAX® (RIVAROXABAN) – AB NOVEMBER 2024 VERFÜGBAR

- Ab 1. November 2024 in der Spezialitätenliste (Auslieferung im November 2024)
- Rivarax® ist das günstigste auf dem Schweizer Markt verfügbare Rivaroxaban-Generikum (Stand Oktober 2024).
- Mit Rivarax® profitieren Ihre Patienten von 10 % Selbstbehalt.
- Patientenausweis «Antikoagulation» in jeder Packung

Rivarax® Dosierung	Packungsgrösse	GTIN	FAP-CHF	PP-CHF	Anzahl
10 mg	10 Filmdtabletten		6.49	16.30	
	30 Filmdtabletten		19.48	37.65	
	100 Filmdtabletten		68.19	90.65	
15 mg	10 Filmdtabletten		6.66	16.50	
	30 Filmdtabletten		19.52	37.60	
	100 Filmdtabletten		68.19	90.65	
20 mg	10 Filmdtabletten		6.71	16.55	
	30 Filmdtabletten		19.52	37.60	
	100 Filmdtabletten		68.19	90.65	

Ihre Mitteilung / Datum, Stempel, Unterschrift

Bestellen Sie mit diesem
Formular oder bequem
über **MedShop** auf
www.drossapharm.ch



Rivarax®. Filmdtabletten zu 10 mg/15 mg/20 mg Rivaroxaban. **I:** Erwachsene: Thromboseprophylaxe nach grösseren orthopädischen Eingriffen an den unteren Extremitäten, Behandlung und Prophylaxe von tiefen Venenthrombosen (TVT) und Lungenembolien (LE), Schlaganfall- und Embolieprophylaxe bei nicht-valvulärem Vorhofflimmern. **D/A:** Nach orthopädischen Eingriffen: 1 x 10 mg/Tag. Behandlung TVT und LE: 2 x 15 mg/Tag für 3 Wochen, dann 1 x 20 mg/Tag. Schlaganfall- und Embolie-Prophylaxe: 1 x 20 mg/Tag. **KI:** Überempfindlichkeit gegenüber Wirkstoff oder Hilfsstoffen, akute bakterielle Endokarditis, aktive Blutung, gastrointestinale Ulcera, schwere Lebererkrankungen, leichte Leberinsuffizienz mit Koagulopathie, dialysepflichtige Niereninsuffizienz, Schwangerschaft/Stillzeit. **W/V/M:** individuelle Risiko-Nutzen-Abwägung bei erhöhtem Blutungsrisiko, resp. vorangegangener Blutung, Antiphospholipid-Syndrom, Leber- und Nierenfunktionsstörungen. 24 Stunden vor chirurg. Eingriffen absetzen. Nicht bei kongenitalen Laktosemangelstörungen. **IA:** Wirkverstärkung (d.h. erhöhte Blutungsneigung) durch starke CYP3A4-Inhibitoren wie z. B. Ketoconazol, Fluconazol, Erythromycin oder HIV-Proteaseinhibitoren. Vorsicht in Kombination mit CYP3A4-Induktoren und auf die Gerinnung wirkenden Arzneimitteln (NSAR, Thrombozytenaggregationshemmer, VitK-Antagonisten, SSRI, SNRI). **UW:** Anämie, Schwindel, Kopfschmerzen, allerg. Ödem, okkulte Blutungen, Augenblutungen, Gingiva-Blutungen, Wundblutung, Hypotonie, Hämatome, GI-Blutungen, Epistaxis, Hämoptysis. Nausea, Obstipation, Durchfall, abdominale und GI-Schmerzen, Dyspepsie, Erbrechen, Erhöhung der Transaminasen. Agranulozytose, schwere dermatolog. Reaktionen bis hin zu DRESS Syndrom, Pruritus, Rash, Ekchymose, Hautblutungen. Urogenitalblutungen, eingeschränkte Nierenfunktion. Schmerzen in den Extremitäten, Fieber, peripheres Ödem, Asthenie. **P:** 10, 30 oder 100 Filmdtabletten zu 10 mg/15 mg/20 mg. **(B).** Kassenzulässig. Detaillierte Informationen siehe www.swissmedinfo.ch. Sdl: Nov 2023. **Drossapharm AG, 4002 Basel.** **Referenz:** 1 Fachinformation gemäss www.swissmedinfo.ch, abgerufen im Juli 2024. Die aktuell genehmigte, detaillierte Fachinformation kann bei Drossapharm angefordert werden.