## Национальный сследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

## Лабораторная работа №7 **Работа с системой компьютерной вёрстки ТеX**

Выполнил: Лысенко Данила Сергеевич Группа Р3110 Преподаватель: Балакшин Павел Валерьевич Вариант 17 Год выпуска: 2019 Номер выпуска: 7 экспоненту:

$$1 - \frac{T_0 - T(t)}{T_0 - T_{\infty}} = exp(-\frac{t}{\tau}).$$
 (1)

Качественный вид зависимости температуры от времени дан на рисунке 2.

Что же получается: температура Т, входящая в показатель экспоненты (1), сама экспоненциально зависит от времени! Подставив (2) в (1), найдем выражение для скорости экстракции кофе, пропорциональное функции

$$exp\left[-\frac{Q}{kT_0}\frac{1+a}{1+aexp(-\frac{t}{\tau})}\right]. \qquad (2)$$

где а  $=\frac{T_0-T_\infty}{T_\infty}=\frac{\delta T_0}{T_\infty}$  - начальный перегрев, отнесенный к температуре в окружающем пространстве.

Более того, если заваривать кофе "при нормальных условиях" (как говорят настоящие физики) - температуре 0С и давлении в одну атмосферу, то отношение  $a=\frac{\delta T_0}{T_\infty}=\frac{100K}{273,15K}\approx\frac{1}{e}$  и выражение (3) можно назвать трижды экслоненциальным:

$$exp\left[-\frac{Q}{kT_0}\frac{exp1+a}{exp1+exp(-t/\tau)}\right],$$
 (3)

а число e = exp1 - Фундаментальной Кофейной Постоянной. До чего же вездесуще основание натуральных логарифмов!

На рисунке 3 представлена качественная зависимость (4) скорости экстракции кофе от времени - следствие подстановки данных рисунка 2 в рисунок 1. Результат экстрации - это интеграл за все отведенное для заварки время  $t_*$ , т.е. закрашенная площадь под кривой. Конечно, этот результат наиболее впечатляет, если  $\alpha=0$  (нет теплоотдачи в окружающее пространство). Не случайно джезву с кофе ставят на раскаленный песок и даже некоторое время кипятят содержимое («варят»).

Вероятно, вдумчивый читатель уже понял, что не следует оставлять ложку в заварной чашке, класть на горку молотого кофе лепешку меда или сыпать сахар, которые «оттягивают» на себя часть теплоты кипятка, увеличивая теплоотдачу ( $\alpha_2 > \alpha_1$ ), и что сливки нужно добавлять (если, конечно, нужно) при  $t \geq t_*$ , а не раньше. Может быть, этого не знала одна из героинь А.П. Чехова, которая «…кофий сегодня пила, и без всякого удовольствия». Но Вы-то всё поняли?

Приятного аппетита!

Заключительный этап Всероссийской математической олимпиады школьников прошел в Пермском крае с 21 по 27 апреля 2019 года. Все участники олимпиады проживали в корпусах расположенного на живописном берегу Камы курорта Усть-Качка, а туры олимпиады проходили в находящемся неподалеку современном здании Кадетского корпуса. В экскурсионную программу олимпиады были включены поездки в Кунгурскую пещеру, осмотр

достопримечательностей Перми. Интересной и насыщенной была научнопознавательная программа олимпиады: перед участниками выступали с лекциями представители ведущих университетов страны.

В олимпиаде приняли участие 378 юных математиков из 65 регионов России. Кроме того, традиционными участниками олимпиады

Номер задачи	1	2
Количество участников (из 130), решивших задачу	114	38