

תורת הגרפים - טענות בלבד

מתמטיקה בדידה - 80181

מרצה: צור לוריא

מתרגלת: שני שלומי

סוכס ע"י: שריה אנסבכר

סמסטר א' תשפ"ג, האונ' העברית

תוכן העניינים

3	1	התחלה
3	2	מסלולים וקשירות
3	3	מסלולים מיוחדים
4	4	עצים
4	5	תורת רמזי
5	6	קוביות, גרפים דו-צדדיים וזיווגים

תודתי נתונה לגלעד שרם על **סיכומיו המצוינים** שהיו לי לעזר רב עד כדי כך שניתן לומר שהסיכום הזה מבוסס על סיכומיו.

* * *

אשמח לקבל הערות והארות על הסיכומים על מנת לשפרם בעתיד,
כל הערה ולו הפעוטה ביותר (אפילו פסיק שאינו במקום או רווח מיותר) תתקבל בברכה;
אתם מוזמנים לכתוב לי לתיבת הדוא"ל: sraya.ansbacher@mail.huji.ac.il.

לסיכומים נוספים היכנסו לאתר:
אקסיומות השלמות - סיכומי הרצאות במתמטיקה
<https://srayaa.wixsite.com/math>

1 התחלה

♣ לכל $n \in \mathbb{N}$ מספר הצלעות ב- K_n הוא $\sum_{i=1}^{n-1} i = \frac{n^2-n}{2} = \binom{n}{2}$

יהי $G := (V, E)$ גרף.

טענה 1.1. נסמן $\{v_1, v_2, \dots, v_n\} := V$ וא"כ $\sum_{i=1}^n \deg(v_i) = 2|E|$, בפרט סכום דרגות הקודקודים של כל גרף הוא זוגי.

מסקנה 1.2. מספר הקודקודים ב- G שדרגתם אי-זוגית הוא אי-זוגי.

2 מסלולים וקשירות

יהי $G := (V, E)$ גרף לא מכוון.

טענה 2.1.

1. G קשיר אם"ם ל- G יש רכיב קשירות יחיד.

2. החיתוך של שני רכיבי קשירות שונים ריק.

3. לכל שני קודקודים ברכיבי קשירות שונים v, u אין צלע המחברת ביניהם ($\{v, u\} \notin E$).

טענה 2.2. נסמן ב- r את מספר רכיבי הקשירות של G , מתקיים $r \geq |V| - |E|$.

3 מסלולים מיוחדים

יהי $G := (V, E)$ גרף לא מכוון.

טענה 3.1. אם $|V| \geq 3$ ו- $|E| \geq |V|$ אז יש ב- G מעגל פשוט.

♣ אין גרפים המקיימים $|E| \geq |V|$ וגם $|V| < 3$, התנאי הראשון מיותר.

נניח ש- G קשיר.

טענה 3.2. אם יש ב- G מעגל אוילר אז דרגתו של כל אחד מן הקודקודים זוגית.

משפט 3.3. יש ב- G מעגל אוילר אם"ם דרגתו של כל אחד מן הקודקודים זוגית.

טענה 3.4. אם יש ב- G מסילת אוילר אז דרגתו של כל אחד מן הקודקודים זוגית או שיש בדיוק שני קודקודים שדרגתם אי-זוגית.

4 עצים

טענה 4.1. בכל עץ יש עלה.

מסקנה 4.2. בכל עץ עם יותר מקודקוד אחד יש שני עלים.

טענה 4.3. יהי $G := (V, E)$ עץ, מתקיים $|E| = |V| - 1$.

טענה 4.4. יהי $G := (V, E)$ גרף קשיר כך ש- $|E| = |V| - 1$, אין ב- G מעגל פשוט (כלומר G הוא עץ).

♣ יחד עם טענה 3.1 נקבל שבגרף קשיר יש מעגל פשוט אם $|E| \geq |V|$.

למה 4.5. יהי $G := (V, E)$ גרף קשיר, אם (v_1, v_2, \dots, v_n) הוא מעגל פשוט ב- G אז גם הגרף $G' := (V, E \setminus \{v_1, v_2\})$ הוא גרף קשיר.

מסקנה 4.6. יהי $G := (V, E)$ גרף, כל שניים מהתנאים הבאים גוררים את השלישי:

1. G קשיר.

2. G חסר מעגלים פשוטים¹.

3. מתקיים $|E| = |V| - 1$.

♣ בפרט אם $|E| = |V| - 1$ ומתקיים אחד משני התנאים האחרים אז G הוא עץ.

5 תורת רמזי

טענה 5.1. יהיו $n, m \in \mathbb{N}$, $2 \leq n, m$, אם קיימים $a, b \in \mathbb{N}$ כך שמתקיים:

1. ב- K_a הצבוע באדום וכחול יש בהכרח תת-גרף K_n הצבוע כולו **אדום** ו/או תת-גרף K_{m-1} הצבוע כולו **כחול**.

2. ב- K_b הצבוע באדום וכחול יש בהכרח תת-גרף K_{n-1} הצבוע כולו **אדום** ו/או תת-גרף K_m הצבוע כולו **כחול**.

אז ב- K_{a+b} הצבוע באדום וכחול יש בהכרח תת-גרף K_n הצבוע כולו **אדום** ו/או K_m הצבוע כולו **כחול**.

משפט 5.2. משפט רמזי²

יהיו $2 \leq n, m \in \mathbb{N}$, נסמן $N := \binom{n+m-2}{n-1}$ ויהי K_N כשהוא צבוע באדום וכחול, יש ב- K_N תת-גרף K_n שכולו צבוע **אדום** ו/או שיש ב- K_N תת-גרף K_m שכולו צבוע **כחול**.

מסקנה 5.3. לכל $N < M \in \mathbb{N}$ ובהינתן צביעה של K_M באדום וכחול יש ב- K_M תת-גרף K_n שכולו צבוע **אדום** ו/או שיש ב- K_M תת-גרף K_m שכולו צבוע **כחול**.

טענה 5.4. בהינתן צביעה של K_6 באדום וכחול קיים ב- K_6 תת-גרף K_3 שכל צלעותיו צבועות באותו הצבע.

מסקנה 5.5. $R(3, 3) = 6$.

טענה 5.6. לכל $2 \leq n \in \mathbb{N}$ מתקיים $R(2, n) = n$.

טענה 5.7. מתקיים $R(3, 4) = 9$.

טענה 5.8. לכל $2 \leq n, m \in \mathbb{N}$ מתקיים $R(n, m) = R(m, n)$.

¹שקול לחסר מעגלים.

²ערך בוויקיפדיה: **פרנק רמזי**.

6 קוביות, גרפים דו-צדדיים וזיווגים

טענה 6.1. ב- $Q_n = (V, E)$ מתקיים:

$$1. |V| = 2^n.$$

$$2. \deg(v) = n \text{ לכל } v \in V.$$

$$3. |E| = n \cdot 2^{n-1}.$$

טענה 6.2. לכל $n \in \mathbb{N}$ יש ב- Q_n מעגל המילטון.

יהי $G := (V_1 \cup V_2, E)$ גרף דו-צדדי כאשר V_1 ו- V_2 הם צדדיו.

טענה 6.3. לכל מעגל $(v_0, v_1, v_2, \dots, v_n)$ ב- G מתקיים $n \in \text{Even}$.



זיווג מושלם בגרף דו-צדדי מגדיר פונקציה חח"ע ועל מצד אחד לצד השני, מכאן שאם יש בגרף דו-צדדי זיווג מושלם אז צדדיו באותו גודל.

טענה 6.4. אם קיימים $v, u \in V_1$ שדרגתם היא 1 וקיים $w \in V_2$ כך ש- $\{w, v\}, \{w, u\} \in E$ אז אין ב- G זיווג מושלם.

טענה 6.5. לכל $S \subseteq V_1$ מתקיים $N(S) \subseteq V_2$.

טענה 6.6. אם יש ב- G זיווג מושלם אז לכל $S \subseteq V_1$ מתקיים $|N(S)| \geq |S|$.



זוהי הכללה של טענה 6.4.

משפט 6.7. משפט החתונה - משפט הול³

אם $|V_1| = |V_2|$ וגם לכל $S \subseteq V_1$ מתקיים $|N(S)| \geq |S|$ אז יש ב- G זיווג מושלם.



בהנחה ש- $|V_1| = |V_2|$ מתקיים: יש ב- G זיווג מושלם אם"ם $|N(S)| \geq |S|$ לכל $S \subseteq V_1$.

טענה 6.8. אם G הוא גם d -רגולרי (עבור $d \in \mathbb{N}$ כלשהו⁴) אז יש ב- G זיווג מושלם.

³ערך בוויקיפדיה: פיליפ הול.

⁴ d בהכרח שונה מ-0.