

מטריצות ומרחבי קואורדינטות - טענות בלבד

אלגברה ליניארית (1) - 80134

מרצה: ערן נבו

מתרגלים: איתמר ישראלי ושני שלומי

סוכם ע"י: שריה אנסבכר

סמסטר ב' תשפ"ב, האוני' העברית

תוכן העניינים

3	1 התחלה
3	1.1 מרחב המטריצות
3	1.2 כפל מטריצה בווקטור
4	1.3 כפל מטריצות
5	2 מטריצת היחידה ומטריצות הפיכות
5	3 פתרון מערכות משוואות ליניאריות
5	3.1 התחלה
5	3.2 מטריצה מדורגת-מצומצמת
6	3.3 פעולות שורה אלמנטריות
6	3.4 אלגוריתם הדירוג - אלימינצית גאוס
7	3.5 הפתרון
10	3.6 מטריצות אלמנטריות
11	4 המטריצה המשוחלפת, מטריצות משולשיות ומטריצות אלכסוניות
11	4.1 המטריצה המשוחלפת
11	4.2 מטריצות משולשיות ומטריצות אלכסוניות
11	5 מרחב הקואורדינטות והדרגה של מטריצה
11	5.1 מרחב הקואורדינטות
13	5.2 ארגז כלים
14	5.3 דרגה של מטריצה

אשמח לקבל הערות והארות על הסיכומים על מנת לשפרם בעתיד,
 כל הערה ולו הפעוטה ביותר (אפילו פסיק שאינו במקום או רווח מיותר) תתקבל בברכה;
 אתם מוזמנים לכתוב לי לתיבת הדוא"ל: sraya.ansbacher@mail.huji.ac.il.

לסיכומים נוספים היכנסו לאתר:
 אקסיומות השלמות - סיכומי הרצאות במתמטיקה
<https://srayaa.wixsite.com/math>

1 התחלה

יהי \mathbb{F} שדה ויהיו $m, n \in \mathbb{N}$.

1.1 מרחב המטריצות

אין טענות בסעיף זה.

1.2 כפל מטריצה בווקטור

טענה 1.1. לכל $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ מתקיים $A \cdot \vec{0} = \vec{0}$.

טענה 1.2. תהא $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ ויהי $v \in \mathbb{F}^n$, אם השורה ה- i של A היא שורת אפסים אז $A \cdot v$ הוא וקטור שבקואורדינטה ה- i שלו יופיע 0 (עבור $0 \leq i \leq m$).

טענה 1.3. לכל $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ העמודה ה- j של A היא $A \cdot e_j$ (עבור $1 \leq j \leq n$).

♣ כלומר אנחנו יודעים בדיוק לאן מעתיקה T_A כל אחד מהווקטורים בבסיס הסטנדרטי, תכף נראה מדוע זה חשוב.

מסקנה 1.4. תהיינה $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$, מתקיים $A = B$ אם"ם לכל $v \in \mathbb{F}^n$ מתקיים $T_A(v) = A \cdot v = B \cdot v = T_B(v)$ (כלומר אם"ם $T_A = T_B$).

משפט 1.5. תכונות של כפל מטריצה בווקטור

יהיו $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$, $x, y \in \mathbb{F}^n$ ו- $c \in \mathbb{F}$; מתקיימים שלושת הפסוקים הבאים:

- פילוג (דיסטריבוטיביות) ביחס לחיבור וקטורי - $T_A(x + y) = A \cdot (x + y) = A \cdot x + A \cdot y = T_A(x) + T_A(y)$.
- פילוג (דיסטריבוטיביות) ביחס לחיבור מטריצות - $T_{A+B}(x) = (A + B) \cdot x = A \cdot x + B \cdot x = T_A(x) + T_B(x)$.
- קיבוץ וחילוף ביחס לכפל בסקלר¹ - $T_A(c \cdot x) = A \cdot (c \cdot x) = (c \cdot A) \cdot x = c \cdot (A \cdot x) = c \cdot T_A(x)$.

♣ שתי התכונות הללו אומרות שכפל מטריצה בווקטור **שומר על המבנה** של \mathbb{F}^n כמרחב קואורדינטות עם פעולות החיבור הווקטורי והכפל בסקלר, מכאן שכפל מטריצה בווקטור מעתיק תתי-מרחבים של \mathbb{F}^n לתתי-מרחבים של \mathbb{F}^m .

♣ בגלל התכונה השנייה לא נטרח לכתוב סוגריים בביטויים כגון $c \cdot A \cdot x$ או $A \cdot c \cdot x$.

מסקנה 1.6. תהא $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$, לכל $v_1, v_2, \dots, v_r \in \mathbb{F}^n$ ולכל $a_1, a_2, \dots, a_r \in \mathbb{F}$ מתקיים:

$$T_A\left(\sum_{i=1}^r a_i \cdot v_i\right) = A \cdot \left(\sum_{i=1}^r a_i \cdot v_i\right) = \sum_{i=1}^r a_i \cdot A \cdot v_i = \sum_{i=1}^r a_i \cdot T_A(v_i)$$

♣ בפרט לכל $x \in \mathbb{F}^n$ מתקיים:

$$T_A(x) = T_A\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}\right) = T_A\left(\sum_{i=1}^n x_i \cdot e_i\right) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot T_A(e_i) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot c_i$$

כאשר c_i היא העמודה ה- i של A . כלומר אם אנחנו יודעים כיצד T_A פועלת על איברי הבסיס הסטנדרטי (וכפי שראינו אנחנו אכן יודעים זאת עבור A נתונה) אז אנחנו יודעים בדיוק כיצד פועלת הפונקציה T_A על מרחב הקואורדינטות \mathbb{F}^n .

¹לא כתבנו את הביטוי $(A \cdot c) \cdot x$ מפני שהכפל בסקלר מוגדר משמאל בלבד.

1.3 כפל מטריצות

יהי $l \in \mathbb{N}$

טענה 1.7. תהייה $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ ו- $B \in M_{l \times m}(\mathbb{F})$, מתקיים:

• אם העמודה ה- j של מטריצה A היא עמודת אפסים אז העמודה ה- j של $B \cdot A$ היא עמודת אפסים (לכל $n \geq j \in \mathbb{N}$).

• אם השורה ה- i של מטריצה B היא שורת אפסים אז השורה ה- i של $B \cdot A$ היא שורת אפסים (לכל $l \geq i \in \mathbb{N}$).

משפט 1.8. תהייה $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ ו- $B \in M_{l \times m}(\mathbb{F})$, לכל $x \in \mathbb{F}^n$ מתקיים $T_B(T_A(x)) = B \cdot (A \cdot x) = (B \cdot A) \cdot x = T_{B \cdot A}(x)$.

♣ כלומר כפל מטריצות שקול להרכבת ההעתקות המוגדרות על ידן - מתקיים $T_B \circ T_A = T_{B \cdot A}$.

משפט 1.9. תכונות של כפל מטריצות

תהייה $A, A_0 \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$, $B, B_0 \in M_{l \times m}(\mathbb{F})$ ו- $C \in M_{k \times l}(\mathbb{F})$ ו- $x \in \mathbb{F}^n$, מתקיים:

• קיבוץ (אסוציאטיביות) - $(C \cdot B) \cdot A = C \cdot (B \cdot A)$.

• פילוג (דיסטריוטיביות) ביחס לחיבור מטריצות - $B \cdot (A + A_0) = B \cdot A + B \cdot A_0$ ו- $(B + B_0) \cdot A = B \cdot A + B_0 \cdot A$.

• קיבוץ וחילוף ביחס לכפל בסקלר - $B \cdot (x \cdot A) = (x \cdot B) \cdot A = x \cdot (B \cdot A)$.

♣ בגלל התכונה הראשונה לא נטרח לכתוב סוגריים בביטוי $C \cdot B \cdot A$.

♣ מכיוון שראינו את השקילות בין חיבור/כפל מטריצות לחיבור/הרכבת הפונקציות המוגדרות על ידן נוכל לנסח את המשפט בשפה של פונקציות:

• קיבוץ (אסוציאטיביות) - בתכונה זו הכיוון הוא הפוך: אנחנו יודעים שכפל מטריצות מקיים חוק הקיבוץ מפני שהוא שקול להרכבת פונקציות וכל הרכבת פונקציות מקיימת קיבוץ.

• פילוג (דיסטריוטיביות) ביחס לחיבור פונקציות - $T_A \circ (T_B + T_C) = T_A \circ T_B + T_A \circ T_C$.

• קיבוץ וחילוף ביחס לכפל בסקלר - $T_A \circ (x \cdot T_B) = (x \cdot T_A) \circ T_B = x \cdot (T_A \circ T_B)$.

♣ כפל מטריצות אינו מקיים חילוף, לדוגמה:

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 17 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 8 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

2 מטריצת היחידה ומטריצות הפיכות

יהי \mathbb{F} שדה ויהא $n \in \mathbb{N}$.

טענה 2.1. אם למטריצה יש שורת אפסים או עמודת אפסים אז היא אינה הפיכה.

טענה 2.2. לכל $A \in M_{m \times n}$ מתקיים $I_m \cdot A = A = A \cdot I_n$.

מסקנה 2.3. לכל $v \in \mathbb{F}^n$ מתקיים $T_{I_n}(v) = I_n \cdot v = v = \text{Id}(v)$.

♣ **מסקנה** זו היא הסיבה לכך שמטריצת היחידה נקראת גם מטריצת הזהות.

טענה 2.4. תהא $P \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה הפיכה, גם T_P הפיכה.

מסקנה 2.5. תהא $P \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה הפיכה, קיימת $Q \in M_n(\mathbb{F})$ יחידה כך ש- $P \cdot Q = I_n = Q \cdot P$.

מסקנה 2.6. תהא $P \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה הפיכה מתקיים $(T_P)^{-1} = T_{P^{-1}}$.

מסקנה 2.7. לכל $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ מתקיים $A \cdot B = I_n$ אם ורק אם $B \cdot A = I_n$.

מסקנה 2.8. תהא $A \in M_n(\mathbb{F})$, אם קיימת $B \in M_n(\mathbb{F})$ כך ש- $A \cdot B = I_n$ ואז $B \cdot A = I_n$ או הפיכה ו- $A^{-1} = B$ (כלומר $B \cdot A = I_n$ וגם $A \cdot B = I_n$).

טענה 2.9. תהיינה $P, Q \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצות הפיכות, $P \cdot Q$ היא מטריצה הפיכה וההופכית שלה היא $Q^{-1} \cdot P^{-1}$.

♣ ניתן להסיק מכאן שכל מכפלה של מטריצות הפיכות היא מטריצה הפיכה וההופכית שלה היא מכפלת המטריצות ההופכיות בסדר הפוך.

3 פתרון מערכות משוואות ליניאריות

יהי \mathbb{F} שדה ויהיו $m, n \in \mathbb{N}$.

3.1 התחלה

טענה 3.1. תהא $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ מטריצת המערכת של ממ"ל כלשהי² ויהי $b \in \mathbb{F}^m$ וקטור המקדמים החופשיים של אותה מערכת, אוסף הפתרונות של הממ"ל הוא:

$$\{x \in \mathbb{F}^n \mid A \cdot x = b\}$$

♣ כלומר אוסף הפתרונות הוא קבוצת הווקטורים ב- \mathbb{F}^n ש- T_A מעתיקה אל b , כלומר זהו המקור של b - $(T_A)^{-1}(\{b\})$.

מסקנה 3.2. מטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$ היא מטריצה הפיכה אם ורק אם לכל $b \in \mathbb{F}^n$ קיים פתרון יחיד לממ"ל $A \cdot x = b$ והוא $x = A^{-1} \cdot b$.

3.2 מטריצה מדורגת-מצומצמת

אין טענות בסעיף זה.

²מהגדרה זוהי מערכת של m משוואות ב- n נעלמים.

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

טענה 3.3. כל פעולת שורה אלמנטרית היא פונקציה הפיכה וההופכית שלה גם היא פעולת שורה אלמנטרית מאותה צורה.

משפט 3.4. תהא $A \in M_{m \times n+1}(\mathbb{F})$ מטריצת מערכת מורחבת של ממ"ל כלשהי ותהא $\varepsilon : M_{m \times n+1}(\mathbb{F}) \rightarrow M_{m \times n+1}(\mathbb{F})$ פש"א, אוסף הפתרונות של הממ"ל המתאימה ל- $\varepsilon(A)$ זהה לאוסף הפתרונות של הממ"ל המתאימה ל- A .

♣ שימו לב שאנו מבצעים את פעולות השורה אלמנטריות גם על עמודת המקדמים החופשיים.

מסקנה 3.5. שתי מערכות משוואות ליניאריות שמטריצות המערכת המורחבת שלהן שקולות שורה הן בעלות אותו אוסף פתרונות.

3.4 אלגוריתם הדירוג - אלימינציית גאוס

אלגוריתם 1 אלגוריתם הדירוג - אלימינציית גאוס

תהא $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$, נרצה למצוא מטריצה $B \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ כך ש- $B \sim A$ ו- B מדורגת-מצומצמת. נסמן $B := A$, $i := 1$ ו- $j := 1$. כל עוד $i \leq m$ וגם $j \leq n$:

• אם קיים $m \geq k \geq i$ כך ש- $[B]_{kj} \neq 0$:

1. נבחר k כמ"ל ונחליף את השורה ה- i עם השורה ה- k , כעת מתקיים $[B]_{ij} \neq 0$.

2. נכפול את השורה ה- i ב- $[B]_{ij}^{-1}$, כעת מתקיים $[B]_{ij} = 1$.

3. לכל $m \geq l \in \mathbb{N}$ כך ש- $l \neq i$:

- נחסר מהשורה ה- l את השורה ה- i כשהיא מוכפלת ב- $[B]_{lj}$, כעת מתקיים $[B]_{lj} = 0$.

4. כעת מתקיים $[B]_{lj} = 0$ לכל $m \geq l \in \mathbb{N}$ כך ש- $l \neq i$, נסמן $i := i + 1$ ו- $j := j + 1$ ונעבור לשלב הבא בלולאה.

• אחרת, נסמן $j := j + 1$ ונעבור לשלב הבא בלולאה.

כעת B היא מטריצה מדורגת-מצומצמת ומהגדרה היא שקולת שורה ל- A .

♣ סעיף 1 הוא השלב היחיד באלגוריתם שבו אנו יכולים לבחור כיצד לפעול - זהו המקום היחיד באלגוריתם הדירוג שבו ניתן להפעיל את השכל על מנת לקצר את התהליך.

♣ סעיף 2 הוא היחיד שדורש עבודה מעל שדה, זוהי אותה נקודה שהזכרנו בתחילת קובץ ההגדרות שאינה נכונה עבור מטריצות מעל חוגים; מסיבה זו אלגוריתם הדירוג אינו עבוד מעל חוגים.

♣ אם בתהליך הדירוג הפכה אחת השורות לשורת אפסים פירושו של דבר הוא שניתן לבטא אותה כצ"ל של שאר השורות ולכן היא מיותרת במערכת המשוואות, את כל מה שיש לה לומר על אוסף הפתרונות כבר אמרו האחרות.

מסקנה 3.6. לכל מטריצה $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ קיימת מטריצה מדורגת-מצומצמת $R \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ כך ש- $R \sim A$.

♣ מיד נראה כיצד אלגוריתם הדירוג מאפשר לנו לפתור מערכות משוואות ליניאריות בקלות, ובהמשך נראה שיש לו שימושים נוספים.

בוויקיספר נכתב שמטריצה המדורגת-מצומצמת גם יחידה, למה זה נכון?

3.5 הפתרון

כעת נוכל למצוא את אוסף הפתרונות של כל ממ"ל מעל שדה, נפעיל את אלגוריתם הדירוג על מטריצת המערכת המורחבת של הממ"ל ונקבל מטריצה מדורגת-מצומצמת שאוסף הפתרונות של הממ"ל המתאימה לה זהה לזה של הממ"ל המקורית, כעת ניתן לראות שישנם שלושה סוגים של פתרונות (תרשים זרימה מסכם יופיע בסוף הסעיף)³:

1. אם **קיים איבר מוביל בעמודת המקדמים החופשיים** אז **אין לממ"ל פתרונות** (שהרי השורה שבה נמצא אותו איבר מוביל אומרת ש- $0 = \sum_{i=1}^n 0 \cdot x_i \neq 0$), במקרה כזה אוסף הפתרונות הוא **הקבוצה הריקה**.

2. אם **אין איבר מוביל בעמודת המקדמים החופשיים** וגם **בכל עמודה אחרת יש איבר מוביל** אז **יש לממ"ל פתרון יחיד** והוא הווקטור המורכב מ- n הקואורדינטות הראשונות של וקטור המקדמים החופשיים (לאחר הדירוג)⁵, במקרה כזה אוסף הפתרונות הוא **היחידון המכיל הווקטור הזה**.

3. אם **אין איבר מוביל בעמודת המקדמים החופשיים** וגם **קיימת עמודה אחרת שאין בה איבר מוביל** אז **לממ"ל יש אינסוף פתרונות**⁶.

כדי למצוא את אוסף הפתרונות במקרה כזה, נפעל לפי השלבים הבאים:

- נכתוב את הממ"ל של המטריצה המדורגת-מצומצמת.
- נבטא את המשתנים התלויים באמצעות החופשיים.
- נכתוב וקטור כללי שבו האיברים יהיו המשתנים (לפי הסדר שלהם), כאשר המשתנים התלויים יבוטאו באמצעות המשתנים החופשיים; אוסף הפתרונות יהיה קבוצת כל הווקטורים מהצורה הכללית הנ"ל.

דוגמה 3.7. נדגים את שלושת המקרים.

1. לממ"ל המיוצגת ע"י המטריצה:

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 0 & 1 & -2 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

אין פתרון.

2. לממ"ל המיוצגת ע"י המטריצה⁷:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$\text{יש פתרון יחיד והוא הווקטור } \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

³אנו עובדים כעת עם מטריצה מדורגת-מצומצמת שהיא המטריצה המורחבת של המערכת החדשה, זוהי מטריצה בעלת m שורות ו- n עמודות - ללא עמודת המקדמים החופשיים (כלומר יש בה בעצם $n+1$ עמודות).

⁴האפס שבאגף ימין מציין את האיבר המוביל בעמודת המקדמים החופשיים שאינו 0, האגף האמצעי הוא השורה המתאימה במערכת המשוואות הליניאריות והאפס שבאגף ימין הוא הערך שהיא אמורה לקבל כדי שיהיה פתרון.

⁵אם $m < n$, כלומר מספר השורות במטריצה קטן ממספר העמודות אז לא ייתכן שבכל עמודה יש איבר מוביל.

⁶או, אם השדה המדובר סופי, מספר הפתרונות שווה למספר האיברים בשדה בחזקת מספר המשתנים החופשיים.

⁷הדרך היחידה שבה מתקיים המקרה השני היא ש- n השורות הראשונות הן מטריצה היחידה כשמימינה עמודת המקדמים החופשיים שבה יכול להופיע כל איבר בשדה בשורות אלה, ומתחת לכל זה יש אך ורק שורות אפסים (כולל בעמודת המקדמים החופשיים).

3. בשביל המקרה השלישי נביא את המטריצה הבאה (זו שהבאנו כבר בקובץ ההגדרות):

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 0 & 1 & -2 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

• הממ"ל המתאימה לה היא:

$$\begin{cases} x_2 - 2x_3 - x_5 = 3 \\ x_4 + 2x_5 = -1 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

• מכאן שמתקיים:

$$\begin{cases} x_2 = 2x_3 + x_5 + 3 \\ x_4 = -2x_5 - 1 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

• ולכן אוסף הפתרונות הוא:

$$\left\{ \left[\begin{array}{c} x_1 \\ 2x_3 + x_5 + 3 \\ x_3 \\ -2x_5 - 1 \\ x_5 \end{array} \right] \mid x_1, x_3, x_5 \in \mathbb{F} \right\}$$

• ואז נוכל (ופעמים רבות נידרש לכך) להמיר את ההצגה הקודמת להצגה פרמטרית:

$$\left\{ \left[\begin{array}{c} x_1 \\ 2x_3 + x_5 + 3 \\ x_3 \\ -2x_5 - 1 \\ x_5 \end{array} \right] \mid x_1, x_3, x_5 \in \mathbb{F} \right\} = \left\{ \left[\begin{array}{c} 0 \\ 3 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{array} \right] + x_1 \cdot \left[\begin{array}{c} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right] + x_3 \cdot \left[\begin{array}{c} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right] + x_5 \cdot \left[\begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{array} \right] \mid x_1, x_3, x_5 \in \mathbb{F} \right\}$$

המעבר מההצגה הקודמת להצגה הפרמטרית נעשה ע"י פירוק הווקטור הכללי למספר וקטורים (כמספר המשתנים החופשיים ועוד 1), כאשר בווקטור הראשון שמנו את כל המספרים שאינם מוכפלים במשתנה חופשי, בשני את כל אלו שמוכפלים ב- x_1 , בשלישי את כל אלו שמוכפלים ב- x_3 וכן הלאה. באופן כללי ההצגה הפרמטרית תיראה כך:

$$\left\{ u_0 + t_1 \cdot u_1 + t_2 \cdot u_2 + \dots + t_m \cdot u_m \mid \forall m \geq i \in \mathbb{N} : t_i \in \mathbb{F}, \forall m \geq i \in \mathbb{N}_0 : u_i \in \mathbb{F}^n \right\}$$


כאשר $m + 1 \leq n$.



שימו לב: ההצגה הפרמטרית אינה יחידה, כפי שהזכרנו כבר בקובץ ההגדרות אוסף הפתרונות של ממ"ל הוא ישיריה (אם אינו ריק) - הווקטור הראשון בהצגה הפרמטרית הוא הווקטור שעל פיו אנו מזוים את מרחב הכיוונים והשאר הם בסיס⁸ של מרחב הכיוונים וכבר ראינו שלתמ"ו יכולים להיות בסיסים רבים וכל וקטור בישרייה מתאים בתור הווקטור הקובע כיצד להזיז את מרחב הכיוונים.

⁸מהגדרה הם פורשים את מרחב הכיוונים והם בת"ל מפני שלכל אחד מהם יש קואורדינטה אחת שבה מופיע 1 כשלכל האחרים מופיע 0 באותה קואורדינטה (זו גם ההגדרה של הצגה פרמטרית למי שמתעקש לקבל הגדרה פורמלית).

תרשים זרימה מסכם



3.6 מטריצות אלמנטריות

טענה 3.8. כל מטריצה אלמנטרית היא הפיכה וההופכית שלה היא מטריצה אלמנטרית.

מסקנה 3.9. אם מטריצה מהווה מכפלה של מטריצות אלמנטריות אז היא הפיכה.

טענה 3.10. תהא $\varepsilon : M_{m \times n}(\mathbb{F}) \rightarrow M_{m \times n}(\mathbb{F})$ פשי"א ותהא $E \in M_m(\mathbb{F})$ המטריצה האלמנטרית המתאימה לה, מתקיים $\varepsilon(A) = E \cdot A$ לכל $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$.

מסקנה 3.11. תהיינה $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ שתי מטריצות כך ש- $A \sim B$, קיימת מטריצה $P \in M_m(\mathbb{F})$ המהווה מכפלת מטריצות אלמנטריות המקיימת $P \cdot A = B$.

מסקנה 3.12. מטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$ היא הפיכה אם $A \sim I_n$.

משפט 3.13. תהא $P \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה הפיכה ותהיינה פעולות שורה אלמנטריות המובילות מ- P ל- I_n , כלומר $\varepsilon_r(\varepsilon_{r-1}(\dots \varepsilon_2(\varepsilon_1(P)))) = I_n$.

תהיינה $E_1, E_2, \dots, E_r \in M_n(\mathbb{F})$ המטריצות האלמנטריות המתאימות ל- $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r$ (בהתאמה), א"כ מתקיים $E_r \cdot E_{r-1} \cdot \dots \cdot E_2 \cdot E_1 \cdot P = I_n$.

ולכן $P^{-1} = E_r \cdot E_{r-1} \cdot \dots \cdot E_2 \cdot E_1$ ומכאן שגם $P = (E_1)^{-1} \cdot (E_2)^{-1} \cdot \dots \cdot (E_r)^{-1}$.

♣ בצורה זו אלגוריתם הדירוג נותן לנו דרך למצוא את המטריצה ההופכית של מטריצה נתונה.

מסקנה 3.14. מטריצה ריבועית היא מטריצה הפיכה אם היא ניתנת להצגה כמכפלה של מטריצות אלמנטריות.

טענה 3.15. תהא $A \in M_n(\mathbb{F})$, אם לממ"ל $A \cdot x = \vec{0}$ יש פתרון יחיד אז A הפיכה.

מסקנה 3.16. תהא $A \in M_n(\mathbb{F})$, ארבעת הפסוקים הבאים שקולים זה לזה.

1. A הפיכה.

2. לכל $b \in \mathbb{F}^n$ יש לממ"ל $A \cdot x = b$ פתרון יחיד.

3. לממ"ל $A \cdot x = \vec{0}$ יש פתרון יחיד.

4. לכל $b \in \mathbb{F}^n$ יש לממ"ל $A \cdot x = b$ פתרון.

4 המטריצה המשוכללת, מטריצות משולשיות ומטריצות אלכסוניות

יהי \mathbb{F} שדה ויהיו $m, n \in \mathbb{N}$.

4.1 המטריצה המשוכללת

טענה 4.1. יהי $l \in \mathbb{N}$ ותהייה $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ ו- $B \in M_{l \times m}(\mathbb{F})$, מתקיים $(B \cdot A)^t = A^t \cdot B^t$.

טענה 4.2. תהא $P \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה הפיכה, P^t הפיכה גם היא ומתקיים $(P^t)^{-1} = (P^{-1})^t$.

מסקנה 4.3. תהא $P \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה הפיכה, אם P סימטרית אז גם P^{-1} סימטרית ואם P אנטי-סימטרית אז גם P^{-1} אנטי-סימטרית.

טענה 4.4. ניתן להציג כל מטריצה ריבועית כסכום של מטריצה סימטרית ומטריצה אנטי-סימטרית.

4.2 מטריצות משולשיות ומטריצות אלכסוניות

טענה 4.5. מטריצה משולשית היא הפיכה אם"ם כל האיברים על האלכסון הראשי שלה שונים מאפס.

טענה 4.6. המכפלה של מטריצות משולשיות עליונות היא מטריצה משולשית תחתונה, וכמו כן המכפלה של מטריצות משולשיות תחתונות היא משולשית תחתונה.

5 מרחב הקואורדינטות והדרגה של מטריצה

יהי \mathbb{F} שדה ויהיו $m, n \in \mathbb{N}$.

5.1 מרחב הקואורדינטות

טענה 5.1. יהיו $v_1, v_2, \dots, v_n \in \mathbb{F}^m$ ותהא $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ כך שהעמודה ה- j שלה היא v_j (לכל $j \in \mathbb{N}, n \geq j$), מתקיים:

$$\text{span}(\{v_1, \dots, v_n\}) = \{A \cdot x \mid x \in \mathbb{F}^n\} = \{b \in \mathbb{F}^m \mid \exists x \in \mathbb{F}^n : A \cdot x = b\}$$



כלומר $A \cdot x$ הוא צר"ל של עמודות A ולכן ניתן להציג את פרוש העמודות של A כקבוצת כל הווקטורים מהצורה $A \cdot x$.

מסקנה 5.2. יהיו $v_1, v_2, \dots, v_n \in \mathbb{F}^n$ ותהא $A \in M_n(\mathbb{F})$ כך שהעמודה ה- j של A היא v_j (לכל $j \in \mathbb{N}, n \geq j$), הסדרה (v_1, v_2, \dots, v_n) היא בסיס אם"ם A הפיכה.

משפט 5.3. תכונות של וקטור הקואורדינטות

יהי V מ"ו נ"ס מעל \mathbb{F} כך ש- $\dim V = n$.

• לכל $v \in \mathbb{F}^n$ מתקיים $[v]_E = v$ (הוא הבסיס הסטנדרטי).

• לכל בסיס $B := (v_1, \dots, v_n)$ של V מתקיים $[v_j]_B = e_j$ (לכל $j \in \mathbb{N}, n \geq j$).

• יהיו B ו- C בסיסים סדורים של V , אם C מתקבל מ- B ע"י שינוי סדר הווקטורים אז לכל $v \in V$ מתקבל מ- $[v]_B$ ע"י שינוי סדר הקואורדינטות המתאים.

טענה 5.4. יהא $B := (v_1, \dots, v_n)$ בסיס של \mathbb{F}^n , תהא $A \in M_n(\mathbb{F})$ כך שהעמודה ה- j שלה היא v_j לכל $j \in \mathbb{N}, n \geq j$; $[b]_B$ הוא הפתרון היחיד של הממיל $A \cdot x = b$ (לכל $b \in \mathbb{F}^n$).

טענה 5.5. יהיו $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$, $b \in \mathbb{F}^m$ ו- $v \in \mathbb{F}^n$ כך ש- $A \cdot v = b$ ויהי $U := \{x \in \mathbb{F}^n \mid A \cdot x = \vec{0}\}$ מתקיים:

$$\{v\} + U = \{x \in \mathbb{F}^n \mid A \cdot x = b\}$$

מסקנה 5.6. אוסף הפתרונות של ממ"ל ב- n נעלמים מעל \mathbb{F} הוא ישרייה ב- \mathbb{F}^n (אם אינו ריק), ואם הוא מכיל את וקטור האפס אז הוא גם תמ"ו של \mathbb{F}^n .

מסקנה 5.7. אוסף הפתרונות של ממ"ל הוא תמ"ו אם"ם היא הומוגנית.

טענה 5.8. תהייה $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ שקולות שורה, פרוש השורות של A שווה לפרוש השורות של B .

טענה 5.9. תהא $R \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ מטריצה מדורגת-מצומצמת, סדרת השורות של R שבהן איבר מוביל היא בסיס של פרוש השורות של R .

♣ בהינתן קבוצת וקטורים $S \subseteq \mathbb{F}^n$ נוכל למצוא בסיס נוח ל- $\text{span} S$ ע"י שימת הווקטורים בשורות מטריצה ודירוג המטריצה, השורות שבהן יש איבר מוביל במטריצה המדורגת-מצומצמת הן בסיס של $\text{span} S$. בסיס זה נוח מאד לעבודה משום שלכל וקטור בו יש קואורדינטה אחת שבה ניצב 1 כשביתר הווקטורים מופיע 0 באותה קואורדינטה (זו גם הסיבה לכך שקבוצה זו היא אכן בסיס).

טענה 5.10. תהייה $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ שקולות שורה, ויהיו $v_1, v_2, \dots, v_n, w_1, w_2, \dots, w_n \in \mathbb{F}^m$ כך ש- v_j ו- w_j מהווים את העמודה ה- j של A ו- B בהתאמה (לכל $j \in \mathbb{N}$, $n \geq j$).

• תהא $S \subseteq \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ תת-קבוצה הפורשת את פרוש העמודות של A ונסמן $T := \{w_j \mid v_j \in S, n \geq j \in \mathbb{N}\}$. פורשת את פרוש העמודות של B .

• תהא $S' \subseteq \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ תת-קבוצה בת"ל ונסמן $T' := \{w_j \mid v_j \in S', n \geq j \in \mathbb{N}\}$ גם T' בת"ל.

♣ מכאן שעבור תת-קבוצה של עמודות A המהווה בסיס של פרוש העמודות שלה, הקבוצה המקבילה בעמודות B היא בסיס של פרוש העמודות של B .

טענה 5.11. תהא $R \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ מטריצה מדורגת מצומצמת, סדרת העמודות של R שבהן איבר מוביל היא בסיס של פרוש העמודות של R .

♣ בהינתן קבוצת וקטורים $S \subseteq \mathbb{F}^m$ נוכל למצוא תת-קבוצה $B \subseteq S$ המהווה בסיס של $\text{span} S$ ע"י שימת הווקטורים בעמודות מטריצה⁹, דירוגה והגדרת B להיות קבוצת הווקטורים ב- S , הנמצאים באינדקסים שבהם יש איבר מוביל במטריצה המדורגת-מצומצמת.

⁹ בכך סידרנו את איברי S בסדרה.

5.2 ארגז כלים

♣ נשים לב לכך שתמ"ו יכול להינתן באחת מארבע הדרכים הבאות:

- פרוש של קבוצת וקטורים (או של סדרה כזו).
- אוסף הפתרונות של ממ"ל הומוגנית.
- חיתוך של תתי-מרחבים נתונים.
- סכום של תתי-מרחבים נתונים.

♣ לפני שנתחיל לפרט את הכלים העומדים לרשותנו נעבור על הבעיות שאותן הם נועדו לפתור, אנו עשויים להידרש לאחת מארבע הפעולות הבאות:

1. המרת הצגה של תמ"ו הנתון כפרוש של קבוצת וקטורים להצגה כאוסף הפתרונות של ממ"ל הומוגנית.
2. מציאת בסיס של תמ"ו הנתון באחת משתי הדרכים הנ"ל¹⁰.
3. מציאת בסיס של חיתוך מרחבים וקטוריים.
4. מציאת בסיס של סכום מרחבים וקטוריים.

כעת נראה כיצד מבצעים כל אחת מארבע הפעולות הללו תוך שימוש במשפטים שלמדנו.

1. יהי $W \subseteq \mathbb{F}^n$ תמ"ו, נרצה למצוא בסיס ל- W .

(א) אם W נתון כאוסף הפתרונות של ממ"ל הומוגנית אז הווקטורים בהצגה פרמטרית של אוסף הפתרונות הם בסיס של W .

(ב) אם W נתון כפרוש של קבוצת וקטורים \mathbb{F}^n נוכל למצוא בסיס של W בשתי דרכים:

- אם אנחנו מחפשים בסיס נוח לחישובים:

נשים את הווקטורים בשורות מטריצה, נדרג אותה וניקח את השורות במטריצה המדורגת-מצומצמת שבהן יש איבר מוביל (טענות 5.8 ו-5.9).

- אם אנחנו מחפשים בסיס שהוא תת-קבוצה של הקבוצה הנתונה:

נשים את הווקטורים בעמודות מטריצה, נדרג אותה וניקח את העמודות במטריצה המקורית שעבורן קיים איבר מוביל באותו אינדקס במטריצה המדורגת-מצומצמת (טענות 5.10 ו-5.11).

♣ כשפותרים שאלה בתרגיל/מבחן כדאי לקרוא את הסעיפים הבאים בשאלה כדי לבחור את הדרך הטובה ביותר להמשך השאלה.

2. יהי $W \subseteq \mathbb{F}^n$ תמ"ו, נרצה למצוא מטריצה $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ כך ש- W הוא אוסף הפתרונות של הממ"ל ההומוגנית $A \cdot x = \vec{0}$. נמצא בסיס נוח לחישובים ע"פ סעיף 1, בסיס כזה "מייצר" הצגה פרמטרית של W , מההצגה הפרמטרית נפעל כפי שפעלנו בפתרון ממ"ל רק בכיוון ההפוך.

3. יהיו $W, U \subseteq \mathbb{F}^n$ תתי-מרחבים, נרצה למצוא בסיס ל- $W \cap U$.

(א) אם W ו- U נתונים שניהם כאוספי פתרונות של מערכות משוואות ליניאריות אז נאחד את שתי המערכות למערכת אחת¹¹ ונמשיך ע"פ סעיף 1א.

¹⁰ובכלל זה המרת הצגה של תמ"ו הנתון כאוסף הפתרונות של ממ"ל הומוגנית להצגה כפרוש של קבוצת וקטורים.
¹¹במטריצות זה אומר שנבנה מטריצה חדשה ששורותיה הן כל השורות של שתי המטריצות המקוריות (לא משנה באיזה סדר).

(ב) אם W נתון כפרוש של קבוצת וקטורים $(W = \text{span}\{v_1, v_2, \dots, v_k\})$ ואילו U נתון ע"י ממ"ל הומוגנית $(U = \{x \in \mathbb{F}^n \mid A \cdot x = \vec{0}\})$ נוכל למצוא בסיס לחיתוך בשתי דרכים:

• נמצא מטריצה $B \in M_{l \times n}(\mathbb{F})$ כך ש- W הוא אוסף הפתרונות של הממ"ל הומוגנית $B \cdot x = \vec{0}$ (ע"פ סעיף 2) ונפעל ע"פ הסעיף הקודם (א3).

• נגדיר מטריצה $B \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ שהעמודה ה- j שלה היא v_j (לכל $k \geq j \in \mathbb{N}$), הביטוי $B \cdot t$ ($t \in \mathbb{F}^k$) הוא צר"ל כלשהו של $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ ולכן ניתן להסיק מאוסף הפתרונות של הממ"ל $A \cdot B \cdot t = \vec{0}$ את קבוצת הצר"ל של $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ ששייכים ל- U כלומר את $U \cap W$; לאחר שנסיק זאת תהיה בידינו קבוצת וקטורים הפורשת את $U \cap W$, כעת ניתן למצוא בסיס לפרוש זה ע"י סעיף ב1.

(ג) אם U ו- W נתונים שניהם כפרוש של קבוצת וקטורים אז נציג אחד מהם כאוסף הפתרונות של ממ"ל הומוגנית ונפעל כבסעיף הקודם¹² (ב3).

4. יהיו $W, U \subseteq \mathbb{F}^n$ תתי-מרחבים, נרצה למצוא בסיס ל- $W + U$.

(א) אם U ו- W נתונים שניהם כפרוש של קבוצת וקטורים אז נאחד את הקבוצות ונמצא בסיס לפרוש של האיחוד ע"פ סעיף ב1.

(ב) אם U ו/או W נתונים כאוסף פתרונות של ממ"ל הומוגנית אז נמצא לכל אחד מהם קבוצה פורשת ע"י סעיף א1 ואז נפעל כבסעיף הקודם (א4).

5.3 דרגה של מטריצה

טענה 5.12. דרגת השורות שווה לדרגת העמודות בכל מטריצה.

טענה 5.13. תהיינה $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ מטריצות שקולות שורה, מתקיים $\text{rk} A = \text{rk} B$.

♣ טענה זו מאפשרת לנו למצוא את הדרגה של מטריצה נתונה ע"י דירוג המטריצה וספירת האיברים המובילים במטריצה המדורגת-מצומצמת.

מסקנה 5.14. תהא $A \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה ריבועית, הפיכה אם"ם $\text{rk} A = n$.

מסקנה 5.15. תהא $P \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה הפיכה, סדרת העמודות של P היא בסיס של \mathbb{F}^n וכמוה גם סדרת השורות של P היא בסיס של \mathbb{F}^n .

טענה 5.16. יהי $l \in \mathbb{N}$ ותהיינה $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ ו- $B \in M_{l \times m}(\mathbb{F})$, מתקיים $\text{rk}(B \cdot A) \leq \min\{\text{rk} A, \text{rk} B\}$.

מסקנה 5.17. תהיינה $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ ו- $B \in M_{n \times m}(\mathbb{F})$, אם $n > m$ אז $B \cdot A \neq I_n$.

מסקנה 5.18. תהיינה $A, B \in M_n(\mathbb{F})$, אם A אינה הפיכה אז גם $A \cdot B$ ו- $B \cdot A$ אינן הפיכות.

משפט 5.19. תהא $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ מטריצה ותהיינה $P \in M_n(\mathbb{F})$ ו- $Q \in M_m(\mathbb{F})$ מטריצות הפיכות, מתקיים:

$$\text{rk}(A \cdot P) = \text{rk} A = \text{rk}(Q \cdot A)$$

כלומר כפל במטריצה הפיכה אינו משנה את דרגת המטריצה.

משפט 5.20. הדרגה של מטריצה שווה לסדר הגדול ביותר של תת-מטריצה הפיכה שלה.

¹²כמובן, אחת האפשרויות בסעיף הקודם אומרת להציג גם את התמ"ו השני כאוסף פתרונות של ממ"ל הומוגנית.

וכאן אני נזכר בבדיחה המתמטית המוכרת אודות ה**רדוקציה** המתמטית:

מתמטיקאי ופיזיקאי נשאלו שניהם "כיצד ניתן להכין תה בחדר שיש בו כוס, קומקום חשמלי מחובר לשקע, תיון וברז?" ענו שניהם "יש למלא את הקומקום במים מן הברז, להרתיח אותם, לשים את התיון בתוך הכוס ולזווג אליה את המים החמים."

לאחר מכן ניתנה להם הבעיה בשינוי קל - הקומקום כבר מלא במים, ענה הפיזיקאי "יש להרתיח את המים בקומקום, לשים את התיון בתוך הכוס ולזווג אליה את המים החמים." ואילו המתמטיקאי ענה "יש לשפוך את המים מן הקומקום, כעת חזרנו לבעיה הקודמת ואותה אנחנו כבר יודעים לפתור..."