

אופרטורים

1 דינמיקה של אופרטור

1.1 הגדרות

נקרא להעתקה ליניארית ממ"י V לעצמו $(f : V \rightarrow V)$ בשם אופרטור¹, נסמן ב- $\text{End}(V)$ את מרחב האופרטורים מ- V לעצמו².

1.1.1 מערכת ליניארית

יהיו V ממ"י ו- $f : V \rightarrow V$ אופרטור על V , הזוג (V, f) נקרא מערכת ליניארית.

תהא (V, f) מערכת ליניארית מעל לשדה $\mathbb{F}$.

סימון: נסמן $\text{Id}_V := f^0$ ולכל $n \in \mathbb{N}$ נסמן $f^n := f \circ f^{n-1}$.

בכל מקום אחר בפירוש של $f^n(x)$ הוא $(f(x))^n$, כלומר העלאה בחזקה ולא הרכבה, תכף נראה למה בקורס זה נוח לנו להגדיר אחרת.

1.2 הצבה של אופרטור/מטריצה בפולינום

יהיו $A \in M_n(\mathbb{F})$ ו- $P(x) := \sum_{i=0}^m a_i \cdot x^i \in \mathbb{F}[x]$, נגדיר $P(f) := \sum_{i=0}^m a_i \cdot f^i$ ונקרא ל- $P(f)$ ההצבה של f בפולינום P , כמו כן נגדיר $P(A) := \sum_{i=0}^m a_i \cdot A^i$ ונקרא ל- $P(A)$ ההצבה של המטריצה A בפולינום P .

נזכור שהוכחנו שהרכבה וסכום של העתקות ליניאריות וכן כפל של ה"ל בסקלר הם העתקות ליניאריות ולכן הצבה של אופרטור בפולינום היא אופרטור על אותו מרחב (ודאי שגם הצבה של מטריצה בפולינום היא מטריצה מאותו סדר גודל).

בקורס הקודם סימנו מטריצה מייצגת של ה"ל בצורה $[f]_C^B$ עבור בסיסים B של התחום ו- C של הטווח, בקורס הזה נתעסק בעיקר באופרטורים (תחום וטווח זהים) ובד"כ גם נרצה לייצג את המרחב באמצעות בסיס מסוים, לכן נסמן את $[f]_B^B$ ע"י $[f]_B$.

הצבה של אופרטור בפולינום מדרגה 0 הוא תמיד כפולה של העתקת הזהות, פעמים רבות נסמן את $\lambda(f) = \lambda \cdot f^0 = \lambda \cdot \text{Id}_V$ (כאשר λ הוא פולינום) ע"י λ בלבד ועל הקורא יהיה מוטל להבין מן ההקשר שבו מדובר.

1.3 מסלול

יהי $v \in V$, נגדיר $O_f(v) := \{f^k(v) \mid k \in \mathbb{N}_0\}$ ונקרא ל- $O_f(v)$ המסלול של v תחת f .

1.4 מסילה

יהי $v \in V$, הסדרה $(f^k(v))_{k=0}^\infty$ תקרא המסילה של v תחת f .

1.5 מרחב ציקלי

יהי $v \in V$, נסמן $Z_f(v) := \text{span}(O_f(v))$ ונקרא ל- $Z_f(v)$ מרחב ציקלי של v תחת f .

הגדרה 1.6. אם קיים $v \in V$ כך ש- $Z_f(v) = V$ אז נאמר ש- v הוא קטור ציקלי ביחס ל- f וש- V הוא ציקלי ביחס ל- f באמצעות v .

1.7 קבוצה שמורה

תהא $S \subseteq V$, נאמר ש- S שמורה/אינווריאנטית תחת f^3 אם מתקיים $f(S) \subseteq S$, כלומר $\text{Im}(f|_S) \subseteq S$.

הגדרה זו תופסת גם עבור תתי-מרחבים וקטוריים וכמובן שבד"כ יעניינו אותנו תמ"וים שמורים ולא סתם קבוצות.

V ו- $\{0_V\}$ מקיימים תכונות רבות באופן טריוויאלי (הם שמורים תחת כל אופרטור לדוגמה) ולכן במקרים רבים (בעיקר כשנרצה למעט אותם) נקרא להם תתי-מרחבים טריוויאליים.

אם V נ"ס וניתן להציג אותו כסכום ישר של תמ"וים שמורים תחת f אז ההצגה המטריציאלית של f בשרשור בסיסים שלהם היא מטריצה אלכסונית לפי בלוקים.

¹במקומות אחרים קוראים לכל העתקה ליניארית בשם "אופרטור", גם אם היא בין שני מרחבים וקטוריים שונים.

²ראינו בקורס הקודם שמדובר במרחב וקטורי.

³במהלך הקורס נתקלנו גם בביטוי "שמורה" שאינו נכון מבחינה לשונית.

תהא (V, f) מערכת ליניארית מעל לשדה $\mathbb{F}$.

טענה 1.8. יהי $v \in V$, מתקיים $Z_f(v) = \{[P(f)](v) \mid P \in \mathbb{F}[x]\}$.

למה 1.9. יהי $v \in V$, $O_f(v)$ ו- $Z_f(v)$ שמורים תחת f .

משפט 1.10. יהי $v \in V$ ויהי $W \subseteq V$ תמיו שמור תחת f כך ש- $v \in W$, מתקיים $Z_f(v) \subseteq W$; כלומר התמיו הציקלי של וקטור הוא התמיו השמור המינימלי ביחס להכלה.

טענה 1.11. יהיו $U, W \subseteq V$ תמיויים שמורים תחת f , $U \cap W$ ו- $U + W$ גם הם שמורים תחת f .

טענה 1.12. אם V נ"ס ו- $\mathcal{B}$ הוא בסיס סדור שלו אז לכל פולינום $P \in \mathbb{F}[x]$ מתקיים $P([f]_{\mathcal{B}}) = [P(f)]_{\mathcal{B}}$.

♣ כדי להוכיח את הטענה נזכר שלכל $T_1, T_2 : V \rightarrow W$, $T_3 : W \rightarrow U$ ולכל $\lambda \in \mathbb{F}$ מתקיים:

$$[T_1 + T_2]_C^B = [T_1]_C^B + [T_2]_C^B$$

$$[\lambda \cdot T_1]_C^B = \lambda \cdot [T_1]_C^B$$

$$[T_3 \circ T_1]_D^B = [T_3]_D^C \cdot [T_1]_C^B$$

כאשר U, W, V ו- U הם מיו נ"ס מעל לשדה $\mathbb{F}$, B, C, D הם בסיסים סדורים שלהם ו- T_1, T_2, T_3 הן העתקות ליניאריות.

טענה 1.13. יהי $W \subseteq V$ תמיו, W שמור תחת f אם W שמור תחת $P(f)$ לכל פולינום $P \in \mathbb{F}[x]$.

♣ קל לראות שהטענה נכונה עבור מונומים ואז מהליניאריות של $c \cdot f^n$ (הצבה של f במונום) תנבע הטענה עבור פולינומים.

משפט 1.14. יהיו $P, G \in \mathbb{F}[x]$, מתקיים $P(f) \circ G(f) = (P \cdot G)(f)$.

הוכחה. יהיו $a_0, a_1, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_m \in \mathbb{F}$ כך שמתקיים:

$$P(x) = \sum_{i=0}^n a_i \cdot x^i$$

$$G(x) = \sum_{j=0}^m b_j \cdot x^j$$

מהליניאריות של f נובע שמתקיים:

$$\begin{aligned} P(f) \circ G(f) &= P(f) \circ \left(\sum_{j=0}^m b_j \cdot f^j \right) = \sum_{j=0}^m b_j \cdot (P(f) \circ (f^j)) \\ &= \sum_{j=0}^m b_j \cdot \left(\left(\sum_{i=0}^n a_i \cdot f^i \right) \circ (f^j) \right) = \sum_{j=0}^m b_j \cdot \left(\sum_{i=0}^n a_i \cdot (f^i \circ f^j) \right) \\ &= \sum_{j=0}^m b_j \cdot \left(\sum_{i=0}^n a_i \cdot f^{i+j} \right) = \sum_{j=0}^m \left(\sum_{i=0}^n a_i \cdot b_j \cdot f^{i+j} \right) \\ &= \sum_{i=0}^n \left(\sum_{j=0}^m a_i \cdot b_j \cdot f^{i+j} \right) = \sum_{k=0}^{n+m} \left(\sum_{i=0}^k a_i \cdot b_{k-i} \right) \cdot f^k = (P \cdot G)(f) \end{aligned}$$

■

מסקנה 1.15. יהיו $P, G \in \mathbb{F}[x]$, מתקיים $P(f) \circ G(f) = G(f) \circ P(f)$.

משפט 1.16. יהיו $v_1, v_2 \in V$, תת-המרחב $Z_f(v_1) \cap Z_f(v_2)$ הוא מרחב ציקלי ביחס ל- f .

הוכחה. ראשית, אם $Z_f(v_1) \cap Z_f(v_2) = \{0_V\}$ אז ודאי שמדובר במרחב ציקלי שכן $\{0_V\} = Z_f(0_V)$, אי"כ נעסוק במקרה שבו $Z_f(v_1) \cap Z_f(v_2) \neq \{0_V\}$.
נתבונן בקבוצת הפולינומים המעתיקים את v_1 אל $Z_f(v_2)$ באמצעות f :

$$I := \{P \in \mathbb{F}[x] : P(f)v_1 \in Z_f(v_2)\}$$

מכיוון ש- $Z_f(v_1) \cap Z_f(v_2) \neq \{0_V\}$ בהכרח קיים בקבוצה פולינום שאינו פולינום האפס, יהי $P \in I$ פולינום שדרגתו היא הנמוכה ביותר ב- I מלבד פולינום האפס ונסמן $v := P(f)v_1$.

מהגדרה $v \in Z_f(v_1) \cap Z_f(v_2)$ ומכיוון שמדובר במרחב שמור תחת f נובע ממשפט 1.10 ש- $Z_f(v) \subseteq Z_f(v_1) \cap Z_f(v_2)$.
יהי $G \in \mathbb{F}[x]$ אי"כ קיים G כך ש- $G(f)v_1 = u$, $u \in Z_f(v_1) \cap Z_f(v_2)$, אי"כ קיים G שייך ל- I .
יהי G כנ"ל ונחלק את G ב- P עם שארית: יהיו $Q, R \in \mathbb{F}[x]$ כך ש- $G = Q \cdot P + R$ ו- $\deg R < \deg P$, נשים לב לכך שמהגדרה I הוא אידאל ולכן $R = G - Q \cdot P \in I$ ומהגדרת P נקבל ש- R הוא פולינום האפס, כלומר $G = Q \cdot P$.

$$\Rightarrow u = G(f)v_1 = (Q \cdot P)(f)v_1 = (Q(f) \circ P(f))v_1 = Q(f)v \in Z_f(v)$$

■ u הנ"ל היה שרירותי ומכאן ש- $Z_f(v) \supseteq Z_f(v_1) \cap Z_f(v_2)$ ולכן $Z_f(v) = Z_f(v_1) \cap Z_f(v_2)$.

2 פולינום מינימלי של וקטור ושל קבוצת וקטורים

2.1 הגדרות

יהי V מ"ו נ"ס⁴ מעל לשדה $\mathbb{F}$ ויהי f אופרטור על V .

למה 2.1. יהי $v \in V$, $0_V \neq v$, אי"כ קיים $n \in \mathbb{N}$ מינימלי כך ש- $(v, f(v), f^2(v), \dots, f^n(v))$ תלויה ליניארית ועבור אותו n קיימים $a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{F}$ יחידים כך ש- $f^n(v) = \sum_{k=0}^{n-1} a_k \cdot f^k(v)$.

הגדרה 2.2. בסימוני הלמה שלעיל: נשים לב ש- $(v, f(v), f^2(v), \dots, f^{n-1}(v))$ הוא בסיס של $Z_f(v)$, בסיס זה נקרא הבסיס הציקלי של $Z_f(v)$ ונסמן אותו ב- $\mathcal{C}_f(v)$.

הגדרה 2.3. פולינום מינימלי

בסימוני הלמה שלעיל: נסמן $\min_v^5(x) := x^n + \sum_{k=0}^{n-1} -a_k \cdot x^k$ ונקרא ל- $\min_v$ הפולינום המינימלי של v תחת f .

♣ מהגדרה הפולינום המינימלי של וקטור האפס הוא 1, ובנוסף, וקטור האפס הוא הווקטור היחיד ש-1 הוא הפולינום המינימלי שלו.

למה 2.4. בסימוניי הלמה שלעיל, נשים לב לכך שמתקיים:

$$[f|_{Z_f(v)}]_{\mathcal{C}_f(v)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & 0 & \ddots & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 & a_{n-2} \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & 1 & a_{n-1} \end{bmatrix}$$

⁴למעשה הסיבה היחידה לדרישה ש- V נ"ס היא כדי שיהיה ברור שהפולינום המינימלי קיים, ניתן להחליף את הדרישה הזו בדרישה שהמסלול של של הווקטור יהיה תלוי ליניארית (כשמדובר בפולינום מינימלי של וקטור) או בדרישה זו על כל הווקטורים בקבוצה/הבסיס שלה (כשמדובר בפולינום מינימלי של קבוצה).

⁵ראינו גם את הסימון $\min_v^f$, שהרי הפולינום המינימלי מוגדר ע"י האופרטור.

הגדרה 2.5. יהי $P(x) := \sum_{k=0}^n b_k \cdot x^k \in \mathbb{F}[x]$ פולינום מתוקן ($b_n = 1$) המטריצה הבאה תקרא המטריצה המלווה של P :

$$C_P := \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -b_0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -b_1 \\ 0 & 1 & 0 & \ddots & 0 & -b_2 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 & -b_{n-2} \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & 1 & -b_{n-1} \end{bmatrix}$$

♣ המטריצה המלווה של $\min_v$ היא $\cdot [f |_{Z_f(v)}]_{C_f(v)}$

הגדרה 2.6. נאמר שפולינום $P \in \mathbb{F}[x]$ מאפס וקטור v תחת f אם מתקיים $P(f)v = 0_V$, כמו כן נאמר ש- P מאפס קבוצה $S \subseteq V$ תחת f אם לכל $s \in S$ מתקיים $[P(f)](s) = 0_V$.

טענה. נניח ש- V נ"ס ותהא $S \subseteq V$ קבוצת וקטורים, קיים פולינום מתוקן $P \in \mathbb{F}[x]$ יחיד המאפס את S תחת f ומקיים שלכל פולינום $G \in \mathbb{F}[x]$ המאפס את S תחת f מתקיים $P \mid G$.

הגדרה 2.7. לאותו P שבטענה האחרונה נקרא הפולינום המינימלי של S ונסמן אותו ב- $\min_S^f$.

⁶ראינו גם את הסימון $\min_S^f$, שהרי הפולינום המינימלי מוגדר ע"י האופרטור.

יהי V מ"י⁷ מעל לשדה $\mathbb{F}$ ויהי f אופרטור על V .

2.2 פולינום מינימלי של וקטור

טענה 2.8. יהי $v \in V$ ויהיו $P, G \in \mathbb{F}[x]$, מתקיים:

1. אם אחד משני הפולינומים הללו מאפס את v תחת f אז גם $P \cdot G$ מאפס את v תחת f .

2. אם שניהם מאפסים את v תחת f אז גם $P + G$ מאפס את v תחת f .

מסקנה 2.9. לכל $v \in V$ ולכל $w \in Z_f(v)$ מתקיים $\min_v(f)w = 0_V$.

טענה 2.10. לכל $v \in V$ מתקיים $\dim Z_f(v) = \deg(\min_v)$.

משפט 2.11. לכל $v \in V$, לא קיים פולינום שדרגתו נמוכה מזו של $\min_v$ והוא מאפס את v תחת f מלבד פולינום האפס, ובנוסף $\min_v$ הוא הפולינום המתוקן היחיד המקיים זאת.

הוכחה. לא ייתכן שקיים פולינום המאפס את v תחת f ודרגתו נמוכה מזו של $\min_v$ משום שאז נקבל צ"ל מתאפס לא טריוויאלי של $\mathcal{C}_f(v)$, ואם היה קיים פולינום מתוקן אחר שדרגתו זהה לשל $\min_v$ והוא מאפס את v תחת f ואז גם פולינום ההפרש שלהם (שדרגתו נמוכה יותר) מאפס את v תחת f . ■

מסקנה 2.12. יהי $v \in V$ ויהי $P \in \mathbb{F}[x]$ פולינום המאפס את v תחת f , מתקיים $\min_v \mid P$.

♣ כדי להוכיח את הטענה נחלק את P ב- $\min_v$ עם שארית (נסמן ב- Q את המנה וב- R את השארית), ומכאן שגם $R = P - Q \cdot \min_v$ מאפס את v תחת f ולכן ממנימליות הדרגה של $\min_v$ נקבל ש- $R = 0$; עוד נחזור לרעיון ההוכחה הזה בהמשך.

מסקנה 2.13. לכל $v \in V$ ולכל $w \in Z_f(v)$ מתקיים $\min_w \mid \min_v$.

מסקנה 2.14. יהי $v \in V$, אם $\min_v$ אי-פריק (וממילא $v \neq 0_V$) אז לכל $w \in Z_f(v)$ מתקיים $0_V \neq w \in Z_f(v)$ ו- $Z_f(w) = Z_f(v)$.

הוכחה. ממשפט 2.10 נובע ש- $Z_f(w) \subseteq Z_f(v)$, מהעובדה ש- $0_V \neq w$ נובע ש- $\min_w \neq 1$ ולכן $\min_w = \min_v$, מטענה 2.10 נובע ש- $\dim Z_f(w) = \dim Z_f(v)$ וממילא $Z_f(w) = Z_f(v)$. ■

טענה 2.15. יהי $v \in V$ כך ש- $\min_v$ הוא פולינום פריק ויהיו $P, Q \in \mathbb{F}[x]$ פולינומים מתוקנים שאינם קבועים כך ש- $\min_v = P \cdot Q$, נגדיר $v := P(f)v$; מתקיים $w \neq 0_V$ ו- $\min_w = Q$.

הוכחה. מהגדרה Q מאפס את w תחת f ולכן $\min_w \mid Q$, מצד שני $P \cdot \min_w$ מאפס את v תחת f ולכן $P \cdot \min_w \mid P \cdot Q$ וממילא $\min_w \mid P$ שכן $P \neq 0$, מהעובדה ש- Q ו- $\min_w$ מתוקנים ומחלקים זה את זה נובע שהם שווים. ■

משפט 2.16. יהי $v \in V$ כך ש- $\min_v$ הוא פולינום פריק ויהיו $P, Q \in \mathbb{F}[x]$ פולינומים מתוקנים שאינם קבועים וזרים זה לזה כך ש- $\min_v = P \cdot Q$, נגדיר $w := P(f)v$ ו- $u := Q(f)v$; מתקיים:

$$Z_f(v) = Z_f(w) \oplus Z_f(u)$$

הוכחה. מהעובדה ש- P ו- Q זרים זה לזה נובע שקיימים $A, B \in \mathbb{F}[x]$ כך ש- $1 = A \cdot P + B \cdot Q$, יהיו A ו- B כ"ל ומכאן שמתקיים:

$$\begin{aligned} v &= [1(f)](v) = [(A \cdot P + B \cdot Q)(f)](v) \\ &= [A(f) \circ P(f)](v) + [B(f) \circ Q(f)](v) \\ &= [A(f)](w) + [B(f)](u) \end{aligned}$$

⁷למעשה הסיבה היחידה לדרישה ש- V נ"ס היא כדי שיהיה ברור שהפולינום המינימלי קיים, ניתן להחליף את הדרישה הזו בדרישה שהמסלול של של הווקטור יהיה תלוי ליניארית (כשמדובר בפולינום מינימלי של וקטור) או בדרישה זו על כל הווקטורים בקבוצה/הבסיס שלה (כשמדובר בפולינום מינימלי של קבוצה).

מכאן שלכל $G \in \mathbb{F}[x]$ מתקיים:

$$\begin{aligned} G(v) &= [G(f) \circ A(f)](w) + [G(f) \circ B(f)](u) \\ &= [G \cdot A(f)](w) + [G \cdot B(f)](u) \end{aligned}$$

כלומר $Z_f(v) = Z_f(w) + Z_f(u)$ ולכן $G(v) \in Z_f(w) + Z_f(u)$.
ע"פ טענה 2.10 מתקיים $\deg(\min_w) = \deg(\min_u) = \deg P$ וכן $\deg(\min_v) = \deg Q$ משפט הממדים מתקיים:

$$\begin{aligned} \dim(Z_f(w) \cap Z_f(u)) &= \dim Z_f(w) + \dim Z_f(u) - \dim Z_f(v) \\ &= \deg Q + \deg P - \deg(P \cdot Q) \\ &= \deg Q + \deg P - (\deg Q + \deg P) = 0 \end{aligned}$$

ומכאן ש- $0_V = Z_f(w) \cap Z_f(u)$ ולכן $Z_f(v) = Z_f(w) \oplus Z_f(u)$ ■

מסקנה 2.17. יהי $v \in V$ ויהיו $P_1, P_2, \dots, P_r \in \mathbb{F}[x]$, $n_1, n_2, \dots, n_r \in \mathbb{N}_0$ ו- $c \in \mathbb{F}$ כך שהפירוק של $\min_v$ לאי-פריקים הוא:

$$\min_v = c \cdot \prod_{i=1}^r (P_i)^{n_i}$$

נגדיר (לכל $i \in \mathbb{N}$):

$$\begin{aligned} Q_i &:= \frac{\prod_{i=1}^r (P_i)^{n_i}}{((P_i)^{n_i})(f)} \\ w_i &:= Q_i(f) v \end{aligned}$$

ואז מתקיים:

$$Z_f(v) = Z_f(w_1) \oplus Z_f(w_2) \oplus \dots \oplus Z_f(w_r)$$

טענה 2.18. יהיו $w, u \in V$ כך ש- $\{0_V\} = Z_f(w) \cap Z_f(u)$ (כלומר $Z_f(w) + Z_f(u)$ הוא סכום ישר) ונסמן $v := w + u$, מתקיים:

$$1. \min_v = \text{lcm}(\min_w, \min_u)$$

$$2. \text{gcd}(\min_w, \min_u) = 1 \text{ אם } Z_f(v) = Z_f(w) \oplus Z_f(u) \text{ אז}$$

הוכחה. מהגדרה $\text{lcm}(\min_w, \min_u)$ הוא כפולה של $\min_w$ ושל $\min_u$ ומכאן שהוא מאפס את w ו- u וממילא גם את v , א"כ $\min_v \mid \text{lcm}(\min_w, \min_u)$.

מצד שני מתקיים $\min_v(f)w = -\min_v(f)u$ ולכן $0_V = \min_v(f)v = \min_v(f)w + \min_v(f)u$ ומכאן ש- $w \in Z_f(v)$ ו- $u \in Z_f(v)$ ולכן מהנתון ש- $\{0_V\} = Z_f(w) \cap Z_f(u)$ נקבל שמתקיים $\min_v(f)w = 0_V$ ו- $\min_v(f)u = 0_V$; ושוב, מתקיים $\min_v \mid \min_w$ ו- $\min_v \mid \min_u$ ולכן מהגדרת ה- lcm נובע ש- $\text{lcm}(\min_w, \min_u) \mid \min_v$.

א"כ $\text{lcm}(\min_w, \min_u)$ ו- $\min_v$ מחלקים זה את זה ושניהם מתוקנים ולכן שווים.

נניח ש- $\text{gcd}(\min_w, \min_u) = 1$, מכאן ש- $\min_w \cdot \min_u = \text{lcm}(\min_w, \min_u) = \min_v$.

ממשפט הממדים ומטענה 2.10 נובע שמתקיים:

$$\begin{aligned} \dim(Z_f(w) + Z_f(u)) &= \dim Z_f(w) + \dim Z_f(u) - \dim \{0_V\} \\ &= \dim Z_f(w) + \dim Z_f(u) \\ &= \deg(\min_w) + \deg(\min_u) \\ &= \deg(\min_w \cdot \min_u) = \deg(\min_v) = \dim Z_f(v) \end{aligned}$$

מצד שני $v \in Z_f(w) + Z_f(u)$ ולכן ע"פ משפט 1.10 מתקיים $Z_f(v) \subseteq Z_f(w) + Z_f(u)$ ומכאן ש- $Z_f(v) = Z_f(w) \oplus Z_f(u)$ ■

טענה 2.19. יהיו $w, u \in V$ כך שהמרחב $Z_f(w) + Z_f(u)$ הוא ציקלי ויהיו $v_1, v_2 \in V$ כך שמתקיים⁸:

$$Z_f(v_1) = Z_f(w) + Z_f(u)$$

$$Z_f(v_2) = Z_f(w) \cap Z_f(u)$$

מתקיים גם:

$$\min_{v_1} = \text{lcm}(\min_w, \min_u)$$

$$\min_{v_2} = \text{gcd}(\min_w, \min_u)$$

הוכחה. מהגדרה $\text{lcm}(\min_w, \min_u)$ הוא כפולה של $\min_w$ ושל $\min_u$ ומכאן שהוא מאפס את w ו- u ולכן גם את $Z_f(v_1) = Z_f(w) + Z_f(u)$.
 $\min_{v_1} \mid \text{lcm}(\min_w, \min_u)$ א"כ v_1 מאפס גם את $Z_f(w) + Z_f(u)$.

מצד שני מהעובדה ש- $\min_{v_1}$ מאפס את v_1 תחת f נובע שהוא מאפס גם את $Z_f(v_1) = Z_f(w) + Z_f(u)$ תחת f וממילא גם את w ו- u , א"כ $\min_{v_1} \mid \text{lcm}(\min_w, \min_u)$ ולכן מהגדרה $\text{lcm}(\min_w, \min_u) \mid \min_{v_1}$.

א"כ $\text{lcm}(\min_w, \min_u)$ ו- $\min_{v_1}$ מחלקים זה את זה ושניהם מתוקנים ולכן שווים.
 $\min_w$ ו- $\min_u$ מאפסים את $Z_f(v_2) = Z_f(w) \cap Z_f(u)$ תחת f ובפרט את v_2 , א"כ $\min_w$ ו- $\min_u$ מתחלקים ב- $\min_{v_2}$ ולכן $\text{gcd}(\min_w, \min_u) \mid \min_{v_2}$.

ממשפט הממדים ומטענה 2.10 נובע שמתקיים:

$$\begin{aligned} \deg(\text{lcm}(\min_w, \min_u)) &= \dim Z_f(v_1) = \dim Z_f(w) + \dim Z_f(u) - \dim(Z_f(w) \cap Z_f(u)) \\ &= \deg(\min_w) + \deg(\min_u) - \deg(\min_{v_2}) \end{aligned}$$

מצד שני מתקיים:

$$\text{lcm}(\min_w, \min_u) = \frac{\min_w \cdot \min_u}{\text{gcd}(\min_w, \min_u)}$$

ולכן:

$$\deg(\text{lcm}(\min_w, \min_u)) = \deg(\min_w) + \deg(\min_u) - \deg(\text{gcd}(\min_w, \min_u))$$

ומכאן ש- $\deg(\text{gcd}(\min_w, \min_u)) = \deg(\min_{v_2})$ (הוכחנו כבר ש- $\min_{v_2} \mid \text{gcd}(\min_w, \min_u)$).
 ■

2.3 פולינום מינימלי של קבוצה

טענה 2.20. נניח ש- V נ"ס ותהא $S \subseteq V$ קבוצת וקטורים, קיים פולינום מתוקן $P \in \mathbb{F}[x]$ יחיד המאפס את S תחת f ומקיים שלכל פולינום $G \in \mathbb{F}[x]$ המאפס את S תחת f מתקיים $P \mid G$.

הוכחה. נסמן ב- P פולינום מתוקן שדרגתו היא הנמוכה ביותר מבין אלו שמאפסים את S תחת f , ויהי $G \in \mathbb{F}[x]$ פולינום המאפס את S תחת f .

נחלק את G ב- P עם שארית: יהיו $Q, R \in \mathbb{F}[x]$ כך ש- $G = Q \cdot P + R$ ו- $\deg R < \deg P$, מכאן שגם $R = G - Q \cdot P$ מאפס את S , ולכן מהגדרת P נובע ש- $R = 0$ ו- $P \mid G$.

היחידות של P נובעת מהעובדה שגם הוא מתחלק בכל פולינום המקיים את התנאים הנ"ל, ומכיוון שאחד התנאים הוא שהפולינום מתוקן העובדה ששניהם מתחלקים זה בזה אומרת שהם שווים.
 ■

טענה 2.21. נניח ש- V נ"ס ויהיו $S, T \subseteq V$ ו- $P \in \mathbb{F}[x]$, מתקיים:

$$1. \min_v \mid \min_S \text{ לכל } v \in S$$

$$2. \text{ אם } P \text{ מאפס את } V \text{ תחת } f \text{ אז } P \mid \min_S$$

⁸ממשפט 1.16 נובע שאכן קיים v_2 כך ש- $Z_f(v_2) = Z_f(w) \cap Z_f(u)$.
⁹אנו לוקחים פולינום מקבוצת הפולינומים בעלי הדרגה הנמוכה ביותר המאפסים את S תחת f ומתקנים אותו.

3. אם $S \subseteq T$ אז $\min_S \mid \min_T$.

4. $\min_v = \min_{Z_f(v)}$ לכל $v \in V$.

5. $\min_S = \min_{\text{span}(S)}$.

משפט 2.22. יהי $W \subseteq V$ תמ"ו שמור תחת אופרטור f ויהיו $P, G \in \mathbb{F}[x]$ פולינומים זרים כך ש- G מאפס את W תחת f , האופרטור $P(f)|_W$ הפיך.

3 פולינום מינימלי של אופרטור, ערכים עצמיים ואופרטורים הניתנים ללכסון

3.1 הגדרות

תהא (V, f) מערכת ליניארית מעל לשדה $\mathbb{F}$.

הגדרה 3.1. נאמר שפולינום $P \in \mathbb{F}[x]$ מאפס את האופרטור f אם לכל $v \in V$ מתקיים $P(f)v = 0_V$.

למה 3.2. אם V נ"ס אז קיים פולינום מתוקן $P \in \mathbb{F}[x]$ יחיד המאפס את f כך שלכל $G \in \mathbb{F}[x]$ המאפס את f מתקיים $P \mid G$.

הגדרה 3.3. לאותו P נקרא הפולינום המינימלי של f ונסמן אותו ב- μ_f , בנוסף, לכל $A \in M_n(\mathbb{F})$ נגדיר את הפולינום המינימלי של A להיות הפולינום המינימלי של ${}^{10}T_A$ ונסמן אותו ב- μ_A .

♣ נשים לב שמתקיים $\min_V^f = \mu_f$ ולכן הרבה ממה שנאמר על μ_f נכון גם על הפולינום המינימלי של כל תמ"ו של V (עם ההתאמות הנדרשות).

הגדרה 3.4. נאמר שסקלר $\lambda \in \mathbb{F}$ הוא ערך עצמי של f אם קיים $v \in V$ כך $0_V \neq v$ ו- $f(v) = \lambda \cdot v$, ל- v כזה נקרא וקטור עצמי עם ערך עצמי λ .

♣ הדרך הכי פשוטה ליצור אופרטור שאין לו ערכים עצמיים היא סיבוב של המישור $(\mathbb{R}^2)$ בזווית שאינה מתחלקת כפולה שלמה של π , ואילו הדרך הכי פשוטה ליצור אופרטור בעל ערכים עצמיים שאינו כפולה של אופרטור הזהות היא שיקוף של המישור סביב ציר סימטריה כלשהו.

הגדרה 3.5. קבוצת הערכים העצמיים של f תקרא הספקטרום של f ותסומן ע"י $\sigma(f)$.

למה 3.6. לכל $\lambda \in \sigma(f)$ נסמן $V_\lambda := \{v \in V \mid f(v) = \lambda \cdot v\}$ ו- $V^\lambda := \{v \in V \mid \exists h \in \mathbb{N} : [(f - \lambda)^h](v) = 0_V\}$. הם תמ"ו של V .

הגדרה 3.7. לכל $\lambda \in \sigma(f)$ נקרא ל- V_λ מרחב עצמי עם ערך עצמי λ ביחס ל- f ול- V^λ נקרא מרחב עצמי מוכלל עם ערך עצמי λ ביחס ל- f .

♣ נשים לב שלכל $\lambda \in \sigma(f)$ מתקיים $V_\lambda = \ker(f - \lambda)$.

הגדרה 3.8. וקטור השייך למרחב עצמי מוכלל עם ערך עצמי $\lambda \in \mathbb{F}$ יקרא וקטור עצמי מוכלל השייך לערך עצמי λ .

הגדרה 3.9. נניח ש- V נ"ס, נאמר ש- f הוא אופרטור ניתן ללכסון או לכסין אם קיים בסיס B של V כך ש- $[f]_B$ היא מטריצה אלכסונית, כמו כן נאמר שמטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$ היא מטריצה לכסינה אם קיימת מטריצה אלכסונית הדומה לה.

♣ מהגדרה אופרטור ניתן ללכסון אם יש לו בסיס של וקטורים עצמיים.

♣ היותה של מטריצה לכסינה מקלה עלינו להעלות אותה בחזקה: תהיינה $A, P, D \in M_n(\mathbb{F})$ כך ש- A לכסינה, P הפיכה ו- $D = P^{-1}AP$ אלכסונית, א"כ לכל $m \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$A^m = (PDP^{-1})^m = (PDP^{-1}) \cdot (PDP^{-1}) \cdot \dots \cdot (PDP^{-1}) = P \cdot D^m \cdot P^{-1}$$

והעלאתה של מטריצה אלכסונית בחזקה היא קלה ונוחה.

¹⁰כזכור, בקורס הקודם הגדרנו לכל $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ את T_A להיות ההעתקה הליניארית מ- $\mathbb{F}^n$ ל- $\mathbb{F}^m$ המוגדרת ע"י $T_A(v) := A \cdot v$ (לכל $v \in V$).

תהא (V, f) מערכת ליניארית מעל לשדה $\mathbb{F}$.

טענה 3.10. המרחבים העצמיים של f והמרחבים העצמיים המוכללים שלו הם תמ"וים שמורים תחתיו.

טענה 3.11. נניח ש- f הפיך (מהגדרה $0 \notin \sigma(f)$), לכל $\lambda \in \mathbb{F}$ $0 \neq \lambda$ מתקיים $\lambda^{-1} \in \sigma(f^{-1}) \iff \lambda \in \sigma(f)$.

טענה 3.12. קבוצת וקטורים שונים מ- 0_V שכל אחד מהם שייך למרחב עצמי מוכלל שונה מזה של האחרים היא קבוצה בת"ל, בפרט קבוצת וקטורים עצמיים בעלי ערכים עצמיים שונים זה מזה היא קבוצה בת"ל.

הוכחה. יהיו $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r \in \sigma(f)$ ערכים עצמיים שונים זה מזה (אם אין כאלה אז הטענה טריוויאלית), ויהיו $v_1, v_2, \dots, v_r \in V$ כך ש- $v_i \in V^{\lambda_i}$ לכל $i \in \mathbb{N}$ $r \geq i$.

נניח בשלילה שאלו וקטורים תלויים ליניארית, אחד מהווקטורים ניתן להצגה כצ"ל של הווקטורים הנותרים, נניח בהג"כ שזהו v_r .

יהיו $n_1, n_2, \dots, n_r \in \mathbb{N}$ כך ש- $\min_{v_i}(x) = (x - \lambda_i)^{n_i}$ לכל $i \in \mathbb{N}$ $r \geq i$ ונסמן $P := \prod_{i=1}^{r-1} (x - \lambda_i)^{n_i}$.

נשים לב לכך ש- $P(f)v_i = 0_V$ לכל $i \in \mathbb{N}$ $r - 1 \geq i$ ומכאן ש- P מאפס תחת f כל צר"ל של הווקטורים הללו ובפרט P מאפס תחת f את v_r , א"כ $\min_{v_r} \mid P$ בסתירה לכך ש- λ_r הוא שורש של $\min_{v_r}$ ואינו שורש של P .

מכאן שהנחת השלילה אינה נכונה ואלו וקטורים בת"ל. ■

טענה 3.13. יהי $v \in V$ $0_V \neq v$, כל שורש של $\min_v$ הוא ערך עצמי של f .

הוכחה. יהי $\lambda \in \mathbb{F}$ שורש של $\min_v$ ויהי $Q \in \mathbb{F}[x]$ כך ש- $Q(x) = (x - \lambda) \cdot Q(x)$.

נסמן $v = Q(f)v$ ומכאן ש- $\lambda = \min_w(x) = x - \lambda \cdot w$ כלומר $\min_w(f)w = f(w) - \lambda \cdot w$ ו- $0_V = \min_w(f)w = \lambda \cdot w$. ■

♣ כמובן שכל ערך עצמי של f הוא שורש של פולינום מינימלי של וקטור כלשהו (למשל וקטור עצמי מתאים).

מסקנה 3.14. אם $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ אז יש ל- f ערך עצמי ומכאן ש- $\sigma(f) \neq \emptyset$ ושל- f יש תת-מרחב שמור מממד 1.

מסקנה 3.15. אם $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ אז יש ל- f תת-מרחב שמור מממד 1 ואז תת-מרחב שמור מממד 2.

נניח ש- V ני"ס.

טענה 3.16. יהי $B := (b_1, b_2, \dots, b_n)$ בסיס של V , מתקיים:

$$\mu_f = \text{lcm}(\min_{b_1}, \min_{b_2}, \dots, \min_{b_n})$$

הוכחה. כל פולינום שמאפס את כל וקטורי הבסיס חייב להתחלק בכל הפולינומים המינימליים שלהם ולכן גם ב- lcm , בפרט μ_f מוכרח לקיים זאת; מצד שני ה- lcm הוא כפולה של כל אחד מהפולינומים המינימליים ולכן הוא מאפס כל אחד מווקטורי הבסיס וממילא גם כל צר"ל שלהם כלומר את כל V , מכאן שה- lcm מתחלק ב- $\mu_f = \min_V$ ומכיוון ששניהם מתוקנים הרי שהם שווים. ■

טענה 3.17. קיים וקטור $u \in V$ כך ש- $\mu_f = \min_u$.

הוכחה. יהי $\mathcal{B} := (b_1, b_2, \dots, b_n)$ בסיס של V , נסמן $u_1 := b_1$ ונבצע את התהליך האינדוקטיבי שיפורט להלן. לכל $n > i \in \mathbb{N}$ נניח ש- $\min_{u_i} = \text{lcm}(\min_{b_1}, \min_{b_2}, \dots, \min_{b_i})$ ונסמן:

$$Q_{i+1} := \gcd(\min_{u_i}, \min_{b_{i+1}})$$

$$w_{i+1} := Q_{i+1}(f) b_{i+1}$$

$$u_{i+1} := u_i + w_{i+1}$$

ומכאן שמתקיים:

$$\min_{w_{i+1}} = \frac{\min_{b_{i+1}}}{\gcd(\min_{u_i}, \min_{b_{i+1}})}$$

א"כ $\min_{u_i}$ ו- $\min_{w_{i+1}}$ זרים זה לזה ולכן מטענה 2.18 נובע שמתקיים:

$$\begin{aligned} \min_{u_{i+1}} &= \text{lcm}(\min_{u_i}, \min_{w_{i+1}}) \\ &= \min_{u_i} \cdot \min_{w_{i+1}} \\ &= \frac{\min_{u_i} \cdot \min_{b_{i+1}}}{\gcd(\min_{u_i}, \min_{b_{i+1}})} \\ &= \text{lcm}(\min_{u_i}, \min_{b_{i+1}}) \\ &= \text{lcm}(\text{lcm}(\min_{b_1}, \min_{b_2}, \dots, \min_{b_i}), \min_{b_{i+1}}) \\ &= \text{lcm}(\min_{b_1}, \min_{b_2}, \dots, \min_{b_{i+1}}) \end{aligned}$$

א"כ u_n מקיים $\min_{u_n} = \text{lcm}(\min_{b_1}, \min_{b_2}, \dots, \min_{b_n}) = \mu_f$ כנדרש. ■

מסקנה 3.18. סקלר $\lambda \in \mathbb{F}$ הוא ערך עצמי של f אם λ הוא שורש של μ_f , במילים אחרות קבוצת השורשים של μ_f היא בדיוק $\sigma(f)$.

מסקנה 3.19. אם μ_f מתפרק לגורמים ליניאריים אז ניתן להציג את V כסכום ישר של מרחבים עצמיים מוכללים.

♣ מכאן שלכל אופרטור על מ"ו מעל $\mathbb{C}$ ניתן להציג את המרחב כסכום ישר של מרחבים עצמיים מוכללים.

הוכחה. נניח ש- μ_f מתפרק לגורמים ליניאריים, יהי $\mathcal{B} := (b_1, b_2, \dots, b_n)$ יהיו $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r \in \mathbb{F}$ כל השורשים של f . לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$ ולכל $r \geq j \in \mathbb{N}$ נסמן ב- k_{ij} היא החזקה הגבוהה ביותר שבה מחלק $x - \lambda_j$ את $\min_{b_i}$, נגדיר:

$$Q_{ij} := \frac{\min_{b_i}}{(x - \lambda_j)^{k_{ij}}}$$

$$w_{ij} := Q_{ij}(f) b_i$$

ונקבל ש- $Z_f(w_{ij}) \subseteq V^{\lambda_j}$ (לכל $r \geq j \in \mathbb{N}$):

$$Z_f(w_{1j}) + Z_f(w_{2j}) + \dots + Z_f(w_{nj}) \subseteq V^{\lambda_j}$$

ראינו שמתקיים (לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$ ולכל $r \geq j \in \mathbb{N}$):

$$Z_f(b_i) = Z_f(w_{i1}) \oplus Z_f(w_{i2}) \oplus \dots \oplus Z_f(w_{ir})$$

כמוכן שמתקיים:

$$V = \sum_{i=1}^n Z_f(b_i) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^r Z_f(w_{ij}) = \sum_{j=1}^r \sum_{i=1}^n Z_f(w_{ij})$$

¹¹עבור $i = 1$ זה אומר ש- $\min_{u_1} = \min_{b_1}$.

ראינו שקבוצת וקטורים שונים מ- 0_V שכל אחד מהם שייך למרחב עצמי מוכלל שונה מזה של האחרים היא קבוצה בת"ל, מכאן שמתקיים:

$$V = \sum_{i=1}^n Z_f(w_{i1}) \oplus \sum_{i=1}^n Z_f(w_{i2}) \oplus \dots \oplus \sum_{i=1}^n Z_f(w_{ir})$$

כעת נטען שלכל $r \geq j \in \mathbb{N}$ מתקיים $\sum_{i=1}^n Z_f(w_{ij}) = V^{\lambda_j}$ יהיו $r \geq k \in \mathbb{N}$ ו- $u \in V^{\lambda_j}$.
יהיו $v_1, v_2, \dots, v_r \in V$ ו- $a_1, a_2, \dots, a_r \in \mathbb{F}$ כך ש- $\sum_{i=1}^n Z_f(w_{ij}) = V^{\lambda_j}$ לכל $r \geq j \in \mathbb{N}$ ומתקיים:

$$u = \sum_{j=1}^n a_j \cdot v_j$$

$$\Rightarrow 0_V = \sum_{j=1}^{k-1} a_j \cdot v_j + (a_k \cdot v_k - u) + \sum_{j=k+1}^r a_j \cdot v_j$$

כפי שראינו הקבוצה $\{v_1, v_2, \dots, v_{k-1}, a_k \cdot v_k - u, v_{k+1}, \dots, v_r\}$ היא קבוצה בת"ל משום שהיא קבוצת וקטורים שונים מ- 0_V שכל אחד מהם שייך למרחב עצמי מוכלל שונה מזה של האחרים, מכאן ש- $a_j = 0$ לכל $r \geq j \in \mathbb{N}$ כך ש- $j \neq k$, כלומר $u = a_k \cdot v_k \in \sum_{i=1}^n Z_f(w_{ik})$ ומכיוון ש- u ו- k היו שרירותיים זה אומר ש- $V^{\lambda_j} \supseteq \sum_{i=1}^n Z_f(w_{ij})$ וממילא $\sum_{i=1}^n Z_f(w_{ij}) = V^{\lambda_j}$. ■

טענה 3.20. התנאים הבאים שקולים:

1. f לכסין.

2. קיים בסיס B של V שבו כל וקטור הוא וקטור עצמי.

3. לכל $v \in V$ $0_V \neq v$ הפולינום $\min_v$ מתפרק לגורמים ליניאריים שונים (ללא חזקות גדולות מ-1).

4. הפולינום המינימלי של f (μ_f) מתפרק לגורמים ליניאריים שונים.

5. ניתן להציג את V כסכום של מרחבים עצמיים מוכללים ובנוסף לכל $\lambda \in \sigma(f)$ מתקיים $V_\lambda = V^\lambda$.

♣ בהמשך נראה תנאי חמישי: ניתן להציג את V כסכום של מרחבים עצמיים מוכללים ובנוסף לכל ערך עצמי $\lambda \in \sigma(f)$ של f הריבוי האלגברי שווה לריבוי הגיאומטרי.

♣ מעל $\mathbb{C}$ ניתן "לוותר" על התנאי שהפולינומים מתפרקים לגורמים ליניאריים / שניתן להציג את V כסכום של מרחבים עצמיים מוכללים מפני שכפי שראינו תנאים אלו מתקיימים תמיד מעל המרוכבים.

טענה 3.21. יהי $P \in \mathbb{F}[x]$ פולינום מתוקן ותהא $C_P \in M_{\deg P}(\mathbb{F})$ המטריצה המלווה של P , מתקיים $\mu_{C_P} = P$.

הוכחה. מהגדרה הפולינום המינימלי של e_1 תחת C_P הוא P ומכיוון שהוא מתוקן, מחלק את μ_{C_P} ודרגתו שווה לממד המרחב הוא מוכרח להיות שווה ל- μ_{C_P} . ■

4 צורת ז'ורדן

4.1 הגדרות

תהא (V, g) מערכת ליניארית מעל לשדה $\mathbb{F}$.

הגדרה 4.1. נאמר ש- g הוא אופרטור נילפוטנטי אם קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $g^n = 0$ (g^n היא העתקת האפס).

הגדרה 4.2. אם g נילפוטנטי אז קיים $h \in \mathbb{N}$ מינימלי המקיים $g^h = 0$, כזה יקרא הגובה של g ויסומן ב- $\text{height}(g)$; כמו כן אם g נילפוטנטי אז לכל $v \in V$ קיים $h \in \mathbb{N}$ מינימלי כך ש- $g^h(v) = 0_V$, כזה יקרא הגובה של v ויסומן ע"י $\text{height}(v)$.

מהגדרה לכל $v \in V$ מתקיים $\text{height}(v) \leq \text{height}(g)$ ושם $h = \text{height}(v)$ אז $\mathcal{C}_g(v) = (v, g(v), g^2(v), \dots, g^h(v))$ ומכאן שאם V נ"ס אז מתקיים גם $\text{height}(g) \leq \dim V$. ♣

נשים לב שאם $h = \text{height}(v)$ אז $\min_v(x) = x^h$ ושם $h = \text{height}(g)$ אז $\mu_g(x) = x^h$. ♣

נשים לב שאם $h = \text{height}(v)$ ו- $w := \sum_{k=j}^{h-1} a_k \cdot g^k(v)$ (כאשר $a_j \neq 0$) אז $\text{height}(w) = h - j$. ♣

הגדרה 4.3. נניח ש- g הוא אופרטור נילפוטנטי ויהי $v \in V$ ונסמן $h := \text{height}(v)$, הבסיס הציקלי $\mathcal{C}_g(v)$ נקרא שרשרת באורך h .¹²

בסיס המהווה שרשרת של בסיסים ציקליים נקרא בסיס שרשראות. ♣

הגדרה 4.4. בלוק ז'ורדן¹³ אלמנטרי עם ערך עצמי $\lambda \in \mathbb{F}$ מסדר n הוא מטריצה $J_n(\lambda) \in M_n(\mathbb{F})$ מהצורה:

$$J_n(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & 1 & \lambda \end{bmatrix}$$

יש המגדירים את בלוקי ז'ורדן בתור המטריצה המשוכללת לזו שהגדרנו (כך למשל הגדירו בוויקיפדיה), אני מנחש שהסיבה לכך היא שהם מסדרים את הבסיס הציקלי בסדר ההפוך מזה שבו הגדרנו אנחנו כך שבאופרטור נילפוטנטי האיבר האחרון בבסיס הציקלי מועתק לזה שלפניו וכן הלאה עד שהראשון מועתק ל-0. ♣

הגדרה 4.5. מטריצה $J \in M_n(\mathbb{F})$ תקרא מטריצת ז'ורדן אם היא מטריצה אלכסונית לפי בלוקים וכל בלוק ז'ורדן שלה הוא בלוק ז'ורדן אלמנטרי.

תהא $A \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה, נאמר שמטריצת ז'ורדן $J \in M_n(\mathbb{F})$ היא צורת ז'ורדן של A אם J דומה ל- A , כמו כן, בהינתן אופרטור f ש- A היא מטריצה מייצגת שלו בבסיס B נאמר ש- J היא צורת ז'ורדן של f ו- B הוא בסיס מז'ורדן של f .

בקובץ הטענות אנחנו נראה ששתי מטריצות ז'ורדן הן דומות אם"ם הן זהות עד כדי שינוי סדר הבלוקים, א"כ לכל מטריצה יש לכל היותר מטריצת ז'ורדן אחת (עד כדי שינוי סדר הבלוקים) וכך ניתן לקבוע באופן חד משמעי אם שתי מטריצות נתונות דומות זו לזו. ♣

¹²ראינו גם את השם " h -שרשרת" שאינו נכון מבחינה לשונית.
¹³ערך בויקיפדיה: קאמי ז'ורדן.

יהי V מ"ו מעל לשדה $\mathbb{F}$.



לפני שנתחיל נסביר את הרעיון מאחורי צורת ז'ורדן: אנו רוצים לייצג כל אופרטור במטריצה פשוטה ככל האפשר כדי שיהיה ברור כיצד הוא פועל על המרחב, ובצורה יחידה כדי שנוכל לקבוע באופן מוחלט אם שתי מטריצות דומות זו לזו. הדרך לעשות זאת היא לפרק את המרחב לסכום ישר של תמ"וים שבכל אחד מהם אנו יודעים כיצד לייצג את האופרטור¹⁴ ע"י מטריצה פשוטה, ואז מכיוון שמדובר בסכום ישר נוכל לשרשר את הבסיסים ולקבל בסיס של המרחב כולו כך שהמטריצה המייצגת של האופרטור בבסיס זה היא מטריצה אלכסונית לפי בלוקים¹⁵ שבה כל בלוק הוא אחת המטריצות הפשוטות שכבר מצאנו; הצורה הפשוטה הזו היא מה שקראנו לו בקובץ ההגדרות בשם "צורת ז'ורדן" של האופרטור וכל בלוק במטריצה הזו הוא מה שקראנו לו "בלוק ז'ורדן אלמנטרי".

4.2 קיום של בסיס מז'ורדן וצורת ז'ורדן

יהי g אופרטור נילפוטנטי על V .

טענה 4.6. יהי $v \in V, v \neq 0$, המטריצה המייצגת של $g|_{Z_g(v)}$ בבסיס $\mathcal{C}_g(v)$ היא $J_h(0)$ כאשר $h := \text{height}(v)$.



כלומר המטריצה המייצגת של $g|_{Z_g(v)}$ בבסיס $\mathcal{C}_g(v)$ היא מטריצה מהצורה:

$$[g|_{Z_g(v)}]_{\mathcal{C}_g(v)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

במטריצה כזו ברור מאד כיצד g פועלת על $Z_g(v)$: האיבר הראשון בבסיס מועתק אל האיבר השני, השני מועתק לשלישי וכך הלאה עד שהאחרון מועתק אל וקטור האפס.

מסקנה 4.7. יהיו $v \in V, v \neq 0$, $\lambda \in \mathbb{F}$ ו- $f \in \text{End}(V)$ כך ש- $g = f - \lambda$, המטריצה המייצגת של $f|_{Z_g(v)}$ בבסיס $\mathcal{C}_g(v)$ היא $J_h(\lambda)$ כאשר $h := \text{height}(v)$.



כלומר המטריצה המייצגת של $g|_{Z_g(v)}$ בבסיס $\mathcal{C}_g(v)$ היא מטריצה מהצורה:

$$[f|_{Z_g(v)}]_{\mathcal{C}_g(v)} = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & \lambda & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \lambda & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 1 & \lambda & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & \lambda \end{bmatrix}$$

גם במטריצה כזו ברור מאד כיצד f פועלת על $Z_g(v)$: כל וקטור v_i בבסיס מועתק אל הווקטור $\lambda \cdot v_i + v_{i+1}$ (כשאר v_{i+1} הוא הווקטור הבא בבסיס) מלבד הווקטור האחרון בבסיס שמוכפל ב- λ מבלי להוסיף לו וקטור אחר.

משפט 4.8. תהא $(v_1, v_2, \dots, v_s)$ סדרת וקטורים שונים מאפס ב- V ותהא $(h_1, h_2, \dots, h_s)$ סדרת הגבהים המתאימים, הסדרה $(\mathcal{C}_g(v_1); \mathcal{C}_g(v_2); \dots; \mathcal{C}_g(v_s))$ בת"ל אס"ם הסדרה $(g^{h_1-1}(v_1), g^{h_2-1}(v_2), \dots, g^{h_s-1}(v_s))$ בת"ל, כלומר סדרת השרשראות בת"ל אס"ם סדרת האיברים האחרונים בכל שרשרת בת"ל.

¹⁴כשהו מצומצם לאותו תמ"ו.

¹⁵חשוב מאד להבין למה העובדה שמדובר בסכום ישר אומרת שהמטריצה המייצגת אלכסונית לפי בלוקים, זהו לב העניין.

¹⁶הסימן "נקודה ופסיק" (";") משמש לציון שמדובר בשרשרת של סדרות, כלומר זוהי סדרת וקטורים ולא סדרה של סדרות וקטורים.

הוכחה. כל סדרה בת"ל מקיימת שכל תת-סדרה שלה היא בת"ל ולכן הכיוון הראשון של המשפט טריוויאלי, נוכיח את הכיוון השני. נניח שהסדרה $(C_g(v_1); C_g(v_2); \dots; C_g(v_s))$ תלויה ליניארית ויהיו $w_1, w_2, \dots, w_n \in V$ כך ש- $(w_1, w_2, \dots, w_n)$ היא הסדרה הנ"ל,

מתלות הליניארית נובע שקיים צר"ל מתאפס לא טריוויאלי של איברי הסדרה, יהיו $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{F}$ כך ש- $\sum_{i=1}^n a_i \cdot w_i = 0_V$. הוא צר"ל כזה ונסמן $h := \max \{ \text{height}(w_i) \mid a_i \neq 0, n \geq i \in \mathbb{N} \}$. נפעיל את g^{h-1} על שני האגפים, מתקיים:

$$0_V = g^{h-1} \left(\sum_{i=1}^n a_i \cdot w_i \right) = \sum_{i=1}^n a_i \cdot g^{h-1}(w_i)$$

באגף שמאל מופיע לפחות וקטור אחד שהמקדם שלו שונה מאפס והוא עצמו אינו וקטור האפס - זהו הווקטור ש- h הוא הגובה שלו, מכאן שקיים לפחות עוד וקטור אחד כזה ומהגדרת h נובע שכל הווקטורים הללו מופיעים בסדרת האיברים האחרונים בכל שרשרת, אי"כ סדרה זו תלויה ליניארית.

הוכחנו שאם סדרת השרשראות תלויה ליניארית אז גם סדרת האיברים האחרונים בכל שרשרת תלויה ליניארית ולכן אם סדרת האיברים האחרונים בת"ל אז גם סדרת השרשראות כזו. ■

משפט 4.9. תהא $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ סדרת וקטורים שונים מאפס, קיימת סדרת שרשראות $(B_1; B_2; \dots; B_s)$ בת"ל כך שמתקיים:

$$\text{span}(B_1; B_2; \dots; B_s) = \text{span}(C_g(v_1); C_g(v_2); \dots; C_g(v_n))$$

מכאן שאם V נ"ס אז יש לו בסיס שרשראות משום שאם $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ הוא בסיס של V אז מתקיים: ♣

$$V = \text{span}(C_g(v_1); C_g(v_2); \dots; C_g(v_n))$$

הוכחה. נניח ש- $(C_g(v_1); C_g(v_2); \dots; C_g(v_n))$ תלויה ליניארית (אחרת סיימנו ואין מה להוכיח שהרי זוהי סדרת שרשראות). ננמק באינדוקציה על סכום אורכי השרשראות.

בסיס האינדוקציה

אם סכום זה הוא 1 אז מדובר בשרשרת אחת באורך 1 המכילה וקטור יחיד שונה מ-0 וממילא מדובר בסדרה בת"ל¹⁷.

צעד האינדוקציה

מספיק להראות שנוכל להקטין את סכום אורכי השרשראות (ע"י "יותר" על שרשרת או החלפתה בשרשרת קצרה יותר) תוך שמירה על הפרוש שלהן.

מהמשפט הקודם (4.8) ומההנחה נובע ש- $(g^{h_1-1}(v_1), g^{h_2-1}(v_2), \dots, g^{h_s-1}(v_n))$ תלויה ליניארית, יהי $\sum_{i=1}^n a_i \cdot g^{h_i-1}(v_i)$ צר"ל מתאפס לא טריוויאלי של סדרה זו (למעשה קיימים שני אינדקסים שהמקדם שלהם שונה מ-0).

יהי $n \geq j \in \mathbb{N}$ האינדקס המקיים $h_j = \min \{h_i \mid a_i \neq 0, n \geq i \in \mathbb{N}\}$.

$$\Rightarrow g^{h_j-1} \left(\sum_{i=1}^n a_i \cdot g^{h_i-h_j}(v_i) \right) = \sum_{i=1}^n a_i \cdot g^{h_i-1}(v_i) = 0_V$$

נגדיר:

$$v' := \sum_{i=1}^n a_i \cdot g^{h_i-h_j}(v_i) = a_1 \cdot g^{h_1-h_j}(v_1) + a_2 \cdot g^{h_2-h_j}(v_2) + \dots + a_j \cdot v_j + \dots + a_n \cdot g^{h_n-h_j}(v_n)$$

$$\Rightarrow v_j = \frac{1}{a_j} \cdot (a_1 \cdot g^{h_1-h_j}(v_1) + a_2 \cdot g^{h_2-h_j}(v_2) + \dots + a_n \cdot g^{h_n-h_j}(v_n) - v')$$

$$\Rightarrow v_j \in \text{span}(C_g(v_1); C_g(v_2); \dots; C_g(v_{j-1}); C_g(v_{j+1}); \dots; C_g(v_n), v')$$

$$\Rightarrow \text{span}(C_g(v_j)) \subseteq \text{span}(C_g(v_1); C_g(v_2); \dots; C_g(v_{j-1}); C_g(v_{j+1}); \dots; C_g(v_n), C_g(v'))$$

$$\Rightarrow \text{span}(C_g(v_1); C_g(v_2); \dots; C_g(v_n)) = \text{span}(C_g(v_1); C_g(v_2); \dots; C_g(v_{j-1}); C_g(v_{j+1}); \dots; C_g(v_n), C_g(v'))$$

¹⁷למעשה בסיס האינדוקציה כולל במקרה הקודם.

השרשרת ${}^{18}\mathcal{C}_g(v')$ בהכרח קצרה יותר מ- $\mathcal{C}_g(v_j)$ ולכן הוכחנו את הדרוש. ■

נניח ש- V נ"ס ותהא $(v_1, v_2, \dots, v_r)$ סדרת וקטורים שונים מאפס כך ששרשור הבסיסים הציקליים שלהם הוא בסיס של V וסדרת הגבהים המתאימה $(h_1, h_2, \dots, h_r)$ מקיימת $h_1 \geq h_2 \geq \dots \geq h_r$.¹⁹

נסמן:

$$\mathcal{B} := (\mathcal{C}_g(v_1); \mathcal{C}_g(v_2); \dots; \mathcal{C}_g(v_r))$$

מסקנה 4.10. מתקיים:²⁰

$$[g]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} J_{h_1}(0) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_{h_2}(0) & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & J_{h_r}(0) \end{bmatrix}$$

וזוהי צורת ז'ורדן של g .

♣ סדרת הגבהים $(h_1, h_2, \dots, h_r)$ (כשהיא מסודרת בסדר יורד) נקראת המציין (Segre) של g .

מסקנה 4.11. יהי $\lambda \in \mathbb{F}$ ויהי f אופרטור על V כך ש- $f = g - \lambda$ מתקיים:

$$[f]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} J_{h_1}(\lambda) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_{h_2}(\lambda) & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & J_{h_r}(\lambda) \end{bmatrix}$$

וזוהי צורת ז'ורדן של f .

מסקנה 4.12. יהי f אופרטור על V כך ש- μ_f מתפרק לגורמים ליניאריים, ויהיו $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r \in \mathbb{F}$ כל הערכים העצמיים של f . נסמן ב- g_i את $f - \lambda_i$ (לכל $i \in \mathbb{N}$, $r \geq i$), מהגדרה g_i הוא אופרטור נילפוטנטי על V^{λ_i} ולכן לכל $r \geq i \in \mathbb{N}$ יש ל- f_i בסיס מז'ורדן עבור V^{λ_i} (וכל זה לכל $r \geq i \in \mathbb{N}$).

שרשור הבסיסים הללו מהווה בסיס של V ולכן הוא מהווה בסיס מז'ורדן של f , כלומר יש ל- f צורת ז'ורדן.

♣ בהמשך נראה שאם μ_f אינו מתפרק לגורמים ליניאריים אז אין ל- f צורת ז'ורדן.

¹⁸ אם $v' = 0_V$ אז מדובר בשרשרת ריקה ואנחנו פשוט "נוותר" על השרשרת של v_j מבלי להוסיף שרשרת אחרת.
¹⁹ מהגדרה מתקיים $h_1 + h_2 + \dots + h_r = \dim V$.
²⁰ כאשר האפסים מציינים בלוקים שהם מטריצת האפס מהגודל המתאים.

מסקנה 4.13. לכל מטריצה מעל $\mathbb{C}$ יש צורת ז'ורדן, וכמו כן לכל אופרטור על מ"מ מעל $\mathbb{C}$ יש צורת ז'ורדן.

♣ תהא $A \in M_n(\mathbb{R}) \subseteq M_n(\mathbb{C})$ ותהא $J \in M_n(\mathbb{C})$ צורת ז'ורדן של A ונניח שכל הקואורדינטות של J ממשיים. האם זה אומר שיש ל- A צורת ז'ורדן מעל הממשיים?
לכאורה התשובה שלילית: העובדה ש- J דומה ל- A ב- $M_n(\mathbb{C})$ (איננו יודעים יותר מזה) אומרת רק שקיימת מטריצה $P \in M_n(\mathbb{C})$ כך ש- $P^{-1}AP = J$, היא לא אומרת שאותה P ממשיית גם היא - אפילו אם J ממשיית; הסיבה לכך שבמפתיע התשובה חיובית נעוצה במתמטיקה גבוהה מזו שלמדנו, אין לי מושג למה זה נכון אבל מצאתי את המשפט הזה בערך "דמיון מטריצות" בוויקיפדיה.

4.3 אלגוריתם למציאת בסיס מז'ורדן וצורת ז'ורדן

נניח ש- V נ"ס.

אלגוריתם 1 למציאת צורת ז'ורדן במרחב ציקלי

יהי $v \in V$ ויהי f אופרטור על V כך ש- $\min_v^f$ מתפרק לגורמים ליניאריים. יהיו $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r \in \mathbb{F}$ ו- $h_1, h_2, \dots, h_r \in \mathbb{N}$ כך שמתקיים:

$$\min_v^f(x) = \prod_{i=1}^r (x - \lambda_i)^{h_i}$$

• לכל $r \geq i \in \mathbb{N}$ נסמן:

$$\begin{aligned} g_i &:= f - \lambda_i \\ Q_i(x) &:= \frac{\min_v(x)}{(x - \lambda_i)^{h_i}} \\ w_i &:= Q_i(f)v \end{aligned}$$

• נסמן $\mathcal{B} := (\mathcal{C}_{g_1}(w_1); \mathcal{C}_{g_2}(w_2); \dots; \mathcal{C}_{g_s}(w_r))$ הוא בסיס שרשראות של $Z_f(v)$ המקיים (לכל $r \geq i \in \mathbb{N}$):

$$[g_i |_{Z_{g_i}(w_i)}]_{\mathcal{C}_{g_i}(w_i)} = J_{h_i}(\lambda_i)$$

ולכן גם:

$$[f |_{Z_f(v)}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} J_{h_1}(\lambda_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_{h_2}(\lambda_2) & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & J_{h_r}(\lambda_r) \end{bmatrix}$$

כלומר $\mathcal{B}$ הוא בסיס מז'ורדן של $f|_{Z_f(v)}$ וזוהי צורת ז'ורדן שלה.

♣ נשים לב לכך ש- $Z_{g_i}(w_i) = V^{\lambda_i}$ לכל $r \geq i \in \mathbb{N}$, נקודה זו חשובה להבנת האלגוריתם הכללי של מציאת צורת ז'ורדן (לאו דווקא במרחבים ציקליים).

אלגוריתם 2 אלגוריתם כללי למציאת צורת ז'ורדן

יהי f אופרטור על V ויהי $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ בסיס של V .

• נמצא את הפולינום המינימלי של v_i לכל $i \in \mathbb{N}$ כך $n \geq i$.

– אם בפירוק לגורמים של אחד מהם מופיע פולינום שאינו ליניארי אז μ_f אינו מתפרק לגורמים ליניאריים ולכן אין ל- f צורת ז'ורדן (עוד לא הוכחנו זאת).

– אחרת נוכל למצוא בסיס שרשראות של $Z_f(v_i)$ (לכל $i \in \mathbb{N}$ כך $n \geq i$) ע"י האלגוריתם הקודם.

• כעת אנו יודעים בדיוק כיצד נראה μ_f ולכן גם $\sigma(f)$ ידועה לנו, יהיו $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r \in \mathbb{F}$ כל הערכים העצמיים של f .

– נסמן $V_i := Z_f(v_i)$ (לכל $i \in \mathbb{N}$ כך $n \geq i$), וכמו כן נסמן ב- $V_i^{\lambda_j}$ את המרחב העצמי המוכלל בעל ערך עצמי λ_j של $f|_{V_i}$ (לכל $i \in \mathbb{N}$ כך $n \geq i$ ולכל $r \geq j$).

– לכל $r \geq j \in \mathbb{N}$ מתקיים $V^{\lambda_j} = V_1^{\lambda_j} + V_2^{\lambda_j} + \dots + V_n^{\lambda_j}$ שכן $V = V_1 + V_2 + \dots + V_n$.

– בשלב הקודם ראינו ש- $V_i^{\lambda_j}$ מהווה מרחב ציקלי ביחס לאופרטור $f - \lambda_j$ ומצאנו בסיס ציקלי מתאים (לכל $i \in \mathbb{N}$ כך $n \geq i$ ולכל $r \geq j \in \mathbb{N}$), כעת יש בידינו קבוצת שרשראות שאיבריהן פורשים את V^{λ_j} ולכן נוכל להשתמש בדרך ההוכחה של משפט 4.9 כדי למצוא בסיס שרשראות של V^{λ_j} (לכל $r \geq j \in \mathbb{N}$).

– האופרטור $f - \lambda_j$ הוא אופרטור נילפוטנטי ב- V^{λ_j} ולכן ההצגה של $f|_{V^{\lambda_j}}$ בבסיס השרשראות הנ"ל היא מטריצה אלכסונית לפי בלוקים שבה כל בלוק הוא בלוק ז'ורדן עם ערך עצמי λ_j (לכל $r \geq j \in \mathbb{N}$).

– נסדר את השרשראות בכל בסיס כזה לפי גודל השרשראות בסדר יורד ונשרשר את הבסיסים זה לזה, מכיוון ש- V הוא סכום ישיר של המרחבים העצמיים שלו התוצאה היא בסיס שרשראות של V שכאשר מייצגים בו את f מקבלים מטריצה בצורת ז'ורדן שלה.

4.4 חזקות של בלוקי ז'ורדן אלמנטריים

טענה 4.14. יהיו $r \in \mathbb{N}$ ו- $\lambda \in \mathbb{F}$, מתקיים (לכל $n \in \mathbb{N}$):

$$(J_r(\lambda))^n = \begin{bmatrix} \lambda^n & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ n \cdot \lambda^{n-1} & \lambda^n & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \binom{n}{2} \cdot \lambda^{n-2} & n \cdot \lambda^{n-1} & \lambda^n & 0 & \ddots & \vdots \\ \binom{n}{3} \cdot \lambda^{n-3} & \binom{n}{2} \cdot \lambda^{n-2} & n \cdot \lambda^{n-1} & \lambda^n & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \binom{n}{r-1} \cdot \lambda^{n-(r-1)} & \binom{n}{r-1} \cdot \lambda^{n-(r-2)} & \dots & \binom{n}{2} \cdot \lambda^{n-2} & n \cdot \lambda^{n-1} & \lambda^n \end{bmatrix}$$

או באופן פורמלי יותר וברור פחות: האיבר בשורה ה- i ובעמודה ה- j הוא:

$$\binom{n}{i-j} \cdot \lambda^{n-(i-j)}$$

כאשר בכל מקום שהביטוי אינו מוגדר²¹ האיבר המדובר הוא 0.

טענה זו מאפשרת לנו לחשב חזקות של מטריצות בעלות צורות ז'ורדן במהירות יחסית ע"י מעבר לבסיס מז'ורדן, העלאה בחזקה של מטריצת ז'ורדן²² המתאימה וחזרה לבסיס המקורי, ממש כפי שעשינו עם מטריצות הניתנות ללכסון.



²¹המקדם הבינומי אינו מוגדר כאשר $i - j < 0$ או כאשר $i - j > n$, ואם $i - j > n$ ובנוסף $\lambda = 0$ אז הביטוי אינו מוגדר מסיבה נוספת: לאפס אין חופכי ולכן אי אפשר להגדיר עליו חזקה שלילית.

²²מכיוון שמטריצת ז'ורדן היא מטריצה אלכסונית לפי בלוקים העלאתה בחזקה נעשית ע"י העלאת כל אחד מן הבלוקים באותה חזקה בנפרד.

הוכחה. אינדוקציה פשוטה מראה שלכל $k \in \mathbb{N}_0$ מתקיים:

$$(J_r(0))^j = \left[\begin{array}{c|c} 0_{k \times (r-k)} & 0_{k \times k} \\ \hline I_{r-k} & 0_{(r-k) \times k} \end{array} \right]$$

כאשר במקרה שבו $k \geq r$ מתקיים זה אומר ש- $0_r = (J_r(0))^k$. מנוסחת הבינום של ניוטון נובע שמתקיים:

$$\begin{aligned} (J_r(\lambda))^n &= (J_r(0) + \lambda \cdot I_r)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (J_r(0))^k \cdot (\lambda \cdot I_r)^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (J_r(0))^k \cdot \lambda^{n-k} \cdot (I_r)^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \lambda^{n-k} \cdot (J_r(0))^k \cdot I_r \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \lambda^{n-k} \cdot (J_r(0))^k \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \lambda^{n-k} \cdot \left[\begin{array}{c|c} 0_{k \times (r-k)} & 0_{k \times k} \\ \hline I_{r-k} & 0_{(r-k) \times k} \end{array} \right] \end{aligned}$$

כעת יש צורך במעט דמיון חזותי כדי להבין שאכן קיבלנו את התוצאה הרצויה: כל אחד מן האיברים בסכום שאינו מטריצת האפס הוא מטריצה שבה אחד מן האלכסוניים זהה לאלה שבטענה ובכל מקום אחר יש בה אפסים, אין שני איברים שבהם מדובר באותו אלכסון ויש איבר לכל אלכסון שאינו אלכסון אפסים במטריצה המופיעה בטענה; אי"כ כל מטריצה בסכום קבועת את האלכסון שלה לבדה ואינה "מפריעה" לאחרות בקביעת האלכסוניים שלהם, התוצאה היא בדיוק המטריצה המופיעה בטענה. ■

5 הפולינום האופייני והריבויים הגאומטריים והאלגבריים

5.1 הגדרות

יהי V מ"ו נ"ס מממד n מעל לשדה $\mathbb{F}$ ויהא f אופרטור על V .

טענה. לכל שתי מטריצות דומות $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ ולכל $\lambda \in \mathbb{F}$ מתקיים:

$$\det(\lambda \cdot I_n - A) = \det(\lambda \cdot I_n - B)$$

הגדרה 5.1. יהי B בסיס של V , הפולינום $\det(x \cdot I_n - [f]_B)$ ²³ נקרא הפולינום האופייני של f ומסומן ע"י χ_f , כמו כן לכל $A \in M_n(\mathbb{F})$ נגדיר $\chi_A := \chi_{T_A}$ ²⁴ ונקרא ל- χ_A הפולינום האופייני של A .

הגדרה 5.2. אם $\lambda \in \mathbb{F}$ הוא ערך עצמי של f אז הריבוי הגאומטרי של λ מוגדר להיות $\dim V_\lambda = \dim(\ker(f - \lambda))$.

הגדרה 5.3. אם $\lambda \in \mathbb{F}$ הוא ערך עצמי של f אז הריבוי האלגברי של λ (ביחס ל- f) הוא הריבוי האלגברי של λ ב- χ_f , כלומר הריבוי האלגברי של λ הוא החזקה של $x - \lambda$ בפירוק של χ_f לגורמים.

יהי V מ"ו נ"ס מממד n מעל לשדה $\mathbb{F}$ ויהא f אופרטור על V .

טענה 5.4. לכל שתי מטריצות דומות $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ ולכל $\lambda \in \mathbb{F}$ מתקיים:

$$\det(\lambda \cdot I_n - A) = \det(\lambda \cdot I_n - B)$$

הוכחה. תהייה $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצות דומות, מכאן שגם $-A$ ו- $-B$ דומות זו לזו (הכפלה בסקלר משמרת דמיון מטריצות), ולכן גם $A - \lambda \cdot I_n$ ו- $B - \lambda \cdot I_n$ דומות זו לזו (הוספת כפולה של מטריצת היחידה משמרת גם היא דמיון מטריצות), ומכאן ש- $\det(\lambda \cdot I_n - A) = \det(\lambda \cdot I_n - B)$. ■

טענה 5.5. קבוצת השורשים של χ_f היא הספקטרום של f .

הוכחה. לכל $\lambda \in \mathbb{F}$ מתקיים $\lambda \in \sigma(f)$ אם ורק אם $\ker(f - \lambda) \neq \{0_V\}$ וזה קורה אם ורק אם $f - \lambda$ היא העתקה שאינה הפיכה, כלומר אם ורק אם המטריצה $[f]_B - \lambda \cdot I_n$ אינה הפיכה (B הוא בסיס כלשהו של V) וזה שקול לכך ש- $[f]_B - \lambda \cdot I_n$ אינה הפיכה ו- $\det(\lambda \cdot I_n - [f]_B) = 0$. כלומר λ הוא שורש של χ_f . ■

משפט 5.6. יהי $P \in \mathbb{F}[x]$ פולינום מתוקן ותהא $C_P \in M_{\deg P}(\mathbb{F})$ המטריצה המלווה של P , מתקיים $\chi_{C_P} = P$.

הוכחה. יהיו $a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{F}$ כך ש- $P(x) = x^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k \cdot x^k$ ו- $n := \deg P$ נפתח את הדטרמיננטה של המטריצה $x \cdot I_n - C_P$ ע"פ העמודה הימנית ביותר (העמודה ה- n);

לכל $n \geq k \in \mathbb{N}$ המינור $(x \cdot I_n - C_P)_{k,n}$ הוא מטריצה אלכסונית לפי בלוקים שבה שני בלוקים: הבלוק השמאלי העליון הוא מטריצה משולשית תחתונה בגודל $k-1$ שעל האלכסון שלה יש רק x -ים והבלוק הימני התחתון הוא מטריצה משולשית עליונה בגודל $n-k$ שעל האלכסונים שלה יש רק 1-ים, א"כ הדטרמיננטה שלהם הן x^{k-1} ו- 1^{n-k} בהתאמה ולכן הדטרמיננטה של המינור $(C_P)_{k,n}$ היא x^{k-1} ²⁵. לכל $n > k \in \mathbb{N}$ האיבר שבשורה ה- k בעמודה ה- n של $x \cdot I_n - C_P$ הוא a_{k-1} ואילו האיבר שבשורה ה- n

²³ $x \cdot I_n - [f]_B$ היא מטריצה ב- $M_n(\mathbb{F}[x])$, כלומר היא מטריצה מעל חוג הפולינומים שמעל $\mathbb{F}$.

²⁴ כזכור T_A היא ההעתקה הליניארית המוגדרת ע"י הכפלת המטריצה בוקטור.

²⁵ הדטרמיננטה של מטריצה אלכסונית לפי בלוקים היא מכפלת הדטרמיננטות ששל בלוקים על האלכסון.

בעמודה ה- n הוא $x + a_{n-1}$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow \det(x \cdot I_n - C_P) &= (x + a_{n-1}) \cdot \det((C_P)_{n,n}) + \sum_{k=1}^{n-1} a_{k-1} \cdot \det((C_P)_{k,n}) \\ &= (x + a_{n-1}) \cdot x^{n-1} + \sum_{k=1}^{n-1} a_{k-1} \cdot x^{k-1} \\ &= x^n + a_{n-1} \cdot x^{n-1} + \sum_{k=0}^{n-2} a_k \cdot x^k \\ &= x^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k \cdot x^k = P(x) \end{aligned}$$

■

משפט 5.7. יהי $W \subseteq V$, $\{0_V\} \neq W$ תמימי שמור תחת f ונגדיר $g := f|_W$, מתקיים $\chi_g \mid \chi_f$.

הוכחה. ניקח בסיס של W ונרחיב אותו לבסיס $\mathcal{B}$ של V , נזכור שהדטרמיננטה של מטריצה משולשית (עליונה/תחתונה) לפי בלוקים היא מכפלת הדטרמיננטות של הבלוקים שעל האלכסון ומכאן שהדטרמיננטה של הבלוק המתאים ל- W (במטריצה $(x \cdot I_n - [f]_{\mathcal{B}})$) היא χ_g ולכן $\chi_g \cdot Q = \chi_f$ כאשר Q הוא "הדטרמיננטה" של הבלוק האחר (כלומר הפולינום האופייני של הבלוק האחר). ■

טענה 5.8. יהי $v \in V$, $0_V \neq v$ ונסמן $W := Z_f(v)$ ו- $g := f|_W$, מתקיים $\chi_g = \min_v^f$.

הוכחה. המטריצה המייצגת של g בבסיס $\mathcal{C}_f(v)$ היא המטריצה המלווה של $\min_v^f$, מצד שני ע"פ משפט 5.6 זוהי גם המטריצה המלווה של χ_g ולכן הם שווים. ■

מסקנה 5.9. משפט קיילי-המילטון²⁶

מתקיים $\chi_f(f) = 0$ ו- $\chi_A(A) = 0$ (לכל $A \in M_n(\mathbb{F})$).

הוכחה. יהי $v \in V$, נניח בהג"כ ש- $v \neq 0_V$ (אחרת ודאי ש- $\chi_f(f)v = 0_V$) ונסמן ב- g את הצמצום של f ל- $Z_f(v)$. ע"פ הטענה האחרונה (5.8) χ_g מאפס את v תחת f וע"פ המשפט האחרון (5.7) נובע מזה שגם χ_f מאפס את v תחת f . v הנ"ל היה שרירותי ולכן הנ"ל נכון לכל $v \in V$ וממילא $\chi_f(f) = 0$.²⁷ ■

טענה 5.10. יהי $J := J_h(\lambda) \in M_h(\mathbb{F})$ בלוק ז'ורדן אלמנטרי מסדר h בעל ערך עצמי $\lambda \in \mathbb{F}$, מתקיים $\chi_J(x) = (x - \lambda)^h$.

נניח של- f יש צורת ז'ורדן.

מסקנה 5.11. אם J היא צורת ז'ורדן של f כאשר:

$$J = \left[\begin{array}{c|c|c|c} J(\lambda_1) & 0 & \cdots & 0 \\ \hline 0 & J(\lambda_2) & \cdots & 0 \\ \hline 0 & 0 & \ddots & 0 \\ \hline 0 & 0 & \cdots & J(\lambda_r) \end{array} \right]$$

ו- $J(\lambda_i) \in M_{h_i}(\mathbb{F})$ לכל $i \in \mathbb{N}$, $r \geq 1$ אז:

$$\chi_f(x) = \prod_{i=1}^r (x - \lambda_i)^{h_i}$$

כלומר אם לאופרטור יש צורת ז'ורדן אז הפולינום האופייני שלו מתפרק לגורמים ליניאריים. ♣

²⁶ערכים בוויקיפדיה: ארתור קיילי וויליאם רואן המילטון.

²⁷כל מטריצה ריבועית היא אופרטור ולכן אין צורך בהוכחה נפרדת.

הוכחה. הטענה נובעת ישירות מהעובדה שהדטרמיננטה של מטריצה אלכסונית לפי בלוקים היא מכפלת הדטרמיננטות של הבלוקים על האלכסון. ■

מסקנה 5.12. לכל $\lambda \in \sigma(f)$ הגודל של $J(\lambda)$ (ששווה לריבוי האלגברי של λ) הוא $\dim V^\lambda$.

♣ נשים לב שלכל ערך עצמי $\lambda \in \mathbb{F}$ של f החזקה של $x - \lambda$ בפירוק של μ_f לגורמים היא אורך השרשרת הארוכה ביותר בבסיס השרשראות של V^λ (ששווה לגודל בלוק ז'ורדן האלמנטרי הגדול ביותר בעל ערך עצמי λ).

מסקנה 5.13. מתקיים $\mu_f \mid \chi_f$ וקבוצות השורשים שלהם שוות.

♣ מכאן שגם הפולינום המינימלי של f מתפרק לגורמים ליניאריים, והדבר נכון לכל אופרטור שיש לו צורת ז'ורדן.

טענה 5.14. קבוצת האיברים האחרונים בכל שרשרת בבסיס שרשראות של V^λ היא בסיס של V_λ וזאת לכל ערך עצמי $\lambda \in \mathbb{F}$ של f .

מסקנה 5.15. לכל ערך עצמי $\lambda \in \mathbb{F}$ של f הריבוי הגאומטרי שווה למספר השרשראות בבסיס שרשראות של V^λ .

מסקנה 5.16. לכל ערך עצמי $\lambda \in \mathbb{F}$ של f הריבוי הגאומטרי שלו קטן או שווה מזה האלגברי ומתקיים שוויון אם $V_\lambda = V^\lambda$.

♣ מכאן נובע ש- f לכסין אס"ם יש ל- f צורת ז'ורדן (כלומר ניתן להציג את V כסכום ישר של מרחבים עצמיים מוכללים) ובנוסף לכל $\lambda \in \sigma(f)$ הריבוי האלגברי של λ שווה לזה הגאומטרי.

♣ נניח של- f יש צורת ז'ורדן, כפי שראינו ניתן לקבוע אם f לכסין ומהם הערכים העצמיים שלו ע"י μ_f ו- χ_f ; נניח ש- f לכסין ונרצה למצוא את הצורה האלכסונית שלו ו/או בסיס מלכסן, כדי לבצע זאת נפעל ע"פ השלבים הבאים:

1. יש לנו כבר את χ_f שכן על פיו קבענו ש- f לכסין (אם קבענו בדרך אחרת אז יש לחשב אותו), א"כ אנחנו יודעים מהם הערכים העצמיים של f אך יותר מזה - מספר ההופעות של כל אחד מהם בצורה האלכסונית הוא הריבוי האלגברי שלו ב- χ_f - לכן כבר עכשיו אנחנו יודעים בדיוק איך נראית הצורה האלכסונית של f (עוד לפני שמצאנו בסיס מלכסן), נסמן אותה ב- D .

2. לכל $\lambda \in \sigma(f)$ נמצא בסיס ל- $V_\lambda = \ker(f - \lambda)$ ע"י מציאת בסיס למרחב הפתרונות של הממ"ל:

$$0 = ([f]_B - \lambda \cdot I_n) \cdot x$$

(כאשר B הוא בסיס כלשהו של V) וחילוץ הווקטורים המתאימים ב- V (כל וקטור בבסיס של מרחב הפתרונות הוא וקטור קואורדינטות של וקטור ב- V ע"פ הבסיס B).

3. נשרשר את הבסיסים זה לזה ונקבל בסיס מלכסן.

5.2 ניתוח אופרטור ע"פ צורת ז'ורדן, הפולינום המינימלי והפולינום האופייני

תהא J צורת ז'ורדן של אופרטור f ויהי $\lambda \in \sigma(f)$ ונניח שהמטריצה הבאה היא הבלוק המתאים ל- λ ב- J :

$$J(\lambda) = \begin{bmatrix} J_{h_1}(\lambda) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_{h_2}(\lambda) & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & J_{h_s}(\lambda) \end{bmatrix}$$

מאחורי צורת ז'ורדן מסתתר בסיס שרשראות המורכב מבסיסי שרשראות של המרחבים העצמיים המוכללים, כל בלוק ז'ורדן אלמנטרי מייצג שרשרת אחת ולכן:

- מספר השרשראות של λ שווה למספר הבלוקים האלמנטריים בעלי ע"ע λ המופיעים בצורת ז'ורדן, במקרה שלנו זה אומר שמספר השרשראות הוא s .

- מכיוון שכל שרשרת מכילה בסופה וקטור עצמי ואלו פורשים את V_λ נדע ש- $\dim V_\lambda = s$ (וזהו גם הריבוי הגאומטרי של λ).

- מכיוון שכל שרשרת היא בגודל של הבלוק המתאים לה ואיחוד השרשראות של λ הוא בסיס של V^λ נדע שמתקיים $\dim V^\lambda = h_1 + h_2 + \dots + h_s$, כלומר הממד של המרחב העצמי המוכלל שווה לסכום אורכי הבלוקים האלמנטריים (ששווה לגודל של $J(\lambda)$).

- מהגדרה, החזקה של $x - \lambda$ בפירוק של μ_f לגורמים היא אורך השרשרת הארוכה ביותר בבסיס השרשראות של V^λ ולכן זהו גם הגודל הגדול ביותר של בלוק אלמנטרי בעל ערך עצמי λ .

- ראינו לעיל שהחזקה של $x - \lambda$ בפירוק של χ_f לגורמים (הריבוי האלגברי של λ) היא $\dim V^\lambda$ ולכן היא שווה לסכום אורכי הבלוקים האלמנטריים (ששווה לגודל של $J(\lambda)$).

ובכיוון ההפוך:

- אם נתון לנו μ_f אנחנו יכולים לדעת מהו הבלוק האלמנטרי הגדול ביותר עבור כל ערך עצמי (כמובן שאנחנו יודעים גם מהו הספקטרום).
- אם נתון לנו χ_f אנחנו יכולים לדעת מהו סכום הגדלים של הבלוקים האלמנטריים של כל ערך עצמי (כמובן שאנחנו יודעים גם מהו הספקטרום).
- הממד של $V_\lambda = \ker(f - \lambda)$ הוא מספר הבלוקים האלמנטריים של λ .
- מספר הבלוקים האלמנטריים של λ שגודלם הוא גדול או שווה ל- k הוא $\dim(\ker(f - \lambda)^k) - \dim(\ker(f - \lambda)^{k-1})$ לכל $k \in \mathbb{N}$ ולכן מספר הבלוקים שגודלם הוא בדיוק k הוא:

$$2 \cdot \dim(\ker(f - \lambda)^k) - \dim(\ker(f - \lambda)^{k-1}) - \dim(\ker(f - \lambda)^{k+1})$$

זו הסיבה לכך ששתי מטריצות ז'ורדן דומות זו לזו אם"ם הן זהות עד כדי שינוי סדר הבלוקים.

ארבעת האחרונים יכולים לעזור לנו לקבוע האם מטריצות נתונות דומות זו לזו גם מבלי למצוא את צורת ז'ורדן שלהן, או להפך: ארבעת אלה יכולים לעזור לנו למצוא את צורת ז'ורדן של מטריצה נתונה גם מבלי להפעיל את כל האלגוריתם (שלושת הראשונים מביניהם מגבילים את הקומבינציות האפשריות והאחרון משמש לקביעה מוחלטת במקרה שעוד נותר ספק).

לסיכום:

מרחבים	ריבויים	שרשראות בבסיס של V^λ	צורת ז'ורדן	פולינומים
$\dim V_\lambda$	הריבוי הגאומטרי	מספר השרשראות	מספר הבלוקים	-
$\dim V^\lambda$	הריבוי האלגברי	סכום אורכי השרשראות	הגודל של $J(\lambda)$ וסכום אורכי הבלוקים	החזקה ב- χ_f
-	-	אורך השרשרת הארוכה ביותר	גודל הבלוק האלמנטרי הגדול ביותר	החזקה ב- μ_f

²⁸מכל שרשרת שאורכה גדול או שווה ל- k ישנם k וקטורים בבסיס של $\ker(f - \lambda)^k$ ומכל שרשרת שאורכה קצר יותר כל השרשרת מופיעה בבסיס של $\ker(f - \lambda)^k$, באופן דומה כל שרשרת שאורכה קצר יותר מופיעה בשלמותה בבסיס של $\ker(f - \lambda)^{k-1}$ ולכן היא מחוסרת מן החשבון ומכל שרשרת שאורכה גדול או שווה ל- k או מחסרים $k - 1$ וקטורים, אי"כ נשארו עם וקטור אחד מכל שרשרת שאורכה גדול או שווה ל- k .