

פונקציות

1 התחלה

1.1 הגדרות

♣ במתמטיקה המודרנית פונקציה היא מושג מתורת הקבוצות וככזו ישנם מושגים ומשפטים רבים בנושא שאינם קשורים דווקא למספרים הממשיים (ראו בקובץ "הנאיבית הקבוצות תורת"), בקבצים אלו נעסוק אך ורק בהגדרות ובמשפטים הקשורות למספרים הממשיים.

♣ בכל הסיכומים של קורסי אינפי' נדבר אך ורק על פונקציות שהתחום והטווח שלה הם תתי-קבוצות של $\mathbb{R}$ (אלא אם נאמר אחרת במפורש), כמעט תמיד יהיה מדובר בפונקציה שהתחום שלה הוא מקטע¹ (או איחוד של מקטעים) ועל הקורא תוטל המשימה להבין מן ההקשר מתי מדובר גם בפונקציות שהתחום שלהן אינו בהכרח מקטע.

♣ ישנה הסכמה מקובלת למחצה שאם נתון רק כלל ההתאמה של פונקציה (ללא התחום ו/או הטווח) אז הטווח הוא $\mathbb{R}$ והתחום הוא קבוצת כל הנקודות ב- $\mathbb{R}$ שעבורן כלל ההתאמה מוגדר, מוסכמה זו נקראת "מוסכמת התחום המרבי" ונתקלנו בה כבר בתיכון; למרות הנוחות שבמוסכמה זו אני אשתדל שלא להסתמך עליה ולציין בכל מקום במפורש את התחום והטווח.

תהא $D \subseteq \mathbb{R}$ ותהא $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה.

הגדרה 1.1. תהא $a \in D$.

1. נאמר ש- x_0 היא נקודה פנימית של D אם קיים קטע פתוח המכיל את x_0 ומוכל כולו ב- D .

2. נאמר ש- x_0 היא נקודה מבודדת של D אם קיים קטע פתוח המכיל את x_0 וחיתוכו עם D הוא $\{x_0\}$.

3. נאמר ש- x_0 היא בקצה (או בשפה) של D אם כל קטע פתוח במכיל את x_0 מכיל נקודה נוספת מ- D (כלומר בכל מקרה שאינו כלול בשני הראשונים).

הגדרה 1.2. נקודות קיצון כלליות

• תהא $a \in D$ נקודה.

– נאמר ש- a היא נקודת מקסימום של f אם לכל $x \in D$ מתקיים $f(x) \leq f(a)$.

– נאמר ש- a היא נקודת מינימום של f אם לכל $x \in D$ מתקיים $f(x) \geq f(a)$.

• תהא $A \subseteq D$ תת-קבוצה ותהא $a' \in A$.

– נאמר ש- a' היא נקודת מקסימום של f ב- A אם לכל $x \in A$ מתקיים $f(x) \leq f(a')$.

– נאמר ש- a' היא נקודת מינימום של f ב- A אם לכל $x \in A$ מתקיים $f(x) \geq f(a')$.

הגדרה 1.3. נקודות קיצון מקומיות

תהא $a \in D$ נקודה פנימית.

• נאמר ש- a היא נקודת מקסימום מקומית של f אם קיימת $0 < \delta \in \mathbb{R}$ כך שלכל $x \in B_\delta(a)$ מתקיים $f(x) \leq f(a)$.

• נאמר ש- a היא נקודת מקסימום מקומית של f אם קיימת $0 < \delta \in \mathbb{R}$ כך שלכל $x \in B_\delta(a)$ מתקיים $f(x) \geq f(a)$.

¹תזכורת: מקטע הוא תת-קבוצה $I \subseteq \mathbb{R}$ כך שלכל $a, b \in I$ מתקיים $(a, b) \subseteq I$.

הגדרה 1.4. סימטריות אפשריות בקבוצות

1. נאמר ש- D היא סימטרית אם לכל $x \in D$ מתקיים $-x \in D$.
2. נאמר ש- D היא אינווריאנטית ביחס להזזה במספר $T \in \mathbb{R}$ אם לכל $x \in D$ מתקיים $x + T \in D$.

הגדרה 1.5. סימטריות אפשריות בפונקציות

1. נאמר ש- f היא פונקציה זוגית אם לכל $x \in D$ מתקיים $f(x) = f(-x)$.
2. נאמר ש- f היא פונקציה אי-זוגית אם לכל $x \in D$ מתקיים $-f(x) = f(-x)$.
3. נאמר ש- f היא פונקציה מחזורית בעלת אורך מחזור $T \in \mathbb{R}$ $0 < T$ אם לכל $x \in D$ מתקיים $f(x) = f(x + T)$, אם קיים T מינימלי כזה נקרא לו המחזור היסודי של f .

♣ f יכולה להיות זוגית או אי-זוגית רק אם D סימטרית ויכולה להיות מחזורית רק אם D אינווריאנטית ביחס להזזה באורך המחזור.

♣ במתמטיקה המודרנית פונקציה היא מושג מתורת הקבוצות וככזו ישנם מושגים ומשפטים רבים בנושא שאינם קשורים דווקא למספרים הממשיים (ראו בקובץ "הנאיבית הקבוצות תורת"), בקבוצים אלו נעסוק אך ורק בהגדרות ובמשפטים הקשורות למספרים הממשיים.

♣ בכל הסיכומים של קורסי אינפי' נדבר אך ורק על פונקציות שהתחום והטווח שלה הם תתי-קבוצות של $\mathbb{R}$ (אלא אם נאמר אחרת במפורש), כמעט תמיד יהיה מדובר בפונקציה שהתחום שלה הוא מקטע³ (או איחוד של מקטעים) ועל הקורא טוטל המשימה להבין מן ההקשר מתי מדובר גם בפונקציות שהתחום שלהן אינו בהכרח מקטע.

♣ ישנה הסכמה מקובלת למחצה שאם נתון רק כלל ההתאמה של פונקציה (ללא התחום ו/או הטווח) אז הטווח הוא $\mathbb{R}$ והתחום הוא קבוצת כל הנקודות ב- $\mathbb{R}$ שעבורן כלל ההתאמה מוגדר, מוסכמה זו נקראת "מוסכמת התחום המרבי" ונתקלנו בה כבר בתיכון; למרות הנוחות שבמוסכמה זו אני אשתדל שלא להסתמך עליה ולציין בכל מקום במפורש את התחום והטווח.

1.2 פונקציות זוגיות ואי-זוגיות

תהינה $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ שתי פונקציות.

טענה 1.6.

- אם f ו- g זוגיות אז גם $f + g$ זוגית.
- אם f ו- g אי-זוגיות אז גם $f + g$ אי-זוגית.

טענה 1.7.

- אם f ו- g זוגיות אז $f \cdot g$ זוגית.
- אם f ו- g אי-זוגיות אז $f \cdot g$ זוגית.
- אם f זוגית ו- g אי-זוגית אז $f \cdot g$ אי-זוגית.

♣ בפרט הכפלה בקבוע אינה משנה את הזוגיות/אי-זוגיות של פונקציה.

³ T^2 כזה אף פעם אינו יחיד.
³ תזכורת: מקטע הוא תת-קבוצה $I \subseteq \mathbb{R}$ כך שלכל $a, b \in I$ מתקיים $(a, b) \subseteq I$.

למה 1.8. נניח ש- $g(x) \neq 0$ לכל $x \in D$.

- אם g זוגית אז גם $\frac{1}{g}$ זוגית.
- אם g אי-זוגית אז גם $\frac{1}{g}$ אי-זוגית.

מסקנה 1.9.

- אם f ו- g זוגיות אז $\frac{f}{g}$ זוגית.
- אם f ו- g אי-זוגיות אז $\frac{f}{g}$ זוגית.
- אם f זוגית ו- g אי-זוגית אז $\frac{f}{g}$ אי-זוגית.

טענה 1.10. תהייה $h_1 : A \rightarrow B$ ו- $h_2 : B \rightarrow C$ פונקציות.

- נניח h_1 זוגית, אם h_2 זוגית או ש- h_2 אי-זוגית אז $h_2 \circ h_1$ זוגית.
- נניח ש- h_2 זוגית, אם h_1 זוגית או ש- h_1 אי-זוגית אז $h_2 \circ h_1$ זוגית.
- אם h_1 ו- h_2 אי-זוגיות אז גם $h_2 \circ h_1$ אי-זוגית.

טענה 1.11. תהייה $h_1, h_2 : D \rightarrow \mathbb{R}$ שתי פונקציות המוגדרות ע"י (לכל $x \in D$):

$$h_1(x) = f(x) - f(-x)$$

$$h_2(x) = f(x) + f(-x)$$

h_1 אי-זוגית ו- h_2 זוגית.

טענה 1.12. קיים זוג פונקציות יחיד $f_{\text{Odd}}, f_{\text{Even}} : D \rightarrow \mathbb{R}$ כך ש- f_{Odd} אי-זוגית ו- f_{Even} זוגית ובנוסף מתקיים $f = f_{\text{Odd}} + f_{\text{Even}}$. פונקציות אלו הן הפונקציות המוגדרות ע"י (לכל $x \in D$):

$$f_{\text{Odd}}(x) := \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

$$f_{\text{Even}}(x) := \frac{f(x) + f(-x)}{2}$$

הוכחה. נניח שקיים זוג פונקציות כנ"ל ותהייה $f_{\text{Odd}}, f_{\text{Even}} : D \rightarrow \mathbb{R}$ כך ש- f_{Odd} אי-זוגית ו- f_{Even} זוגית ובנוסף מתקיים $f = f_{\text{Odd}} + f_{\text{Even}}$.

יהי $x \in D$, מהגדרת f_{Odd} ו- f_{Even} נובע שמתקיים:

$$f(x) = f_{\text{Odd}}(x) + f_{\text{Even}}(x)$$

$$f(-x) = f_{\text{Odd}}(-x) + f_{\text{Even}}(-x) = -f_{\text{Odd}}(x) + f_{\text{Even}}(x)$$

$$\Rightarrow f(x) + f(-x) = 2 \cdot f_{\text{Even}}(x)$$

$$\Rightarrow f_{\text{Even}}(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}$$

$$\Rightarrow f_{\text{Odd}}(x) = f(x) - \frac{f(x) + f(-x)}{2} = \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

x הנ"ל היה שרירותי ולכן הנ"ל נכון לכל $x \in D$ ומכאן שאם קיים זוג פונקציות כזה אז הוא מקיים בהכרח את כללי ההתאמה שלעיל ולכן הוא יחיד.

נגדיר את f_{Odd} ו- f_{Even} ע"פ כללי ההתאמה שלעיל⁴, האי-זוגיות של f_{Odd} והזוגיות של f_{Even} נובעות ישירות מהטענה הקודמת (1.11), וכמובן שלכל $x \in D$ מתקיים:

$$f_{\text{Odd}}(x) + f_{\text{Even}}(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2} + \frac{f(x) + f(-x)}{2} = \frac{f(x) + f(x)}{2} = f(x)$$

■


⁴כלומר כעת אנו מוותרים על ההנחה ש- f_{Odd} אי-זוגית ו- f_{Even} זוגית ובנוסף מתקיים $f = f_{\text{Odd}} + f_{\text{Even}}$.

1.3 טענות וזהויות טריגונומטריות

♣ לא נגדיר כאן את הפונקציות הטריגונומטריות ונסתמך על **הגדרתן ע"** כפי שלמדנו בתיכון כאשר את הזוויות נמדוד ברדיאנים.

טענה 1.13. לכל $\theta \in \mathbb{R}$ מתקיים $|\sin \theta| \leq 1$ וגם $|\cos \theta| \leq 1$.

טענה 1.14. לכל $\theta \in \mathbb{R}$ מתקיים $|\sin \theta| \leq |\theta|$.



הוכחה. תהא $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, כמובן שמתקיים $|\sin 0| = 0 \leq |0|$ ולכן נוכל להניח ש- $\theta \neq 0$. בגלל שאנחנו עובדים ברדיאנים אורך הקשת של הזווית θ היא בדיוק $|\theta|$ ואורך זה גדול מאורך המיתר הנשען עליה, המיתר הזה הוא היתר במשולש ישר זווית שאורכי צלעותיו הם $|\sin \theta|$ ו- $|\cos \theta|$ וממילא $|\sin \theta| \leq |\theta|$. עבור זוויות שערכן המוחלט גדול מ- $\frac{\pi}{2}$ הטענה טריוויאלית משום שלכל $\theta \in \mathbb{R}$ מתקיים $|\sin \theta| \leq 1 < \frac{\pi}{2}$. ■

טענה 1.15. לכל $\alpha, \beta, \theta \in \mathbb{R}$ מתקיימות הזהויות הבאות:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos \theta$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin \theta$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta \pm \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta \mp \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

צריך להוסיף הוכחות בקובץ נפרד עם ציורים.

טענה 1.16. $\sin$ היא פונקציה אי-זוגית ו- $\cos$ היא פונקציה זוגית.

2 גבול של פונקציה בנקודה

2.1 הגדרות

הגדרה 2.1. גבול של פונקציה בנקודה

תהא f פונקציה המוגדרת בסביבה מנוקבת של $a \in \mathbb{R}$, נאמר ש- $L \in \mathbb{R}$ הוא גבול של פונקציה f בנקודה a אם לכל $\varepsilon \in \mathbb{R}$ $0 < \varepsilon$ קיימת $\delta \in \mathbb{R}$ $0 < \delta$ כך שלכל $x \in B_\delta^\circ(a)$ מתקיים $f(x) \in B_\varepsilon(L)$.
או בסימונים אחרים:

$$\forall x \in \mathbb{R} : 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

גבול של פונקציה בנקודה הוא יחיד (אם הוא קיים), לכן מוצדק לדבר על הגבול של f בנקודה a ולסמנו ב- $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$.

דוגמה לפונקציה שאין לה גבול באף נקודה היא פונקציית דיריכלה $D : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י (לכל $x \in \mathbb{R}$):



$$D(x) := \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

הסכמה: נסכים שבכל מקום שבו נכתב ביטוי מהצורה $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ או $L = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ הכוונה היא שהגבול קיים ומתקיים השוויון אלא אם נאמר אחרת בפירוש; הסכמה זו תהיה תקפה בכל הסיכומים של כל הקורסים (ולגבי כל הגבולות המופיעים בהם) מכאן ואילך, בכל מקום שבו נטען שגבול מקיים טענה או טוענים שהגבול קיים ומקיים את הטענה.

הגדרה 2.2. גבולות חד-צדדיים

תהא f פונקציה המוגדרת בסביבה ימנית של $a \in \mathbb{R}$, נאמר ש- $L \in \mathbb{R}$ הוא גבול מימין של f בנקודה a אם לכל $\varepsilon \in \mathbb{R}$ $0 < \varepsilon$ קיימת $\delta \in \mathbb{R}$ $0 < \delta$ כך שמתקיים:

$$x \in (a, a + \delta) \Rightarrow f(x) \in B_\varepsilon(l)$$

כמו כן אם f מוגדרת בסביבה שמאלית של $a' \in \mathbb{R}$ נאמר שמספר ממשי $L \in \mathbb{R}$ הוא גבול משמאל של f בנקודה a' אם לכל $\varepsilon \in \mathbb{R}$ $0 < \varepsilon$ קיימת $\delta \in \mathbb{R}$ $0 < \delta$ כך שמתקיים:

$$x \in (a' - \delta, a') \Rightarrow f(x) \in B_\varepsilon(l)$$

גם גבולות חד-צדדיים הם יחידים (אם הם קיימים), לכן מוצדק לדבר על הגבול מימין של f ב- a (אם הוא קיים) ולסמנו ב- $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ וכמו כן מוצדק לדבר על הגבול משמאל של f ב- a' ולסמנו ב- $\lim_{x \rightarrow a'^-} f(x)$.

♣ אצל יורם ראינו גם את הסימונים $\lim_{x \downarrow a} f(x)$ עבור גבול מימין ו- $\lim_{x \uparrow a'} f(x)$ עבור גבול משמאל.

♣ מהגדרות אלו נובע כמעט מיד שלפונקציה יש גבול בנקודה אם"ם הגבולות החד-צדדיים שלה בנקודה זו קיימים ושווים.

משפט 2.3. יחידות הגבול

לפונקציה f יש לכל היותר גבול אחד בנקודה $a \in \mathbb{R}$.

משפט 2.4. תהא f פונקציה המוגדרת בסביבה מנוקבת של נקודה a , הגבול $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ קיים אם"ם הגבול $\lim_{x \rightarrow 0} f(a+x)$ קיים ובמקרה זה מתקיים גם:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f(a+x)$$

2.2 אפיון היינה ותנאי קושי**משפט 2.5. אפיון היינה⁵ לגבול של פונקציה בנקודה**

תהא f פונקציה המוגדרת בסביבה מנוקבת U של נקודה $a \in \mathbb{R}$ ויהי $L \in \mathbb{R}$. מתקיים $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ אם"ם לכל סדרה $(x_n)_{n=1}^\infty$ המתכנסת ל- a שכל איבריה ב- U מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L$. הוכחה. ■

• $\Leftarrow$

תהא $(x_n)_{n=1}^\infty$ סדרה המתכנסת ל- a שכל איבריה ב- U ונניח ש- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$. יהי $\varepsilon \in \mathbb{R}$ $0 < \varepsilon$, מההנחה נובע שקיימת $\delta \in \mathbb{R}$ $0 < \delta$ כך שלכל $x \in B_\delta^\circ(a)$ מתקיים $|f(x) - L| < \varepsilon$, תהא δ כנ"ל. מהגדרת $(x_n)_{n=1}^\infty$ נובע שקיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $N < n \in \mathbb{N}$ מתקיים $x_n \in B_\delta(a)$, יהי N כנ"ל. כל איברי $(x_n)_{n=1}^\infty$ נמצאים ב- U , בפרט לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $x_n \neq a$, מכאן שלכל $N < n \in \mathbb{N}$ מתקיים $x_n \in B_\delta^\circ(a)$, ומהגדרת δ נובע שלכל $N < n \in \mathbb{N}$ מתקיים $|f(x_n) - L| < \varepsilon$. ε הנ"ל היה שרירותי ולכן לכל ε קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $N < n \in \mathbb{N}$ מתקיים $|f(x_n) - L| < \varepsilon$, כלומר $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L$.

• $\Rightarrow$

נניח שלכל סדרה $(x_n)_{n=1}^\infty$ המתכנסת ל- a שכל איבריה ב- U מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L$. נניח בשלילה ש- L אינו גבול של f ב- a , כלומר קיים $\varepsilon \in \mathbb{R}$ $0 < \varepsilon$ כך שלכל $\delta \in \mathbb{R}$ $0 < \delta$ קיים $x \in B_\delta^\circ(a)$ המקיים $|f(x) - L| \geq \varepsilon$, יהי ε כנ"ל. מכאן שלכל $n \in \mathbb{N}$ קיים $x_n \in \mathbb{R}$ המקיים $0 < |x_n - a| < \frac{1}{n}$ וגם $|f(x_n) - L| \geq \varepsilon$, תהא $(x_n)_{n=1}^\infty$ סדרה כנ"ל. ממשפט הכריך נובע ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ ומכאן שעבור n גדול דיו מתקיים $x_n \in U$ שהרי $x_n \neq a$ לכל $n \in \mathbb{N}$. א"כ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שהסדרה $(x_n)_{n=N+1}^\infty$ אינה מקיימת את ההנחה, מכאן שהנחת השלילה אינה נכונה ו- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

⁵ערך בוויקיפדיה: היינה אדוארד.

מסקנה 2.6. תהא f פונקציה המוגדרת בסביבה מנוקבת U של נקודה $a \in \mathbb{R}$. לפונקציה f יש גבול בנקודה $a \in \mathbb{R}$ אם"ם לכל סדרה $(x_n)_{n=1}^\infty$ המתכנסת ל- a שכל איבריה ב- U הסדרה $(f(x_n))_{n=1}^\infty$ היא סדרה מתכנסת.

הוכחה. הגרירה מימין לשמאל נובעת ישירות מאפיון היינה לגבול של פונקציה בנקודה, נוכיח את הגרירה בכיוון ההפוך. נניח שלכל סדרה $(x_n)_{n=1}^\infty$ המתכנסת ל- a שכל איבריה ב- U הסדרה $(f(x_n))_{n=1}^\infty$ היא סדרה מתכנסת. תהיינה $(a_n)_{n=1}^\infty$ ו- $(b_n)_{n=1}^\infty$ שתי סדרות המתכנסות ל- a שכל איבריהן ב- U , ע"פ ההנחה הגבולות הבאים קיימים:

$$l := \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n), \quad m := \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n)$$

תהא $(c_n)_{n=1}^\infty$ סדרה המוגדרת ע"י (לכל $n \in \mathbb{N}$):

$$c_n := \begin{cases} a_n & n \in \text{Odd} \\ b_n & n \in \text{Even} \end{cases}$$

א"כ מתקיים $x_n \in U$ לכל $n \in \mathbb{N}$ וגם $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ ומכאן שע"פ ההנחה $(f(x_n))_{n=1}^\infty$ מתכנסת. הסדרות $(f(a_n))_{n=1}^\infty$ ו- $(f(b_n))_{n=1}^\infty$ הן תתי סדרות של $(f(c_n))_{n=1}^\infty$ ו- $(f(c_{2k}))_{k=1}^\infty = (f(a_{2k}))_{k=1}^\infty$ ו- $(f(c_{2k-1}))_{k=1}^\infty = (f(b_{2k-1}))_{k=1}^\infty$ בהתאמה ומכאן שע"פ משפט הירושה הן מתכנסות ל- l ול- m בהתאמה. מצד שני הן גם תתי-סדרות של $(f(c_n))_{n=1}^\infty$, כלומר l ו- m הם גבולות חלקיים שלה ומכיוון שהיא מתכנסת מתקיים בהכרח $l = m$. א"כ ראינו שלכל סדרה $(x_n)_{n=1}^\infty$ המתכנסת ל- a שכל איבריה ב- U מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = l$ ומכאן שע"פ אפיון היינה לגבול של פונקציה בנקודה מתקיים $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ ובפרט יש ל- f גבול ב- a . ■

משפט 2.7. אפיון היינה לגבול חד-צדדי של פונקציה בנקודה

תהא f פונקציה המוגדרת בסביבה ימנית/שמאלית U של נקודה $a \in \mathbb{R}$ ויהי $L \in \mathbb{R}$. מתקיים $\lim_{x \rightarrow a^\pm} f(x) = L$ אם"ם לכל סדרה $(x_n)_{n=1}^\infty$ המתכנסת ל- a שכל איבריה ב- U מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L$.

מסקנה 2.8. תהא f פונקציה המוגדרת בסביבה ימנית/שמאלית U של נקודה $a \in \mathbb{R}$. לפונקציה f יש גבול מימין/משמאל בנקודה $a \in A$ אם"ם לכל סדרה $(x_n)_{n=1}^\infty$ המתכנסת ל- a שכל איבריה ב- U הסדרה $(f(x_n))_{n=1}^\infty$ היא סדרה מתכנסת.

משפט 2.9. תנאי קושי לגבול של פונקציה בנקודה

תהא f פונקציה המוגדרת בסביבה מנוקבת של נקודה $a \in \mathbb{R}$. תנאי הכרחי ומספיק לקיום הגבול $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ הוא שלכל $0 < \varepsilon \in \mathbb{R}$ קיימת $0 < \delta \in \mathbb{R}$ כך שלכל $x_1, x_2 \in B_\delta^\circ(a)$ מתקיים $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

הוכחה.

• $\Leftarrow$

נניח שהגבול $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ קיים ונסמן $L := \lim_{x \rightarrow a} f(x)$.

יהי $0 < \varepsilon \in \mathbb{R}$.

מהגדרת הגבול נובע שקיימת $0 < \delta \in \mathbb{R}$ כך שלכל $x \in B_\delta^\circ(a)$ מתקיים $|f(x) - L| < \frac{\varepsilon}{2}$, תהא δ כנ"ל.

יהיו $x_1, x_2 \in B_\delta^\circ(a)$, מהשורה הקודמת נובע כי $|f(x_1) - L| < \frac{\varepsilon}{2}$ וגם $|f(x_2) - L| < \frac{\varepsilon}{2}$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow \varepsilon &= \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} > |f(x_1) - L| + |f(x_2) - L| = |f(x_1) - L| + |L - f(x_2)| \\ &\geq |f(x_1) - L + L - f(x_2)| = |f(x_1) - f(x_2)| \end{aligned}$$

ε הנ"ל ו- x_1, x_2 היו שרירותיים ולכן לכל $0 < \varepsilon \in \mathbb{R}$ קיימת $0 < \delta \in \mathbb{R}$ כך שלכל $x_1, x_2 \in B_\delta^\circ(a)$ מתקיים $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

• $\Rightarrow$

תהא U סביבה מנוקבת של a כך ש- f מוגדרת ב- U ונניח ש- f מקיימת את תנאי קושי עבור a .⁶
 יהי $0 < \varepsilon \in \mathbb{R}$ ותהא $0 < \delta \in \mathbb{R}$ שלכל $x_1, x_2 \in B_\delta^\circ(a)$ מתקיים $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.
 תהא $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרת מספרים שונים מ- a המתכנסת ל- a שכל איבריה ב- U ונתבונן בסדרה $(f(a_n))_{n=1}^\infty$, מהעובדה $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ נובע שקיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $N < n \in \mathbb{N}$ מתקיים $a_n \in B_\delta^\circ(a)$, יהי N כני"ל.
 יהיו $N < n, m \in \mathbb{N}$, מכאן שמתקיים $a_n, a_m \in B_\delta^\circ(a)$ ומהגדרת δ נובע כי $|f(a_n) - f(a_m)| < \varepsilon$.
 ε הנ"ל ו- n, m היו שרירותיים ולכן לכל $0 < \varepsilon \in \mathbb{R}$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $N < n, m \in \mathbb{N}$ מתקיים $|f(a_n) - f(a_m)| < \varepsilon$, מתנאי קושי להתכנסות של סדרות נובע ש- $(f(a_n))_{n=1}^\infty$ היא סדרה מתכנסת.
 $(a_n)_{n=1}^\infty$ הנ"ל היתה שרירותית ולכן לכל סדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$ המתכנסת ל- a נקבל שהסדרה המתאימה $(f(a_n))_{n=1}^\infty$ מתכנסת, מתנאי היינה לגבול של פונקציה בנקודה נובע של- f יש גבול בנקודה, כלומר $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ קיים.⁷

■

משפט 2.10. תנאי קושי לגבול חד-צדדי של פונקציה בנקודה

תהא f פונקציה ותהא $a \in \mathbb{R}$ כך ש- f מוגדרת בסביבה ימנית/שמאלית מנוקבת של a .
 תנאי הכרחי ומספיק לקיום הגבול $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ הוא שלכל $0 < \varepsilon \in \mathbb{R}$ קיימת $0 < \delta \in \mathbb{R}$ כך שלכל $x_1, x_2 \in (a, a + \delta)$ מתקיים $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.
 תנאי הכרחי ומספיק לקיום הגבול $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ הוא שלכל $0 < \varepsilon \in \mathbb{R}$ קיימת $0 < \delta \in \mathbb{R}$ כך שלכל $x_1, x_2 \in (a - \delta, a)$ מתקיים $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

2.3 משפטים נוספים

משפט 2.11. אריתמטיקה של גבולות

תהיינה f ו- g פונקציות ממשיות המוגדרות בסביבה מנוקבת של $a \in \mathbb{R}$ כך שהגבולות הבאים קיימים:

$$l := \lim_{x \rightarrow a} f(x), \quad m := \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

מתקיימים כל הפסוקים הבאים:

$$1. \lim_{x \rightarrow a} (f + g)(x) = l + m$$

$$2. \lim_{x \rightarrow a} (f \cdot g)(x) = l \cdot m$$

$$3. \text{ אם } m \neq 0 \text{ אז } \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{m}$$

$$4. \text{ אם } m \neq 0 \text{ אז } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{l}{m}$$

♣ המשפט נובע ישירות מאפיון היינה לגבול של פונקציה בנקודה ומאריתמטיקה של גבולות לסדרות.

משפט 2.12. משפט ההצבה בגבולות לפונקציות לא רציפות

תהיינה $f : A \rightarrow B$ ו- $g : B \rightarrow C$ שתי פונקציות כך שהגבולות $l := \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ ו- $m := \lim_{y \rightarrow l} g(y)$ קיימים (עבור נקודה $a \in A$ כלשהי), אם נתון בנוסף שקיימת סביבה U של a כך שלכל $x \in U$ מתקיים $f(x) \neq l$ אז מתקיים $\lim_{x \rightarrow a} (g \circ f)(x) = m$.

הוכחה. יהי $0 < \varepsilon \in \mathbb{R}$.

נניח שקיימת סביבה U של a כך שלכל $x \in U$ מתקיים $f(x) \neq l$.

מהנתון $\lim_{y \rightarrow l} g(y) = m$ נובע שקיימת $0 < \eta \in \mathbb{R}$ שלכל $y \in B_\eta^\circ(l)$ מתקיים $|g(y) - m| < \varepsilon$, תהא η כני"ל.

מהנתון $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ נובע שקיימת $0 < \delta \in \mathbb{R}$ שלכל $x \in B_\delta^\circ(a)$ מתקיים $|f(x) - l| < \eta$, תהא δ כני"ל כך ש- $B_\delta^\circ(a) \subseteq U$.

⁶לכל $0 < \varepsilon \in \mathbb{R}$ קיימת $0 < \delta \in \mathbb{R}$ שלכל $x_1, x_2 \in B_\delta^\circ(a)$ מתקיים $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.
⁷למען האמת גם שווה ל- $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ אך לא נתבשנו להוכיח זאת.

מכאן שע"פ ההנחה לכל $x \in B_\delta^\circ(a)$ מתקיים $0 < |f(x) - l| < \eta$ כלומר $f(x) \in B_\eta^\circ(l)$, ולכן מהשורה השנייה של ההוכחה נובע שלכל $x \in B_\delta^\circ(a)$ מתקיים $|g(f(x)) - m| < \varepsilon$.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} (g \circ f)(x) = m$$

■

3 חסימות וסדר

3.1 הגדרות

הגדרה 3.1. תהא f פונקציה,

- נאמר ש- f חסומה מלעיל אם $\text{Im} f$ חסומה מלעיל.

- נאמר ש- f חסומה מלרע אם $\text{Im} f$ חסומה מלרע.

- נאמר ש- f חסומה אם הקבוצה $\text{Im} f$ חסומה.

הגדרה 3.2. תהא $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה ותהא $U \subseteq D$,

- נאמר ש- f חסומה מלעיל ב- U אם $f(U)$ חסומה מלעיל.

- נאמר ש- f חסומה מלרע ב- U אם $f(U)$ חסומה מלרע.

- נאמר ש- f חסומה ב- U אם הקבוצה $f(U)$ חסומה.

הגדרה 3.3. תהא f פונקציה המוגדרת בסביבה מנוקבת של נקודה $a \in \mathbb{R}$, נאמר ש- f חסומה מקומית ב- a אם קיימת סביבה מנוקבת U של a כך ש- f חסומה ב- U .

תהיינה f, g, h פונקציות המוגדרות בסביבה מנוקבת U של $a \in \mathbb{R}$.

טענה 3.4. נניח שהגבולות $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ ו- $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ קיימים.

1. אם לכל $x \in U$ מתקיים $f(x) < g(x)$ אז $l \leq m$.

2. אם $\lim_{x \rightarrow a} f(x) < \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ אז קיימת $0 < \delta \in \mathbb{R}$ כך ש- $f(x) < g(x)$ לכל $x \in B_\delta^\circ(a)$.

משפט 3.5. משפט הכריך

אם $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ לכל $x \in U$ וגם $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l = \lim_{x \rightarrow a} h(x)$ אז $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = l$.

טענה 3.6. אם הגבול $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ קיים אז f חסומה מקומית ב- U .

טענה 3.7. הגבול $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ קיים אם $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - l) = 0$.

משפט 3.8. כלל אפסה וחסומה

אם $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ וגם g חסומה מקומית ב- a אז $\lim_{x \rightarrow a} (f \cdot g)(x) = 0$.

4 רציפות

4.1 הגדרות

הגדרה 4.1. רציפות של פונקציה בנקודה

תהא f פונקציה המוגדרת בסביבה של נקודה $a \in \mathbb{R}$, נאמר ש- f רציפה ב- a אם מתקיים $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.
כלומר: לכל $0 < \varepsilon \in \mathbb{R}$ קיימת $0 < \delta \in \mathbb{R}$ כך שמתקיים:

$$x \in B_\delta(a) \Rightarrow f(x) \in B_\varepsilon(L)$$

או בסימונים אחרים:

$$\forall x \in \mathbb{R} : |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

הגדרה 4.2. תהא f פונקציה, את הנקודות שבהן f אינה רציפה (אם יש כאלה) נחלק לשלושה סוגים:

1. אם הגבול בנקודה קיים אך אינו שווה לערך שמקבלת הפונקציה בנקודה זו (כולל המקרה שבו הפונקציה אינה מוגדרת בנקודה), נאמר שזוהי נקודת אי-רציפות סליקה.

2. אם הגבול בנקודה אינו קיים אך שני הגבולות החד-צדדיים קיימים⁸, נאמר שזוהי נקודת אי-רציפות מסוג ראשון.

3. ואם לפחות אחד משני הגבולות החד-צדדיים אינו קיים⁹, נאמר שזוהי נקודת אי-רציפות מסוג שני.

♣ נשים לב: f אינה רציפה בנקודה a אם לא מתקיים $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ מכל סיבה שהיא, כולל מהסיבה ש- $f(a)$ אינו קיים (כך לדוגמה $\frac{\pi}{2}$ היא נקודת אי-רציפות של $\tan$).

♣ את ההערה הקודמת שמעתי מפיו של רז במו אזורי אולם ניתן גם לומר שנקודה שבה הפונקציה אינה מוגדרת אינה נקודת רציפות וגם אינה נקודת אי-רציפות, היא לא שייכת לעניין בכלל; אם זכרוני אינו מטעני שמענו מיורם אמירה ברוח זו.

הגדרה 4.3. תהא f פונקציה,

⁸מהעובדה שהגבול עצמו אינו קיים נובע שהגבולות החד-צדדיים שונים.

⁹שאז בהכרח גם הגבול אינו קיים.

• נאמר ש- f רציפה מימין בנקודה $a \in \mathbb{R}$ אם מתקיים $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$.

• נאמר ש- f רציפה משמאל בנקודה $a \in \mathbb{R}$ אם מתקיים $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$.

♣ כדי שפונקציה תהיה רציפה (מימין/משמאל) בנקודה היא צריכה להיות מוגדרת בסביבה (ימנית/שמאלית) מלאה שלה.

♣ מהגדרות אלו נובע כמעט מיד שפונקציה רציפה בנקודה אם"ס היא רציפה בנקודה זו מימין ומשמאל.

הגדרה 4.4. פונקציה f תקרא רציפה אם היא רציפה בכל נקודה בתחום הגדרתה, כמו כן f תקרא רציפה בקטע פתוח $(a, b) \subseteq \mathbb{R}$ אם לכל $x \in (a, b)$ - f רציפה ב- x , ותקרא רציפה בקטע סגור $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ אם היא רציפה בקטע הפתוח (a, b) ובנוסף היא רציפה ב- a מימין וב- b משמאל.

♣ האינטואיציה לפונקציה רציפה היא פונקציה שאפשר לצייר את הגרף שלה מבלי להרים את העיפרון מהדף, וזו אכן משתקפת בהגדרה: בכל נקודה אין "קפיצות" בגרף (אחרת הגבול לא היה שווה לערך הפונקציה בנקודה) ולכן אין צורך "להרים את העיפרון" כדי לצייר אותה לאחר שציירנו את כל אלו שלפניה, ומאידך - אם הייתה נקודה שבה הגבול לא היה קיים או שלא היה שווה לערך הפונקציה בנקודה היינו מקבלים "קפיצה" בגרף ולא יכולים לצייר אותו מבלי "להרים את העיפרון".

4.2 משפטי רציפות

משפט 4.5. אפיון היינה לרציפות של פונקציה בנקודה

תהא f פונקציה המוגדרת בסביבה U של נקודה $a \in \mathbb{R}$.
 f רציפה ב- a אם ורק אם לכל סדרה $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ המתכנסת ל- a שכל איבריה ב- U מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(a)$.

מסקנה 4.6. אפיון היינה לרציפות חד-צדדית של פונקציה בנקודה

תהא f פונקציה המוגדרת בסביבה ימנית/שמאלית U של נקודה $a \in \mathbb{R}$.
 f רציפה מימין/משמאל ב- a אם ורק אם לכל סדרה $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ המתכנסת ל- a שכל איבריה ב- U מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(a)$.

משפט 4.7. אריתמטיקה של רציפות

תהיינה f ו- g פונקציות רציפות בנקודה $a \in \mathbb{R}$, מתקיימים שלושת הפסוקים הבאים:

1. $f + g$ רציפה ב- a .

2. גם $f \cdot g$ רציפה ב- a .

3. אם $g(a) \neq 0$ אז גם $\frac{1}{g}$ רציפה ב- a .

4. אם $g(a) \neq 0$ אז גם $\frac{f}{g}$ רציפה ב- a .

משפט 4.8. משפט ההצבה בגבולות לפונקציות רציפות

תהיינה $f : B \rightarrow C$ ו- $g : A \rightarrow B$ שתי פונקציות כך ש- g רציפה בנקודה פנימית $a \in A$ ו- f רציפה ב- $g(a)$ שהיא נקודה פנימית של B , הפונקציה $f \circ g$ רציפה ב- a .

♣ המשפט נובע כמעט באופן ישיר ממשפט ההצבה בגבולות לפונקציות לא רציפות (משפט 2.12).

♣ מכאן שאם f רציפה ב- A ו- g רציפה ב- B אז $g \circ f$ רציפה ב- A .

משפט 4.9. תהא f פונקציה רציפה בנקודה $a \in \mathbb{R}$ ויהי $y \in \mathbb{R}$

• אם $f(a) > y$ אז קיימת סביבה U של a כך ש- $f(x) > y$ לכל $x \in U$.

• אם $f(a) < y$ אז קיימת סביבה U של a כך ש- $f(x) < y$ לכל $x \in U$.

♣ המשפט נכון גם עבור רציפות חד-צדדית וסביבה חד-צדדית מתאימה.

משפט 4.10. משפט ערך הביניים

תהא f פונקציה רציפה בקטע סגור $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$, לכל y בקטע הסגור שבין $f(a)$ ל- $f(b)$ קיים $c \in [a, b]$ כך ש- $f(c) = y$.

הוכחה. נניח בהג"כ ש- $f(a) \leq f(b)$ ויהי $y \in [f(a), f(b)]$.

נסמן:

$$c := \sup \left\{ x \in [a, b] \mid \forall x' \in [a, x] : f(x') \leq y \right\}$$

הקבוצה שלעיל חסומה מהגדרתה והיא לא ריקה מפני ש- a שייך אליה, אי"כ c מוגדר היטב.

נניח בשלילה ש- $f(c) \neq y$, ממשפט 4.9 נובע כי:

• אם $f(c) > y$ אז קיימת סביבה U של c כך ש- $f(x) > y$ לכל $x \in U$, בפרט קיים $c > x \in U$ כך ש- $f(x) > y$ בסתירה להגדרת c .

• אם $f(c) < y$ אז קיימת סביבה U של c כך ש- $f(x) < y$ לכל $x \in U$, בפרט קיים $c < x \in U$ כך ש- $f(x) < y$ בסתירה להגדרת c .

¹⁰אם $f(a) = f(b)$ אז מדובר ב"קטע" הסגור $\{f(a)\} = \{f(b)\}$.

מכאן שהנחת השלילה אינה נכונה ו- $f(c) = y$.

מסקנה 4.11. תהא f פונקציה רציפה המוגדרת על מקטע כלשהו, גם התמונה של f היא מקטע.

משפט 4.12. משפט ויירשטראס הראשון¹¹

תהא f פונקציה רציפה בקטע סגור $I \subseteq \mathbb{R}$, f חסומה ב- I .

הוכחה. נניח בהג"כ ש- f אינה חסומה מלעיל ב- I , א"כ לכל $n \in \mathbb{N}$ קיים $x_n \in I$ כך ש- $f(x_n) > n$; תהא $(x_n)_{n=1}^\infty$ סדרה כנ"ל, א"כ $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \infty$.

מהגדרתה $(x_n)_{n=1}^\infty$ היא סדרה חסומה ולכן ממשפט בולצאנו-ויירשטראס יש לה תת-סדרה מתכנסת. תהא $(x_{n_k})_{n=1}^\infty$ תת-סדרה מתכנסת ונסמן $l := \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}$, מכיוון ש- I הוא קטע סגור נוכל לומר בבטחה ש- $l \in I$ ולכן מאפיון היינה לרציפות נובע שמתקיים:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(l)$$

אבל $(f(x_{n_k}))_{k=1}^\infty$ היא תת-סדרה של $(f(x_n))_{n=1}^\infty$ ולכן ממשפט הירושה נובע שמתקיים:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = \infty$$

וזוהי סתירה לכך שהגבול הנ"ל קיים במובן הצר.

מכאן שהנחת השלילה אינה נכונה ו- f חסומה ב- I .

משפט 4.13. עקרון המקסימום והמינימום של ויירשטראס (משפט ויירשטראס השני)

תהא f פונקציה רציפה בקטע סגור $I \subseteq \mathbb{R}$, f מקבלת מקסימום ומינימום ב- I (ל- $f(I)$ יש מקסימום ומינימום).

הוכחה. מהמשפט הקודם (4.12) נובע שהקבוצה $f(I)$ חסומה ומכאן שיש לה סופרמום ואינפמום, נסמן אותם ב- M וב- m בהתאמה. מהאפיון של הסופרמום והאינפמום נובע שלכל $n \in \mathbb{N}$ קיימים $a_n, b_n \in I$ כך שמתקיים $M - f(a_n) < \frac{1}{n}$ ו- $f(b_n) - m < \frac{1}{n}$, תהיינה $(a_n)_{n=1}^\infty$ ו- $(b_n)_{n=1}^\infty$ סדרות כנ"ל.

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = M, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) = m$$

מהגדרתן $(a_n)_{n=1}^\infty$ ו- $(b_n)_{n=1}^\infty$ הן סדרות חסומות ולכן ע"פ משפט בולצאנו-ויירשטראס יש להן תתי-סדרות מתכנסות, נסמן את גבולותיהן ב- L_1 ו- L_2 בהתאמה.

היות ש- I הוא קטע סגור נדע ש- $L_1, L_2 \in I$ ומאפיון היינה לרציפות נקבל שמתקיים:

$$f(L_1) = M, \quad f(L_2) = m$$

טענה 4.14. פונקציית הערך המוחלט $(f(x) := |x|)$ רציפה.

4.3 פולינומים ופונקציות טריגונומטריות

טענה 4.15. פונקציית הזהות $(\text{Id}(x) := x)$ רציפה.

מסקנה 4.16. כל פולינום הוא פונקציה רציפה.

למה 4.17. יהי $p \in \mathbb{R}[x]$ פולינום מתוקן מדרגה $n := \deg p \in \mathbb{N}$, כלומר קיימים $a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{R}$ ($a_{n-1} \neq 0$) כך שמתקיים:

$$p(x) = x^n + a_{n-1} \cdot x^{n-1} + \dots + a_1 \cdot x + a_0$$

יהיו $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ כנ"ל.

קיים $M \in \mathbb{R}$ $0 < M$ כך שלכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $p(x) > 0$ ובנוסף:

¹¹ערך בוויקיפדיה: ויירשטראס קארל.

• אם $n \in \text{Even}$ אז לכל $x \in \mathbb{R}$ $-M \geq x$ מתקיים $p(x) > 0$.

• אם $n \in \text{Odd}$ אז לכל $x \in \mathbb{R}$ $-M \geq x$ מתקיים $p(x) < 0$.

הוכחה. יהי $M \in \mathbb{R}$ $1 \leq M$ כך שמתקיים:

$$M > \sum_{k=0}^{n-1} |a_k|$$

יהי $x \in \mathbb{R}$ $M \leq x$, א"כ מתקיים $1 \leq x$ וגם:

$$x > \sum_{k=0}^{n-1} |a_k|$$

$$\Rightarrow x^n > x^{n-1} \cdot \sum_{k=0}^{n-1} |a_k| \geq \sum_{k=0}^{n-1} |a_k| \cdot x^k = \sum_{k=0}^{n-1} |a_k \cdot x^k|$$

$$\Rightarrow 0 < x^n - \sum_{k=0}^{n-1} |a_k \cdot x^k| \leq x^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k \cdot x^k = p(x)$$

יהי $y \in \mathbb{R}$ $-M \geq y$, א"כ מתקיים $1 \leq -y$ וגם:

$$-y > \sum_{k=0}^{n-1} |a_k|$$

ולכן גם:

$$(-y)^n > \sum_{k=0}^{n-1} |a_k \cdot (-y)^k| = \sum_{k=0}^{n-1} |a_k \cdot y^k|$$

כעת נחלק למקרים:

• אם $n \in \text{Even}$ אז $y^n = (-y)^n$ ומכאן שמתקיים:

$$0 < y^n - \sum_{k=0}^{n-1} |a_k \cdot y^k| \leq y^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k \cdot y^k = p(y)$$

• ואם $n \in \text{Odd}$ אז $y^n = -(-y)^n$ ומכאן שמתקיים:

$$0 > y^n + \sum_{k=0}^{n-1} |a_k \cdot y^k| \geq y^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k \cdot y^k = p(y)$$

■

מסקנה 4.18. יהי $p \in \mathbb{R}[x]$ פולינום מתוקן כך ש- $\deg p \in \text{Odd}$, קיים $x \in \mathbb{R}$ כך ש- $p(x) = 0$.

הוכחה. מהלמה (4.17) נובע שקיים $a \in \mathbb{R}$ כך ש- $f(a) > 0$ ו- $f(-a) < 0$, יהי a כנ"ל.

$$\Rightarrow 0 \in [f(-a), f(a)]$$

■

ממשפט ערך הביניים נובע שקיים $x \in [-a, a]$ כך ש- $f(x) = 0$.

מסקנה 4.19. יהי $p \in \mathbb{R}[x]$ פולינום מתוקן כך ש- $\deg p \in \text{Odd}$, לכל $y \in \mathbb{R}$ קיים $x \in \mathbb{R}$ כך ש- $p(x) = y$.

הוכחה. יהי $y \in \mathbb{R}$ יהי $q \in \mathbb{R}[x]$ פולינום המוגדר ע"י $q(x) := p(x) - y$, זהו פולינום מתוקן מדרגה אי-זוגית ולכן קיים $x \in \mathbb{R}$

כך ש- $p(x) - y = q(x) = 0$ וממילא אותו x מקיים $p(x) = y$.

■

משפט 4.20. יהי $p \in \mathbb{R}[x]$ פולינום מתוקן כך ש- $\deg p \in \text{Even}$, יש ל- p מינימום.

הוכחה. יהי $q \in \mathbb{R}[x]$ פולינום המוגדר ע"י $q(x) := p(x) - p(0)$, מלמה 4.17 נובע שקיים $M \in \mathbb{R}$ $0 < M$ כך שלכל $x \in \mathbb{R}$ המקיים $x \geq M$ מתקיים $p(\pm x) - p(0) = q(\pm x) > 0$, יהי M כנ"ל. מכאן שלכל $x \in \mathbb{R}$ כך ש- $x \geq M$ מתקיים $p(\pm x) > p(0)$. מעקרון המקסימום והמינימום של וירשטראס נובע שקיים $c \in [-M, M]$ כך שלכל $x \in [-M, M]$ מתקיים $p(c) \leq p(x)$, יהי c כנ"ל. מכאן שלכל $x \in \mathbb{R}$ כך ש- $x \notin [-M, M]$ מתקיים $p(x) > p(0) \geq p(c)$, אי"כ לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $p(x) \geq p(c)$. ■

משפט 4.21. יהי $p \in \mathbb{R}[x]$ פולינום מתוקן כך ש- $\deg p \in \text{Even}$, קיים $m \in \mathbb{R}$ המקיים:

1. לכל $y \in \mathbb{R}$ $m \leq y$ קיים $x \in \mathbb{R}$ כך ש- $p(x) = y$.

2. לכל $y \in \mathbb{R}$ $m > y$ לא קיים $x \in \mathbb{R}$ כך ש- $p(x) = y$.

הוכחה. תהא $a \in \mathbb{R}$ נקודת מינימום של p , מכאן שלכל $y \in \mathbb{R}$ $p(a) > y$ לא קיים $x \in \mathbb{R}$ כך ש- $p(x) = y$. יהי $p(a) \leq y \in \mathbb{R}$ ויהי $q \in \mathbb{R}[x]$ פולינום המוגדר ע"י $q(x) := p(x) - y$, מלמה 4.17 נובע שקיים $a < b \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < p(b) - y = q(b) > 0$, כלומר $p(b) > y$. $\Rightarrow y \in [p(a), p(b)]$

מכאן שע"פ משפט ערך הביניים קיים $c \in [a, b]$ כך ש- $f(c) = y$. ■

מסקנה 4.22. יהי $p \in \mathbb{R}[x]$ פולינום מדרגה $n \in \mathbb{N}$ מתקיימים כל הפסוקים הבאים:

• אם $n \in \text{Odd}$ אז לכל $y \in \mathbb{R}$ קיים $x \in \mathbb{R}$ כך ש- $q(x) = y$.

• נניח $n \in \text{Even}$,

- אם $b_n > 0$ אז קיים $m \in \mathbb{R}$ כך שלכל $y \in \mathbb{R}$ $m \leq y$ קיים $x \in \mathbb{R}$ כך ש- $p(x) = y$ ולכל $m > y \in \mathbb{R}$ לא קיים $x \in \mathbb{R}$ כך ש- $p(x) = y$, בפרט יש ל- p נקודת מינימום.

- אם $b_n < 0$ אז קיים $M \in \mathbb{R}$ כך שלכל $y \in \mathbb{R}$ $M \geq y$ קיים $x \in \mathbb{R}$ כך ש- $p(x) = y$ ולכל $M < y \in \mathbb{R}$ לא קיים $x \in \mathbb{R}$ כך ש- $p(x) = y$, בפרט יש ל- p נקודת מקסימום.

טענה 4.23. הפונקציות $\sin$ ו- $\cos$ רציפות.

הוכחה. יהי $a \in \mathbb{R}$.


יהי $0 < \varepsilon \in \mathbb{R}$ ונסמן $\delta := \varepsilon$, מכאן שלכל $x \in B_\delta(a)$ מתקיים:

$$\begin{aligned} |\sin x - \sin a| &= \left| 2 \sin \left(\frac{x-a}{2} \right) \cdot \cos \left(\frac{x+a}{2} \right) \right| = 2 \cdot \left| \sin \left(\frac{x-a}{2} \right) \right| \cdot \left| \cos \left(\frac{x+a}{2} \right) \right| \\ &\leq 2 \cdot \left| \frac{x-a}{2} \right| \cdot 1 = |x-a| < \delta = \varepsilon \\ |\cos x - \cos a| &= \left| -2 \sin \left(\frac{x-a}{2} \right) \cdot \sin \left(\frac{x+a}{2} \right) \right| = 2 \cdot \left| \sin \left(\frac{x-a}{2} \right) \right| \cdot \left| \sin \left(\frac{x+a}{2} \right) \right| \\ &\leq 2 \cdot \left| \frac{x-a}{2} \right| \cdot 1 = |x-a| < \delta = \varepsilon \end{aligned}$$

■

טענה 4.24. מתקיים:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$



הוכחה. תהא $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$ ונסמן את הנקודות הבאות במישור (ראו באיור):

$$O := (0, 0)$$

$$A := (\cos \theta, \sin \theta)$$

$$B := (1, 0)$$

$$C := \left(1, \frac{\sin \theta}{\cos \theta}\right)$$

א"כ שטח המשולש ΔAOB הוא:

$$S_{\Delta AOB} = \frac{1}{2} \cdot \sin \theta$$

השטח של הגזרה $\angle AOB$ ¹² הוא:

$$S_{\angle AOB} = \frac{1}{2} \cdot \theta$$

כמו כן, שטח המשולש ΔCOB הוא:

$$S_{\Delta COB} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

מהעובדה שהמשולש ΔCOB מכיל את הגזרה $\angle AOB$ שמכילה את המשולש ΔCOB נובע שמתקיים:

$$\frac{1}{2} \cdot \sin \theta \leq \frac{1}{2} \cdot \theta \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$\Rightarrow 1 \leq \frac{\theta}{\sin \theta} \leq \frac{1}{\cos \theta}$$

מהעובדה ש- $\sin$ אי-זוגית ו- $\sin$ זוגית נובע שמתקיים:

$$\frac{-\theta}{\sin(-\theta)} = \frac{-\theta}{-\sin \theta} = \frac{\theta}{\sin \theta}, \quad \frac{1}{\cos(-\theta)} = \frac{1}{\cos \theta}$$

$$\Rightarrow 1 \leq \frac{-x}{\sin(-x)} \leq \frac{1}{\cos(-x)}$$

θ הנ"ל היתה שרירותית ולכן הנ"ל נכון לכל $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, כלומר לכל $x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ מתקיים:

$$1 \leq \frac{x}{\sin x} \leq \frac{1}{\cos x}$$

מהרציפות של $\cos$ נובע שמתקיים:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} = 1$$

¹²החלק בעיגול ("משולש הפיצה") התחום בין הרדיוס העובר ב- A לרדיוס העובר ב- B .

ומכאן שע"פ משפט הכריך מתקיים :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = 1$$

ולכן מאריתמטיקה של גבולות נובע כי :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$



5 גבולות במובן הרחב

5.1 הגדרות

כמו שכבר עשינו בסדרות, נרצה להגדיר גבולות במובן הרחב. את הצבועים בירוק כבר הגדרנו, נרצה להגדיר את הצבועים באדום:

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$	$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$	$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$	$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty$	$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \infty$
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$	$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$	$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty$

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$
$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$
$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

כמובן שגם גבולות במובן הרחב הם יחידים (אם הם קיימים).



הגדרה 5.1. גבולות במובן הרחב¹³

• תהא f פונקציה המוגדרת בסביבה מנוקבת של נקודה $a \in \mathbb{R}$.

– נאמר ש- f שואפת לאין-סוף ב- a אם לכל $M \in \mathbb{R}$ קיימת $0 < \delta \in \mathbb{R}$ כך שמתקיים $x \in B_\delta^\circ(a) \Rightarrow f(x) > M$.

– נאמר ש- f שואפת למינוס אין-סוף ב- a אם לכל $m \in \mathbb{R}$ קיימת $0 < \delta \in \mathbb{R}$ כך שמתקיים $x \in B_\delta^\circ(a) \Rightarrow f(x) < m$.

• תהא f פונקציה המוגדרת בסביבה ימנית של נקודה $a \in \mathbb{R}$.

– נאמר ש- f שואפת לאין-סוף מימין ל- a אם לכל $M \in \mathbb{R}$ קיימת $0 < \delta \in \mathbb{R}$ כך שמתקיים $x \in (a, a + \delta) \Rightarrow f(x) > M$.

– נאמר ש- f שואפת למינוס אין-סוף מימין ל- a אם לכל $m \in \mathbb{R}$ קיימת $0 < \delta \in \mathbb{R}$ כך שמתקיים $x \in (a, a + \delta) \Rightarrow f(x) < m$.

• תהא f פונקציה המוגדרת בסביבה שמאלית של נקודה $a \in \mathbb{R}$.

– נאמר ש- f שואפת לאין-סוף משמאל ל- a אם לכל $M \in \mathbb{R}$ קיימת $0 < \delta \in \mathbb{R}$ כך שמתקיים $x \in (a - \delta, a) \Rightarrow f(x) > M$.

– נאמר ש- f שואפת למינוס אין-סוף משמאל ל- a אם לכל $m \in \mathbb{R}$ קיימת $0 < \delta \in \mathbb{R}$ כך שמתקיים $x \in (a - \delta, a) \Rightarrow f(x) < m$.

• תהא f פונקציה המוגדרת על קרן ימנית.

– נאמר ש- f שואפת למספר ממשי ב- L אם לכל $\varepsilon \in \mathbb{R}$ $0 < \varepsilon$ קיים $K \in \mathbb{R}$ כך שלכל $K < x \in \mathbb{R}$ מתקיים $|f(x) - L| < \varepsilon$.

– נאמר ש- f שואפת לאין-סוף ב- ∞ אם לכל $M \in \mathbb{R}$ קיים $K \in \mathbb{R}$ כך שלכל $K < x \in \mathbb{R}$ מתקיים $f(x) > M$.

– נאמר ש- f שואפת למינוס אין-סוף ב- ∞ אם לכל $m \in \mathbb{R}$ קיים $K \in \mathbb{R}$ כך שלכל $K < x \in \mathbb{R}$ מתקיים $f(x) < m$.

• תהא f פונקציה המוגדרת על קרן שמאלית.

¹³ מסודרים בסדר הנ"ל טבלה אחרי טבלה, מלמעלה למטה ומימין לשמאל.

– נאמר ש- f שואפת למספר ממשי L ב- $-\infty$ אם לכל $\varepsilon \in \mathbb{R}$ $0 < \varepsilon$ קיים $K \in \mathbb{R}$ כך שלכל $K > x \in \mathbb{R}$ מתקיים $|f(x) - L| < \varepsilon$.

– נאמר ש- f שואפת לאין-סוף ב- $-\infty$ אם לכל $M \in \mathbb{R}$ קיים $K \in \mathbb{R}$ כך שלכל $K > x \in \mathbb{R}$ מתקיים $f(x) > M$.

– נאמר ש- f שואפת למינוס אין-סוף ב- $-\infty$ אם לכל $m \in \mathbb{R}$ קיים $K \in \mathbb{R}$ כך שלכל $K > x \in \mathbb{R}$ מתקיים $f(x) < m$.

♣ כמובן שעדיף להבין את ההיגיון מאחורי ההגדרות ולא לשנן אותן כתוכי, הסיבה להבאתן של כל ההגדרות כאן היא רצוני שהכל יהיה כתוב כך שכאשר נדבר על מושגים אלו בהמשך נדבר על מושגים שאכן הגדרנו בפירוש.

הגדרה 5.2. אסימפטוטות בנקודה

נאמר של- f יש אסימפטוטה אנכית בנקודה $a \in \mathbb{R}$ אם מתקיים לפחות אחד מהשוויונים הבאים:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty$$

הגדרה 5.3. אסימפטוטות משופעות (אסימפטוטות ב- $\pm\infty$)

• נאמר שישר $\{(x, ax + b) \mid x \in \mathbb{R}\}$ הוא אסימפטוטה משופעת של f ב- ∞ אם מתקיים:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$$

• נאמר שישר $\{(x, ax + b) \mid x \in \mathbb{R}\}$ הוא אסימפטוטה משופעת של f ב- $-\infty$ אם מתקיים:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$$

כאשר $a = 0$ נהוג לומר גם שזו אסימפטוטה אופקית.

♣ כמעט כל המשפטים הבאים הם גרסאות של המשפטים המתאימים לגבול של פונקציה בנקודה והוכחותיהם דומות מאד לאלו שכבר ראינו.

משפט 5.4. תהא f פונקציה, הגבול $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$ קיים במובן הרחב אם"ם הגבול $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} f(-x)$ קיים במובן הרחב ובמקרה זה מתקיים גם:

$$\lim_{x \rightarrow \mp\infty} f(-x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$$

משפט 5.5. אפיון היינה לגבולות במובן הרחב

תהא $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה ויהי $L \in \mathbb{R}$.

• נניח ש- A מכילה סביבה מנוקבת U של נקודה $a \in \mathbb{R}$, מתקיים $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$ אם"ם לכל סדרה $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ המתכנסת ל- a שכל איבריה שייכים ל- U מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \pm\infty$.

• נניח ש- A מכילה סביבה ימנית U של נקודה $a \in \mathbb{R}$, מתקיים $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$ אם"ם לכל סדרה $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ המתכנסת ל- a שכל איבריה שייכים ל- U מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \pm\infty$.

• נניח ש- A מכילה סביבה שמאלית U של נקודה $a \in \mathbb{R}$, מתקיים $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty$ אם"ם לכל סדרה $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ המתכנסת ל- a שכל איבריה שייכים ל- U מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \pm\infty$.

• נניח ש- f מוגדרת על קרן ימנית D ,

– מתקיים $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ אם"ם לכל סדרה $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ השואפת ל- ∞ שכל איבריה ב- D מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L$.

– מתקיים $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \pm\infty$ אם"ם לכל סדרה $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ השואפת ל- ∞ שכל איבריה שייכים ל- D מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \pm\infty$.

• נניח ש- f מוגדרת על קרן שמאלית D ,

– מתקיים $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$ אם"ם לכל סדרה $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ השואפת ל- $-\infty$ שכל איבריה ב- D מתקיים $\lim_{n \rightarrow -\infty} f(x_n) = L$.

– מתקיים $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \pm\infty$ אם"ם לכל סדרה $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ השואפת ל- $-\infty$ שכל איבריה שייכים ל- D מתקיים $\lim_{n \rightarrow -\infty} f(x_n) = \pm\infty$.

משפט 5.6. תנאי קושי לגבול של פונקציה ב- $\pm\infty$

• תהא f פונקציה המוגדרת בקרן ימנית, תנאי הכרחי ומספיק לקיום הגבול $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ הוא שלכל $0 < \varepsilon \in \mathbb{R}$ קיים $M \in \mathbb{R}$ כך שלכל $M < x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ מתקיים $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

• תהא f פונקציה המוגדרת בקרן שמאלית, תנאי הכרחי ומספיק לקיום הגבול $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ הוא שלכל $0 < \varepsilon \in \mathbb{R}$ קיים $m \in \mathbb{R}$ כך שלכל $m > x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ מתקיים $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

משפט 5.7. אריתמטיקה של גבולות במובן הרחב

תהינה f ו- g פונקציות ממשיות המוגדרות בקרן מתאימה כך שהגבולות הבאים קיימים:

$$l := \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x), \quad m := \lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x)$$

מתקיימים כל הפסוקים הבאים:

$$1. \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f + g)(x) = l + m$$

$$2. \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f \cdot g)(x) = l \cdot m$$

$$3. \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{m} \text{ אם } m \neq 0$$

$$4. \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{l}{m} \text{ אם } m \neq 0$$

משפט 5.8. משפט ההצבה בגבולות במובן הרחב

תהינה f ו- g פונקציות המוגדרות על כל הישר¹⁴.

• נניח ש- $l := \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$ קיים וממשי ($l \in \mathbb{R}$).

– אם g רציפה ב- l אז מתקיים $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (g \circ f)(x) = g(l)$

– אם g אינה רציפה ב- l אך קיימת קרן ימנית/שמאלית כך ש- $f(x) \neq l$ לכל x בקרן והגבול $\lim_{x \rightarrow l} g(x)$ קיים במובן הרחב אז

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (g \circ f)(x) = \lim_{x \rightarrow l} g(x)$$

• נניח ש- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \infty$, אם הגבול $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ קיים במובן הרחב אז $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (g \circ f)(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$

• נניח ש- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = -\infty$, אם הגבול $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ קיים במובן הרחב אז $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (g \circ f)(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$

משפט 5.9. משפט הפרוסה

תהינה f ו- g פונקציות המוגדרות על כל הישר כך שלכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $f(x) \leq g(x)$.

• אם $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \infty$ אז גם $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = \infty$

• כמו כן, אם $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = -\infty$ אז גם $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = -\infty$

משפט 5.10. כלל אפסה וחסומה לגבולות במובן הרחב

תהינה f ו- g פונקציות המוגדרות על כל הישר.

• אם $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ ו- g חסומה מלמעלה בקרן ימנית אז $\lim_{x \rightarrow \infty} (f \cdot g)(x) = 0$

• כמו כן, אם $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ ו- g חסומה מלמעלה בקרן שמאלית אז $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f \cdot g)(x) = 0$

משפט 5.11. כלל המכפלה לגבולות במובן הרחב

תהינה f ו- g פונקציות המוגדרות בסביבה מנוקבת של נקודה $a \in \mathbb{R}$.

• אם $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ וגם g חסומה מלמעלה ע"י חסם חיובי אז $\lim_{x \rightarrow a} (f \cdot g)(x) = \infty$

• אם $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ וגם g חסומה מלמעלה ע"י חסם חיובי אז $\lim_{x \rightarrow a} (f \cdot g)(x) = -\infty$

¹⁴ניתן גם להגדיר אותן רק על הקרנות המתאימות, הערה זו תקפה גם בשני המשפטים הבאים.

טענה 5.12. תהא $f : A \rightarrow B$ פונקציה.

• נניח ש- A מכילה סביבה מנוקבת U של נקודה $a \in \mathbb{R}$ כך ש- $f(x) \neq 0$ לכל $x \in U$.

$$- \text{ אם } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 \text{ אז } \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = \infty$$

$$- \text{ אם } \lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = \infty \text{ אז } \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = 0$$

• נניח ש- A מכילה קרן שמאלית כך ש- $f(x) \neq 0$ לכל x בקרן,

$$- \text{ אם } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0 \text{ אז } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{f(x)} = \infty$$

$$- \text{ אם } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} |f(x)| = \infty \text{ אז } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{f(x)} = 0$$

מה שהטענה אומרת בעצם הוא שלכל פונקציה f מתקיים: ♣

$$\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = \infty \iff \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} |f(x)| = \infty \iff \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{f(x)} = 0$$

טענה 5.13. תהא $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה, ישר $\{(x, ax + b) \mid x \in \mathbb{R}\}$ הוא אסימפטוטה משופעת של f ב- $\pm\infty$ אם מתקיים (במובן הצר):

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = a, \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - ax) = b$$

טענה 5.14. יהי $p \in \mathbb{R}[x]$ פולינום מתוקן מדרגה n , מתקיים $\lim_{x \rightarrow \infty} p(x) = \infty$ ובנוסף:

$$\bullet \text{ אם } n \in \text{Even} \text{ אז } \lim_{x \rightarrow -\infty} p(x) = \infty$$

$$\bullet \text{ אם } n \in \text{Odd} \text{ אז } \lim_{x \rightarrow -\infty} p(x) = -\infty$$

הוכחה. יהי $M \in \mathbb{R}$ ויהי $q \in \mathbb{R}[x]$ פולינום המוגדר ע"י $q(x) := p(x) - M$, מלמה 4.17 נובע שקיים $0 < K \in \mathbb{R}$ כך שלכל $K < x \in \mathbb{R}$ מתקיים:

$$0 < q(x) = p(x) - M$$

$$p(x) > M$$

כמו כן מאותה למה נובע שאותו K מקיים בנוסף:

$$\bullet \text{ שאם } n \in \text{Even} \text{ אז לכל } -K > x \in \mathbb{R} \text{ מתקיים גם } p(x) - M = q(x) > 0 \text{ כלומר } p(x) > M$$

$$\bullet \text{ שאם } n \in \text{Even} \text{ אז לכל } -K > x \in \mathbb{R} \text{ מתקיים גם } p(x) - M = q(x) < 0 \text{ כלומר } p(x) < M$$

M הנ"ל היה שרירותי ולכן הדבר נכון לכל M ומהגדרה נקבל את המבוקש. ■

מסקנה 5.15. יהי $p \in \mathbb{R}[x]$ פולינום מדרגה $n \in \mathbb{N}$ ונסמן ב- a_n את המקדם של החזקה ה- n -ית שלו.

• נניח ש- $a_n > 0$,

- אם $n \in \text{Even}$ אז מתקיים $\lim_{x \rightarrow \infty} p(x) = \infty$ וגם $\lim_{x \rightarrow -\infty} p(x) = \infty$

- אם $n \in \text{Odd}$ אז מתקיים $\lim_{x \rightarrow \infty} p(x) = \infty$ וגם $\lim_{x \rightarrow -\infty} p(x) = -\infty$

• נניח ש- $a_n < 0$,

- אם $n \in \text{Even}$ אז מתקיים $\lim_{x \rightarrow \infty} p(x) = -\infty$ וגם $\lim_{x \rightarrow -\infty} p(x) = -\infty$

- אם $n \in \text{Odd}$ אז מתקיים $\lim_{x \rightarrow \infty} p(x) = -\infty$ וגם $\lim_{x \rightarrow -\infty} p(x) = \infty$

טענה 5.16. יהיו $p, q \in \mathbb{R}[x]$ ויהיו $a_0, a_1, \dots, a_n, b_0, b_1, \dots, b_m \in \mathbb{R}$ ו- $a_n \neq 0$ ו- $b_m \neq 0$ כך שמתקיים:

$$f(x) = a_n \cdot x^n + a_{n-1} \cdot x^{n-1} + \dots + a_1 \cdot x + a_0$$

$$g(x) = b_m \cdot x^m + b_{m-1} \cdot x^{m-1} + \dots + b_1 \cdot x + b_0$$

• אם $n < m$ אז $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$

• אם $n = m$ אז $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a_n}{b_n}$

• נניח ש- $n > m$,

- אם $\text{sgn}(a_n) = \text{sgn}(b_m)$ אז $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$

- אם $\text{sgn}(a_n) \neq \text{sgn}(b_m)$ אז $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = -\infty$

הוכחה. אם $n = 0$ ו/או $m = 0$ אז הטענה נובעת מהמשפטים הקודמים, א"כ נוכל להניח שהם שונים מ-0.

• נניח ש- $n \leq m$. מאריתמטיקה של גבולות נובע שמתקיים:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^n} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x^n} \cdot \sum_{i=0}^n a_i \cdot x^i \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(a_n + \sum_{i=0}^{n-1} a_i \cdot \frac{1}{x^{n-i}} \right) \\ &= a_n + \sum_{i=0}^{n-1} \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \left(a_i \cdot \frac{1}{x^{n-i}} \right) \right) = a_n + \sum_{i=0}^{n-1} \left(a_i \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^{n-i}} \right) \\ &= a_n + \sum_{i=0}^{n-1} (a_i \cdot 0) = a_n \end{aligned}$$

מכאן שמארימטיקה של גבולות נובע שמתקיים גם:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{f(x)}{x^n} \cdot \frac{x^m}{g(x)} \cdot \frac{x^n}{x^m} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^n} \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^m}{g(x)} \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^{m-n}} \end{aligned}$$

כעת, אם $n < m$ אז נקבל:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = a_n \cdot (b_n)^{-1} \cdot 0 = 0$$

ואם $n = m$ אז נקבל:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = a_n \cdot (b_n)^{-1} \cdot 1 = \frac{a_n}{b_n}$$

• נניח $m > n$ נחלק את f ב- g עם שארית: יהיו $q, r \in \mathbb{R}[x]$ כך ש- $\deg r < \deg g$ ומתקיים $g = q \cdot f + r$, א"כ מתקיים $\deg q = m - n > 0$.

מתכונות של כפל פולינומים נובע שהמקדם של החזקה הגדולה ביותר ב- q הוא $\frac{a_n}{b_n}$ ומכאן שמתקיים:

$$\frac{a_n}{b_n} > 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} q(x) = \infty$$

$$\frac{a_n}{b_n} < 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} q(x) = -\infty$$

מהסעיף הקודם נובע שמתקיים $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{r(x)}{g(x)} = 0$ לכן מאריתמטיקה של גבולות נקבל שמתקיים:

$$\frac{a_n}{b_n} > 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$$

$$\frac{a_n}{b_n} < 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = -\infty$$

■

6 מונוטוניות

6.1 הגדרות

הגדרה 6.1. פונקציות מונוטוניות

תהא $f: A \rightarrow B$ פונקציה.

1. נאמר ש- f מונוטונית עולה אם לכל $x, y \in A$ המקיימים $x < y$ מתקיים $f(x) \leq f(y)$.

2. נאמר ש- f עולה ממש¹⁵ אם לכל $x, y \in A$ המקיימים $x < y$ מתקיים $f(x) < f(y)$.

3. נאמר ש- f מונוטונית יורדת אם לכל $x, y \in A$ המקיימים $x < y$ מתקיים $f(x) \geq f(y)$.

4. נאמר ש- f יורדת ממש אם לכל $x, y \in A$ המקיימים $x < y$ מתקיים $f(x) > f(y)$.

5. נאמר ש- f מונוטונית אם היא מקיימת את אחד מארבעת הסעיפים הקודמים.

6. נאמר ש- f מונוטונית ממש אם היא עולה ממש או יורדת ממש.

מסקנה 6.2. כל פונקציה מונוטונית ממש היא חח"ע.

¹⁵יש אומרים מונוטונית עולה ממש וכן לגבי מונוטונית יורדת ממש.

טענה 6.3. קיום גבולות חד-צדדיים של פונקציות מונוטוניות וחסומות:

1. תהא f פונקציה מונוטונית **עולה** המוגדרת בסביבה **שמאלית** U של נקודה $a \in \mathbb{R}$ וחסומה **מלעיל** בסביבה זו, הגבול $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ קיים ושווה ל- $\sup f(U)$.

2. תהא f פונקציה מונוטונית **עולה** המוגדרת בסביבה **ימנית** U של נקודה $a \in \mathbb{R}$ וחסומה **מלרע** בסביבה זו, הגבול $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ קיים ושווה ל- $\inf f(U)$.

3. תהא f פונקציה מונוטונית **יורדת** המוגדרת בסביבה **שמאלית** U של נקודה $a \in \mathbb{R}$ וחסומה **מלרע** בסביבה זו, הגבול $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ קיים ושווה ל- $\inf f(U)$.

4. תהא f פונקציה מונוטונית **יורדת** המוגדרת בסביבה **ימנית** U של נקודה $a \in \mathbb{R}$ וחסומה **מלעיל** בסביבה זו, הגבול $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ קיים ושווה ל- $\sup f(U)$.

הוכחה. נוכיח את סעיף 1, ההוכחות של שאר הסעיפים דומות למדי.

יהי $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $0 < \varepsilon$, מהאפיון של החסם העליון נובע שקיים $b \in U$ כך ש- $\sup f(U) - f(b) < \varepsilon$, יהי x כנ"ל ונסמן $\delta := a - b > 0$. מכיוון ש- U היא סביבה שמאלית של a נדע שלכל $x \in U$ המקיים $|x - a| < \delta$ מתקיים:

$$a - b = \delta > |x - a| = a - x$$

ומכאן שגם $x > b$ ולכן מהמונוטוניות של f נובע שלכל $x \in U$ המקיים $|x - a| < \delta$ מתקיים $\sup f(U) \geq f(x) \geq f(b)$ ולכן גם:

$$|f(x) - \sup f(U)| = \sup f(U) - f(x) \leq \sup f(U) - f(b) < \varepsilon$$

■

מסקנה 6.4. תהא f פונקציה המוגדרת בסביבה מנוקבת של נקודה $a \in \mathbb{R}$, אם f מונוטונית אז שני הגבולות החד-צדדיים של a קיימים ובנוסף:

• אם f מונוטונית עולה אז $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$

• ואם f מונוטונית יורדת אז $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \geq \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$

מסקנה 6.5. תהא f פונקציה המוגדרת בסביבה מלאה של $a \in \mathbb{R}$.

• אם f מונוטונית עולה אז $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \leq f(a) \leq \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$

• ואם f מונוטונית יורדת אז $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \geq f(a) \geq \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$

טענה 6.6. תהא $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה, אם f מונוטונית ב- (a, b) אז f מונוטונית גם ב- $[a, b]$ באותו סוג מונוטוניות.

הוכחה. נוכיח את הטענה עבור פונקציות מונוטוניות עולות ועולות ממש, ההוכחה עבור שני הסוגים האחרים דומה מאד.

יהיו $x, y \in [a, b]$ כך ש- $x < y$, אם $x, y \in (a, b)$ אז מהנתון נובע ש- x ו- y מקיימים את הנדרש ולכן נוכל להניח ש- $x = a$ ו/או $y = b$.

• נניח ש- f מונוטונית עולה ונניח בשלילה ש- $f(x) > f(y)$.

– אם $x = a$ אז מהמסקנה האחרונה (6.5) נובע שקיימת סביבה ימנית $U \subseteq [a, b]$ של x כך שלכל $c \in U$ מתקיים $f(c) \geq f(x)$, יהי c כנ"ל כך ש- $c < y$.

מהגדרה $c \in (a, b)$ ולכן מהמונוטוניות של f נובע ש- $f(c) \leq f(y) < f(x)$ בסתירה לכך ש- $f(c) \geq f(x)$.

– אם $y = b$ אז מהמסקנה האחרונה נובע שקיימת סביבה שמאלית $U \subseteq [a, b]$ של y כך שלכל $c \in U$ מתקיים $f(c) \leq f(y)$, יהי c כנ"ל כך ש- $c > x$.

מהגדרה $c \in (a, b)$ ולכן מהמונוטוניות של f נובע ש- $f(c) \geq f(x) > f(y)$ בסתירה לכך ש- $f(c) \leq f(y)$.

• נניח ש- f מונוטונית עולה ונניח בשלילה ש- $f(x) \geq f(y)$.

– אם $x = a$ אז מהמסקנה האחרונה נובע שקיימת סביבה ימנית $U \subseteq [a, b]$ של x כך שלכל $c \in U$ מתקיים $f(c) \geq f(x)$, יהי c כנ"ל כך ש- $c < y$.

מהגדרה $c \in (a, b)$ ולכן מהמונוטוניות של f נובע ש- $f(c) < f(y) \leq f(x)$ בסתירה לכך ש- $f(c) \geq f(x)$.

– אם $y = b$ אז מהמסקנה האחרונה נובע שקיימת סביבה שמאלית $U \subseteq [a, b]$ של y כך שלכל $c \in U$ מתקיים $f(c) \leq f(y)$, יהי c כנ"ל כך ש- $c > x$.

מהגדרה $c \in (a, b)$ ולכן מהמונוטוניות של f נובע ש- $f(c) > f(x) \geq f(y)$ בסתירה לכך ש- $f(c) \leq f(y)$.

מכאן שהנחות השלילה אינן נכונות, כלומר אם f מונוטונית עולה אז $f(x) \leq f(y)$ ואם f עולה ממש אז $f(x) < f(y)$. ■

7 הפיכות

7.1 הגדרות

ההגדרה של פונקציה הפיכה והפונקציה ההופכית שלה מופיעה בקובץ "הנאיבית הקבוצות תורת".

טענה 7.1. תהא f פונקציה מונוטונית ורח"ע, f מונוטונית ממש.

משפט 7.2. תהא $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה ורח"ע המוגדרת על מקטע I , f מונוטונית ממש.

הוכחה. נניח בשלילה ש- f אינה מונוטונית ממש, מכאן שקיימות שלוש נקודות $a, b, c \in I$ כך ש- $a < c < b$ המקיימות $\max\{f(a), f(b)\} \leq f(c)$ ו/או $\min\{f(a), f(b)\} \geq f(c)$ ¹⁶.
 תהינה a, b, c כנ"ל, נזכור ש- f חח"ע ומכאן ש- $\max\{f(a), f(b)\} < f(c)$ או $\min\{f(a), f(b)\} > f(c)$.
 נניח בהג"כ שמתקיים $M := \max\{f(a), f(b)\} < f(c)$.
 ממשפט ערך הביניים נובע שקיים $x_1 \in [a, c]$ כך ש- $[f(a), f(c)] \subseteq (M, f(c)) \subseteq (M, f(x_1))$, יהי x_1 כנ"ל.
 ושוב, ממשפט ערך הביניים נובע שקיים $x_2 \in [c, b]$ כך ש- $[f(b), f(c)] \subseteq (M, f(c)) \subseteq (M, f(x_2))$.
 מהגדרה $f(x_1) \neq f(c)$ וגם $f(x_2) \neq f(c)$ ומכאן ש- $x_1 \neq c$ וגם $x_2 \neq c$ וממילא $x_1 < c < x_2$, כלומר $x_1 \neq x_2$; אבל $f(x_1) = f(x_2)$ בסתירה לכך ש- f חח"ע.
 מכאן שהנחת השלילה אינה נכונה ו- f מונוטונית ממש. ■

משפט 7.3. תהא $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה חח"ע ורציפה, מתקיים אחד משני הפסוקים הבאים:

• f עולה ממש ואז $\text{Im}f = [f(a), f(b)]$.

• f יורדת ממש ואז $\text{Im}f = [f(b), f(a)]$.



המשפט נכון גם עבור מקטעים שאינם קטעים סגורים אך בשינוי קל: התמונה של פונקציה רציפה ורח"ע המוגדרת על מקטע היא מקטע בעל אותן תכונות של סגירות/פתיחות, כלומר לכל אחת משלוש הקטגוריות הבאות הפונקציה תעתיק מקטע מקטגוריה כלשהי למקטע מאותה קטגוריה:

1. מקטעים סגורים - קטעים סגורים.

2. מקטעים פתוחים - קטעים פתוחים, קרנות פתוחות והישר כולו.

3. מקטעים חצי סגורים - קטעים חצי סגורים וקרנות סגורות.

הוכחה. ממשפט 7.2 נובע ש- f עולה ממש או יורדת ממש, א"כ הוכחנו כבר חצי מהמשפט.
 ממשפט ערך הביניים נובע שהקטע הסגור שבין $f(a)$ ל- $f(b)$ מוכל ב- $\text{Im}f$, נראה את ההכלה בכיוון ההפוך.

• אם f עולה ממש אז לכל $x \in [a, b]$ מתקיים $f(a) \leq f(x) \leq f(b)$, כלומר $f(x) \in [f(a), f(b)]$ ומכאן ש- $\text{Im}f \subseteq [f(a), f(b)]$.

• אם f יורדת ממש אז לכל $x \in [a, b]$ מתקיים $f(a) \geq f(x) \geq f(b)$, כלומר $f(x) \in [f(b), f(a)]$ ומכאן ש- $\text{Im}f \subseteq [f(b), f(a)]$. ■

¹⁶אחרת לכל שלוש נקודות כאלה מתקיים $\min\{f(a), f(b)\} < f(c) < \max\{f(a), f(b)\}$ ומכאן ש- f מונוטונית ממש (אם $f(a) < f(b)$ אז עולה ממש ואם $f(a) > f(b)$ אז יורדת ממש).

משפט 7.4. תהא $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה והפיכה, גם f^{-1} רציפה.

♣

האינטואיציה למשפט היא שהגרף של f^{-1} הוא שיקוף הגרף של f ביחס לאלכסון הראשי, כלומר כל ציור של הגרף של f הוא גם ציור הגרף של f^{-1} (נחליף בין הצירים), ולכן אם אפשר "לצייר" את הגרף של f מבלי "להרים את העיפרון מהדף" הרי שבכך "ציירנו" גם את הגרף של f^{-1} מבלי לעשות זאת.

כדאי להוסיף תמונה.

♣

המשפט נכון גם עבור מקטעים שאינם קטעים סגורים: תהא f פונקציה המוגדרת על מקטע I ויהי $y \in \text{Im} f$, אם נצמצם את f לקטע סגור I' כך ש- $f^{-1}(y) \in I'$ נקבל מהמשפט שהפונקציה ההופכית לפונקציה המצומצמת¹⁷ רציפה ב- y ומכיוון שזו האחרונה היא צמצום של f^{-1} נדע שגם f^{-1} היא רציפה ב- y שהרי רציפות היא תכונה מקומית.

הוכחה. ממשפט 7.2 נובע ש- f מונוטונית ממש ב- $[a, b]$, נניח בהג"כ ש- f עולה ממש ומכאן שע"פ משפט 7.3 מתקיים $\text{Im} f = [f(a), f(b)]$ ומהגדרה זהו התחום של f^{-1} . יהי $y \in [f(a), f(b)]$ ונשמך $0 < \varepsilon \in \mathbb{R}$ ונסמך:

$$x := f^{-1}(y)$$

$$x_1 := \max \{f^{-1}(y) - \varepsilon, a\}$$

$$x_2 := \min \{f^{-1}(y) + \varepsilon, b\}$$

$$\Rightarrow x \in [x_1, x_2] \subseteq [a, b]$$

מהמונוטוניות של f נובע שמתקיים:

$$f(a) \leq f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2) \leq f(b)$$

כלומר:

$$y = f(x) \in [f(x_1), f(x_2)] \subseteq [f(a), f(b)]$$

ומכאן שקיימת $0 < \delta \in \mathbb{R}$ כך שלכל $y' \in \text{Im} f$ המקיים $|y - y'| < \delta$ מתקיים $y' \in [f(x_1), f(x_2)]$ כלומר הסביבה הדלתאית המתאימה¹⁸ של y מוכלת ב- $[f(x_1), f(x_2)]$, תהא δ כנ"ל.

מהעובדה ש- f עולה ממש נובע שלכל $y' \in [f(a), f(b)]$ אם $f^{-1}(y') < x_1$ אז $y' = f(f^{-1}(y')) < f(x_1)$ ואם $x_2 < f^{-1}(y')$ אז $y' = f(f^{-1}(y')) > f(x_2)$; מכאן שלכל $y' \in [f(x_1), f(x_2)]$ מתקיים:

$$f^{-1}(y) - \varepsilon \leq x_1 \leq f^{-1}(y') \leq x_2 \leq f^{-1}(y) + \varepsilon$$

כלומר:

$$|f^{-1}(y') - f^{-1}(y)| < \varepsilon$$

■

ובפרט לכל $y' \in \text{Im} f$ המקיימת $|y - y'| < \delta$ מתקיים $|f^{-1}(y') - f^{-1}(y)| < \varepsilon$.

מסקנה 7.5. יהי $n \in \mathbb{N}$ ותהא $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה המוגדרת ע"י $f(x) := \sqrt[n]{x}$ לכל $x \in [0, \infty)$, היא פונקציה רציפה.

¹⁷כוונתי לפונקציה $(f|_{I'})^{-1}$ שהיא הופכית של f המצומצמת ל- I' .

¹⁸אם $y = f(x_1)$ אז מדובר בסביבה ימנית ואם $y = f(x_2)$ מדובר בסביבה שמאלית, אחרת מדובר בסביבה מלאה.

משפט 7.6. תהא f פונקציה מונוטונית והפיכה, f^{-1} היא פונקציה מונוטונית בעלת אותו סוג מונוטוניות, כלומר מתקיים אחד משני הפסוקים הבאים:

1. f עולה ממש ואז גם f^{-1} עולה ממש.

2. f עולה ממש ואז גם f^{-1} יורדת ממש.



גם כאן (כמו במשפטים רבים העוסקים בפונקציות הפיכות) עוזרת ההבחנה שהגרף של f^{-1} הוא שיקוף הגרף של f ביחס לאלכסון הראשי.

הוכחה. מטענה 7.1 נובע ש- f מונוטונית ממש, א"כ הוכחנו כבר חצי מהמשפט. נסמן את תחום ההגדרה של f ב- A ואת הטווח שלה ב- B , א"כ תחום ההגדרה של f^{-1} הוא B והטווח שלה הוא A . יהיו $y_1, y_2 \in B$ כך ש- $y_1 < y_2$ ונסמן $x_1 := f^{-1}(y_1)$ ו- $x_2 := f^{-1}(y_2)$ מהגדרה $x_1, x_2 \in A$ ומתקיים:

$$f(x_1) = y_1 < y_2 = f(x_2)$$

מכאן שאם f עולה ממש אז בהכרח:

$$f^{-1}(y_1) = x_1 < x_2 = f^{-1}(y_2)$$

ואם f יורדת ממש אז בהכרח:

$$f^{-1}(y_1) = x_1 > x_2 = f^{-1}(y_2)$$



מסקנה 7.7. יהי $n \in \mathbb{N}$ ותהא $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה המוגדרת ע"י $f(x) := \sqrt[n]{x}$ לכל $x \in [0, \infty)$, f היא פונקציה עולה ממש.

מסקנה 7.8. לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x} = \infty$ וכמו כן גם $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[n]{x} = 0$.

8 פונקציית האקספוננט, הלוגריתם הטבעי וחזקות ממשיות

8.1 הגדרות

הגדרה 8.1. כשלמדנו את נושא הסדרות ראינו שהסדרה $\left(1 + \frac{1}{n}\right)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת, נסמן:

$$e := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

על הקשר בין e לריבית דריבית (ציטוט מוויקיפדיה):



בחישובי ריבית דריבית e מהווה קבוע לחישוב החוב כעבור זמן מסוים או כעבור מספר מחזורים מסוים. הקבוע e נתגלה בידי

ברנולי יאקוב בעת ניתוח חישובי ריבית דריבית.

לדוגמה, אם אדם מפקיד בבנק סכום של שקל אחד (הקרן היא שקל אחד) ומקבל ריבית של 100% המחושבת אחת לשנה, הוא יצבור סכום של שני שקלים בסוף השנה. אם הבנק יחשב את הריבית מדי חצי שנה בריבית דריבית, כלומר ריבית של 50% בחצי הראשון של השנה שלאחריו יהיה בבנק שקל וחצי, וחישוב ריבית של 50% בחצי השני של השנה, הפעם 50% על שקל וחצי, שהם 50% על הקרן - השקל, ועוד 50% על הריבית שנצברה - חצי השקל שהתקבל בחלק הראשון של השנה. בתום החצי השני של השנה יהיו ברשותו 2.25 שקלים. אם חישוב הריבית יבוצע מדי רבע שנה, יסיים עם 2.44 שקלים. אם חישובי הריבית יבוצעו במרווחי הזמן הקטנים ביותר הסכום שיתקבל יתקרב ל- e כפול הקרן. בדוגמה שלנו הקרן הוא שקל אחד, ולכן בסוף השנה המפקיד יקבל מהבנק e שקלים לפי הנוסחה: $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ שהם בקירוב 2 שקלים ו-72 אגורות.

יהי $\alpha \in \mathbb{R}$ ותהא $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה המוגדרת ע"י $a_n := \left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^n$ (לכל $n \in \mathbb{N}$), נרצה להוכיח שהגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ קיים.

טענה. קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שהסדרה $(a_n)_{n=N}^{\infty}$ מונוטונית עולה.

טענה. $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ חסומה מלעיל.

מסקנה. $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת.

מסקנה. הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$ קיים לכל $x \in \mathbb{R}$.

הגדרה 8.2. נגדיר את פונקציית האקספוננט (נקראת גם הפונקציה האקספוננציאלית) $\exp : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ ע"י (לכל $x \in \mathbb{R}$):

$$\exp(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$$

מהגדרה $\exp(1) = e$ ו- $\exp(0) = 1$.



משפט. $\exp$ חחי"ע ועל ומכאן שהיא הפיכה.

הגדרה 8.3. נגדיר את פונקציית הלוגריתם הטבעי $\ln : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ע"י $\ln := \exp^{-1}$.

♣ מהגדרה $\ln(e) = 1$

למה. לכל $a \in \mathbb{R}$ וכל $0 < a$ וכל $q \in \mathbb{Q}$ מתקיים $\ln(a^q) = q \cdot \ln(a)$

מסקנה. לכל $a \in \mathbb{R}$ וכל $0 < a$ ולכל $q \in \mathbb{Q}$ מתקיים $\exp(q \cdot \ln(a)) = a^q$

♣ מסקנה זו מאפשרת לנו להגדיר חזקות במעריך ממשי בצורה שתתלכד עם הגדרת חזקות במעריך רציונלי.

הגדרה 8.4. חזקות ממשיות

לכל $a \in \mathbb{R}$ וכל $0 < a$ ולכל $x \in \mathbb{R}$ נגדיר $a^x := \exp(x \cdot \ln(a))$

♣ מהגדרה $e^x = \exp(x)$ לכל $x \in \mathbb{R}$

♣ נעיר שניתן להגדיר חזקה עם מעריך ממשי גם בצורה שהבאנו בקובץ ההגדרות של המספרים הממשיים, אלו הגדרות שקולות מפני שפונקציית האקספוננט רציפה והסופרמום המופיע בהגדרה הנ"ל הוא הגבול של $\exp(x \cdot \ln(a))$ בנקודה המתאימה.

מסקנה 8.5. לכל $a \in \mathbb{R}$ וכל $0 < a$ ולכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $a^x > 0$

מסקנה 8.6. לכל $a \in \mathbb{R}$ וכל $0 < a$, הפונקציה $f : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ היא פונקציה רציפה.

מסקנה 8.7. לכל $a \in \mathbb{R}$ וכל $0 < a$ ולכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $\ln(a^x) = x \cdot \ln(a)$

♣ בפרט לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $1^x = 1$

מסקנה. יהי $0 < a \in \mathbb{R}$ ונגדיר את הפונקציה $f : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ ע"י $f(x) = a^x$ (לכל $x \in \mathbb{R}$);

• אם $1 < a$ אז f עולה ממש.

• אם $a < 1$ אז f יורדת ממש.

• אם $a = 1$ אז f פונקציה קבועה ($f(x) = 1$ לכל $x \in \mathbb{R}$).

מכאן נסיק שאם $a \neq 1$ אז f חחי"ע ועל וממילא הפיכה.

הגדרה 8.8. לוגריתם בבסיס כללי

לכל $a \in \mathbb{R}$ וכל $0 < a$ השונה מ-1 נגדיר את הפונקציה $\log_a : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ להיות הפונקציה ההופכית לפונקציה המעתיקה את $x \in \mathbb{R}$ ל- a^x .

כלומר לכל $x, y \in \mathbb{R}$ מתקיים: $y = \log_a(x) \iff a^y = x$

♣ מהגדרה לכל $a \in \mathbb{R}$ וכל $0 < a$ השונה מ-1 מתקיים $\log_a(1) = 0$

♣ מהגדרה $\log_e = \ln$

מסקנה 8.9. לכל $a \in \mathbb{R}$ וכל $0 < a$ השונה מ-1 הפונקציה לוגריתמית $\log_a$ רציפה.

8.2 הגדרת האקספוננט

יהי $\alpha \in \mathbb{R}$ ותהא $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה המוגדרת ע"י $a_n := \left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^n$ (לכל $n \in \mathbb{N}$), נרצה להוכיח שהגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ קיים.

טענה 8.10. קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שהסדרה $(a_n)_{n=N}^{\infty}$ מונוטונית עולה.

הוכחה. יהי $N \in \mathbb{N}$ כך ש- $|\alpha| \leq N$.

יהי $n \in \mathbb{N}$, $N \leq n$

$$\begin{aligned} &\Rightarrow n > |\alpha| \\ &\Rightarrow -n < \alpha < n \\ &\Rightarrow -1 < \frac{\alpha}{n} < 1 \\ &\Rightarrow 0 < 1 + \frac{\alpha}{n} \end{aligned}$$

נסמן:

$$\begin{aligned} b_1 &:= b_2 := \dots b_n := 1 + \frac{\alpha}{n} > 0 \\ b_{n+1} &:= 1 > 0 \end{aligned}$$

מא"ש הממוצעים נובע שמתקיים:

$$\begin{aligned} \sqrt[n+1]{\left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^n \cdot 1} &= \sqrt[n+1]{\prod_{i=1}^{n+1} b_i} \leq \frac{1}{n+1} \cdot \sum_{i=1}^{n+1} b_i = \frac{n \cdot \left(1 + \frac{\alpha}{n}\right) + 1}{n+1} \\ &\Rightarrow \sqrt[n+1]{\left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^n} \leq \frac{n + \alpha + 1}{n+1} = 1 + \frac{\alpha}{n+1} \\ &\Rightarrow a_n = \left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^n \leq \left(1 + \frac{\alpha}{n+1}\right)^{n+1} = a_{n+1} \end{aligned}$$

n הנ"ל היה שרירותי ומכאן שהנ"ל נכון לכל $N \leq n \in \mathbb{N}$, כלומר $(a_n)_{n=N}^{\infty}$ היא סדרה מונוטונית עולה. ■

טענה 8.11. $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ חסומה מלעיל.

הוכחה. יהי $N \in \mathbb{N}$ כך ש- $|\alpha| \leq N$ ויהי $N \leq n \in \mathbb{N}$

נסמן:

$$\begin{aligned} b_1 &:= b_2 := \dots b_n := 1 + \frac{\alpha}{n} > 0 \\ b_{n+1} &:= b_{n+2} := \dots b_{n+N+1} := \frac{1}{N+1} > 0 \end{aligned}$$

שוב מא"ש הממוצעים נובע שמתקיים:

$$\begin{aligned} \sqrt[n+N+1]{\left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^n \cdot \frac{1}{(N+1)^{N+1}}} &= \sqrt[n+N+1]{\prod_{i=1}^{n+N+1} b_i} \leq \frac{1}{n+N+1} \cdot \sum_{i=1}^{n+N+1} b_i \\ &= \frac{n \cdot \left(1 + \frac{\alpha}{n}\right) + (N+1) \cdot \frac{1}{N+1}}{n+N+1} = \frac{n + \alpha + 1}{n+N+1} \leq 1 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^n \cdot \frac{1}{(N+1)^{N+1}} \leq 1$$

$$\Rightarrow a_n = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \leq (N+1)^{N+1}$$

n הנ"ל היה שרירותי ולכן הנ"ל מתקיים לכל $n \in \mathbb{N}$ ומכיוון שהקבוצה $\{a_n \mid n < N\}$ היא קבוצה סופית נדע שהיא חסומה וממילא גם $(a_n)_{n=1}^\infty$ חסומה. ■

מסקנה 8.12. $(a_n)_{n=1}^\infty$ מתכנסת.

מסקנה 8.13. הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$ קיים לכל $x \in \mathbb{R}$.

8.3 תכונות פונקציית האקספוננט

טענה 8.14. לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $\exp(x) > 0$.

הוכחה. לכל $x \in \mathbb{R}$ ולכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $|x| < n$:

$$\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n > 0$$

ומכאן שגם:

$$\exp(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n > 0$$

טענה 8.15. לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $\exp(x) \geq 1 + x$.

הוכחה. לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $|x| < n$ ומכאן שע"פ אי"ש ברנולי מתקיים גם:

$$\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \geq 1 + n \cdot \frac{x}{n} = 1 + x$$

למה 8.16. לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n^2}\right)^n = 1$$

הוכחה. יהי $x \in \mathbb{R}$ ותהא $(x_n)_{n=1}^\infty$ הסדרה המוגדרת ע"י $x_n := \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$ (לכל $n \in \mathbb{N}$). לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$\left(1 + \frac{x}{n^2}\right)^n = \sqrt[n]{\left(1 + \frac{x}{n^2}\right)^{n^2}} = \sqrt[n]{x_{n^2}}$$

ראינו שהסדרה $(x_n)_{n=1}^\infty$ מתכנסת ל- $\exp(x)$ שהוא מספר חיובי, אי"כ קיימים $m, M \in \mathbb{R}$ כך שלכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$m \leq x_{n^2} \leq M$$

יהיו m, M כנ"ל ומכאן שלכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$\sqrt[n]{m} \leq \sqrt[n]{x_{n^2}} \leq \sqrt[n]{M}$$

כשעסקנו בסדרות ראינו שלכל $q \in \mathbb{R}$ מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{q} = 1$ ומכאן שע"פ משפט הכריך מתקיים:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n^2}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_{n^2}} = 1$$

טענה 8.17. לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $\exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)}$.

הוכחה. יהי $x \in \mathbb{R}$, ראינו ש- $\exp(x) > 0$ ולכן הטענה שעלינו להוכיח שקולה לכך ש- $\exp(-x) \cdot \exp(x) = 1$. מהלמה (8.16) ומאריטמטיקה של גבולות נובע שמתקיים:

$$\begin{aligned}\exp(-x) \cdot \exp(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \cdot \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n = 1\end{aligned}$$

■

טענה 8.18. לכל $x, y \in \mathbb{R}$ מתקיים $\exp(x+y) = \exp(x) \cdot \exp(y)$.

הוכחה. יהיו $x, y \in \mathbb{R}$ ונחלק למקרים:

• נניח ש- $x, y \geq 0$, מכאן שלכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$0 < 1 + \frac{x+y}{n} \leq 1 + \frac{x+y}{n} + \frac{xy}{n^2} \leq 1 + \frac{x+y}{n} + \frac{xy}{n^2} + \frac{x+y}{n} \cdot \frac{xy}{n^2}$$

ומכאן שגם:

$$0 < 1 + \frac{x+y}{n} \leq \left(1 + \frac{x}{n}\right) \cdot \left(1 + \frac{y}{n}\right) \leq \left(1 + \frac{x+y}{n}\right) \cdot \left(1 + \frac{xy}{n^2}\right)$$

וממילא:

$$\left(1 + \frac{x+y}{n}\right)^n \leq \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \cdot \left(1 + \frac{y}{n}\right)^n \leq \left(1 + \frac{x+y}{n}\right)^n \cdot \left(1 + \frac{xy}{n^2}\right)^n$$

מאריטמטיקה של גבולות נקבל:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x+y}{n}\right)^n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{y}{n}\right)^n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x+y}{n}\right)^n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{xy}{n^2}\right)^n$$

כלומר:

$$\exp(x+y) \leq \exp(x) \cdot \exp(y) \leq \exp(x+y) \cdot 1$$

וממילא $\exp(x+y) = \exp(x) \cdot \exp(y)$.

• נניח שאחד מבין x ו- y שלילי ואילו האחר אי-שלילי, נחלק שוב למקרים ובהג"כ נניח כי $y < 0 \leq x$.

– אם $x+y \geq 0$ אז מהמקרה הקודם נובע שמתקיים:

$$\begin{aligned}\exp(x) &= \exp((x+y) + (-y)) = \exp(x+y) \cdot \exp(-y) = \frac{\exp(x+y)}{\exp(y)} \\ &\Rightarrow \exp(x) \cdot \exp(y) = \exp(x+y)\end{aligned}$$

– אם $x+y \leq 0$ אז $(-x) + (-y) \geq 0$ ומכיוון שהסימנים של $-x$ ו- $-y$ שונים נקבל מהמקרה הקודם שמתקיים:

$$\exp(-x) \cdot \exp(-y) = \exp(-(x+y))$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \frac{1}{\exp(x) \cdot \exp(y)} &= \frac{1}{\exp(x+y)} \\ \Rightarrow \exp(x+y) &= \exp(x) \cdot \exp(y)\end{aligned}$$

• נניח כעת ש- $x, y \leq 0$, א"כ $-x, -y \geq 0$ ולכן מהמקרה הראשון נובע שמתקיים:

$$\exp(-(x+y)) = \exp(-x) \cdot \exp(-y)$$

ומאותם נימוקים שבמקרה הקודם נקבל:

$$\exp(x+y) = \exp(x) \cdot \exp(y)$$

■

מסקנה 8.19. לכל $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ מתקיים:

$$\exp\left(\sum_{k=1}^n x_k\right) = \prod_{k=1}^n \exp(x_k)$$

טענה 8.20. לכל $q \in \mathbb{Q}$ מתקיים $\exp(q) = e^q$.

הוכחה. יהי $q \in \mathbb{Q}$ ויהיו $n \in \mathbb{N}$ ו- $m \in \mathbb{Z}$ כך ש- $q = \frac{m}{n}$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow \exp(m) &= \exp\left(\sum_{i=1}^m 1\right) = \prod_{i=1}^m \exp(1) = \prod_{i=1}^m e = e^m \\ \Rightarrow e &= \exp(1) = \exp\left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{n}\right) = \prod_{i=1}^n \exp\left(\frac{1}{n}\right) = \left(\exp\left(\frac{1}{n}\right)\right)^n \\ &= e^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{e} = \exp\left(\frac{1}{n}\right) \end{aligned}$$

מיחידות השורש נובע ש- $e^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{e} = \exp\left(\frac{1}{n}\right)$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow \exp(q) &= \exp\left(\frac{m}{n}\right) = \exp\left(\sum_{i=1}^m \frac{1}{n}\right) = \prod_{i=1}^m \exp\left(\frac{1}{n}\right) \\ &= \prod_{i=1}^m e^{\frac{1}{n}} = \left(e^{\frac{1}{n}}\right)^m = e^{\frac{m}{n}} = e^q \end{aligned}$$

■

למה 8.21. לכל $x \in (-1, 1)$ מתקיים:

$$1+x \leq \exp(x) \leq \frac{1}{1-x}$$

הוכחה. את אי-השוויון השמאלי כבר הוכחנו ומאותה סיבה מתקיים $\exp(-x) \geq 1-x$, ולכן:

$$\frac{1}{\exp(x)} = \exp(-x) \geq 1-x$$

כלומר:

$$\exp(x) \leq \frac{1}{1-x}$$

■

טענה 8.22. $\exp$ רציפה ב-0.

הוכחה. מאריתמטיקה של רציפות נובע שמתקיים:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} (1+x) &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1-x} &= 1 \end{aligned}$$

מכאן שע"פ הלמה (8.21) ומשפט הכריך מתקיים גם:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \exp(x) = 1 = \exp(0)$$

כלומר $\exp$ רציפה ב-0.

טענה 8.23. $\exp$ רציפה בכל $\mathbb{R}$.

הוכחה. יהי $a \in \mathbb{R}$, ראינו שלכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $\exp(a+x) = \exp(a) \cdot \exp(x)$ ולכן מהרציפות של $\exp$ ב-0 ומאריטמטיקה של רציפות נובע שמתקיים:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \exp(a+x) = \exp(a) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \exp(x) = \exp(a) \cdot 1 = \exp(a)$$

וממילא:

$$\lim_{x \rightarrow a} \exp(x) = \exp(a)$$

כלומר $\exp$ רציפה ב- a ומכיוון שהוא היה שרירותי נדע ש- $\exp$ רציפה בכל $\mathbb{R}$.

טענה 8.24. $\exp$ היא פונקציה עולה ממש.

הוכחה. יהיו $x, y \in \mathbb{R}$ כך ש- $x < y$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow \exp(y) &= \exp(x + (y-x)) = \exp(x) \cdot \exp(y-x) \\ &\geq \exp(x) \cdot (1 + y-x) > \exp(x) \end{aligned}$$

טענה 8.25. מתקיים:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \exp(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \exp(x) = 0$$

הוכחה. ראינו שלכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $\exp(x) \geq 1+x$, והרי $\lim_{x \rightarrow \infty} (1+x) = \infty$ ומכאן שע"פ כלל הפרוסה מתקיים $\lim_{x \rightarrow \infty} \exp(x) = \infty$. בנוסף ראינו שלכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים:

$$\exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \exp(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \exp(-x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\exp(x)} = 0$$

מסקנה 8.26. $\exp$ חח"ע ועל ומכאן שהיא הפיכה.

8.4 הלוגריתם הטבעי

טענה 8.27. ממשפט 7.6 נובע שגם $\ln$ עולה ממש.

טענה 8.28. לכל $0 < x, y \in \mathbb{R}$ מתקיים $\ln(x \cdot y) = \ln(x) + \ln(y)$.

הוכחה. יהיו $0 < x, y \in \mathbb{R}$ מתקיים:

$$\exp(\ln(x) + \ln(y)) = \exp(\ln(x)) \cdot \exp(\ln(y)) = x \cdot y$$

$$\Rightarrow \ln(x \cdot y) = \ln(\exp(\ln(x) + \ln(y))) = \ln(x) + \ln(y)$$

מסקנה 8.29. לכל $0 < x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ מתקיים:

$$\ln \left(\prod_{k=1}^n x_k \right) = \sum_{k=1}^n \ln(x_k)$$

למה 8.30. לכל $0 < a \in \mathbb{R}$ וכל $q \in \mathbb{Q}$ מתקיים $\ln(a^q) = q \cdot \ln(a)$.

הוכחה. יהי $0 < a \in \mathbb{R}$.

לכל $m \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$\ln(a^m) = \ln \left(\prod_{i=1}^m a \right) = \sum_{i=1}^m \ln(a) = m \cdot \ln(a)$$

ומכיוון שלכל $0 > m \in \mathbb{Z}$ מתקיים:

$$0 = \ln(1) = \ln(a^m \cdot a^{-m}) = \ln(a^m) + \ln(a^{-m})$$

נדע שמתקיים:

$$\ln(a^m) = -\ln(a^{-m}) = -(-m \cdot \ln(a)) = m \cdot \ln(a)$$

בנוסף מתקיים:

$$\ln(a^0) = \ln(1) = 0 = 0 \cdot \ln(a)$$

ולסיכום נוכל לומר שלכל $m \in \mathbb{Z}$ מתקיים $\ln(a^m) = m \cdot \ln(a)$.

מהנ"ל נובע שלכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$\ln(a) = \ln \left(\left(a^{\frac{1}{n}} \right)^n \right) = n \cdot \ln \left(a^{\frac{1}{n}} \right)$$

ומכאן שגם:

$$\ln \left(a^{\frac{1}{n}} \right) = \frac{1}{n} \cdot \ln(a)$$

כעת יהי $q \in \mathbb{Q}$ ויהיו $m \in \mathbb{Z}$ ו- $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $\frac{m}{n} = q$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow \ln(a^q) &= \ln \left(a^{\frac{m}{n}} \right) = \ln \left(\left(a^{\frac{1}{n}} \right)^m \right) = m \cdot \ln \left(a^{\frac{1}{n}} \right) \\ &= m \cdot \frac{1}{n} \cdot \ln(a) = \frac{m}{n} \cdot \ln(a) = q \cdot \ln(a) \end{aligned}$$

■

מסקנה 8.31. לכל $0 < a \in \mathbb{R}$ ולכל $q \in \mathbb{Q}$ מתקיים $\exp(q \cdot \ln(a)) = a^q$.

8.5 חזקות ממשיות ולוגריתמים בבסיסים שונים מ-e

משפט 8.32. חוקי חזקות כשהמעריך ממשי

יהיו $0 < a, b \in \mathbb{R}$, לכל $x, y \in \mathbb{R}$ מתקיימים כל הפסוקים הבאים:

$$1. \quad a^{x+y} = a^x \cdot a^y$$

$$2. \quad (a^x)^y = a^{x \cdot y}$$

$$3. \quad (a \cdot b)^x = a^x \cdot b^x$$

$$4. \quad \text{אם } 0 < a < b \text{ ו-} 0 < x < y \text{ אז } a^x < b^x, \text{ או } a^x > b^x \text{ ו-} 0 > x > y \text{ אז } a^x > b^x.$$

$$5. \quad \text{אם } 1 < a \text{ ו-} x < y \text{ אז } a^x < a^y.$$

$$6. \quad \text{אם } 0 < a < 1 \text{ ו-} x < y \text{ אז } a^x > a^y.$$

הוכחה. יהיו $x, y \in \mathbb{R}$.

1.

$$\begin{aligned} a^{x+y} &= \exp((x+y) \cdot \ln(a)) = \exp(x \cdot \ln(a) + y \cdot \ln(a)) \\ &= \exp(\ln(a^x) + \ln(a^y)) = \exp(\ln(a^x)) \cdot \exp(\ln(a^y)) = a^x \cdot a^y \end{aligned}$$

2.

$$(a^x)^y = \exp(y \cdot \ln(a^x)) = \exp(x \cdot y \cdot \ln(a)) = a^{x \cdot y}$$

3.

$$\begin{aligned} (a \cdot b)^x &= \exp(x \cdot \ln(a \cdot b)) = \exp(x \cdot (\ln(a) + \ln(b))) \\ &= \exp(x \cdot \ln(a) + x \cdot \ln(b)) \\ &= \exp(x \cdot \ln(a)) \cdot \exp(x \cdot \ln(b)) = a^x \cdot b^x \end{aligned}$$

4. נניח ש- $0 < a < b$ ומכאן ש- $\ln(a) < \ln(b)$.

• אם $0 < x$ אז $x \cdot \ln(a) < x \cdot \ln(b)$ ולכן גם $\exp(x \cdot \ln(a)) < \exp(x \cdot \ln(b))$, כלומר $a^x < b^x$.

• אם $0 > x$ אז $x \cdot \ln(a) > x \cdot \ln(b)$ ולכן גם $\exp(x \cdot \ln(a)) > \exp(x \cdot \ln(b))$, כלומר $a^x > b^x$.

5. נניח ש- $1 < a < y < x$, אי"כ $0 = \ln(1) < \ln(a) < \ln(y) < \ln(x)$ ולכן $x \cdot \ln(a) < y \cdot \ln(a)$ וממילא $\exp(x \cdot \ln(a)) < \exp(y \cdot \ln(a))$, כלומר $a^x < a^y$.

6. נניח ש- $0 < a < 1 < y < x$, אי"כ $0 = \ln(1) > \ln(a) > \ln(y) > \ln(x)$ ולכן $x \cdot \ln(a) > y \cdot \ln(a)$ וממילא $\exp(x \cdot \ln(a)) > \exp(y \cdot \ln(a))$, כלומר $a^x > a^y$.

■

מסקנה 8.33. יהי $0 < a \in \mathbb{R}$ ונגדיר את הפונקציה $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ ע"י $f(x) = a^x$ (לכל $x \in \mathbb{R}$);

• אם $1 < a$ אז f עולה ממש.

• אם $a < 1$ אז f יורדת ממש.

• אם $a = 1$ אז f פונקציה קבועה ($f(x) = 1$ לכל $x \in \mathbb{R}$).

מכאן נסיק שאם $a \neq 1$ אז f חח"ע ועל וממילא הפיכה.

מסקנה 8.34. יהי $0 < a \in \mathbb{R}$ שונה מ-1, אם $1 < a$ אז $\log_a$ עולה ממש ואם $a < 1$ אז $\log_a$ יורדת ממש.

מסקנה 8.35. יהי $0 < a \in \mathbb{R}$ שונה מ-1.

• אם $1 < a$ אז $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$ ו- $\lim_{x \rightarrow \infty} a^x = \infty$, וכמו כן $\lim_{x \rightarrow \infty} \log_a(x) = \infty$ ו- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a(x) = -\infty$.

• אם $a < 1$ אז $\lim_{x \rightarrow \infty} a^x = 0$ ו- $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = \infty$, וכמו כן $\lim_{x \rightarrow \infty} \log_a(x) = -\infty$ ו- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a(x) = \infty$.

טענה 8.36. לכל $0 < a \in \mathbb{R}$ השונה מ-1 ולכל $0 < x \in \mathbb{R}$ מתקיים:

$$\log_a(x) = \frac{\ln x}{\ln a}$$

הוכחה. יהי $0 < a \in \mathbb{R}$ שונה מ-1 ותהא $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ הפונקציה המוגדרת ע"י $f(x) = a^x$ (לכל $x \in \mathbb{R}$), א"כ f הפיכה ו- $\log_a$ היא ההופכית שלה.

לכל $0 < x \in \mathbb{R}$ מתקיים:

$$f\left(\frac{\ln x}{\ln a}\right) = a^{\frac{\ln x}{\ln a}} = \exp\left(\frac{\ln x}{\ln a} \cdot \ln(a)\right) = \exp(\ln(x)) = x$$

ומכאן שגם:

$$\log_a(x) = \log_a\left(f\left(\frac{\ln x}{\ln a}\right)\right) = \frac{\ln x}{\ln a}$$

■

משפט 8.37. חוקי לוגריתמים

יהיו $0 < a, b, c, d \in \mathbb{R}$ כך ש- a ו- b שונים מ-1, מתקיימים כל הפסוקים הבאים:

$$1. \log_b(c) = \frac{\log_a(c)}{\log_a(b)}$$

$$2. \log_a(c \cdot d) = \log_a(c) + \log_a(d)$$

$$3. \log_a\left(\frac{c}{d}\right) = \log_a(c) - \log_a(d)$$

$$4. \log_a(c^x) = x \cdot \log_a(c) \text{ מתקיים } x \in \mathbb{R} \text{ לכל}$$

הוכחה.

1.

$$\frac{\log_a(c)}{\log_a(b)} = \left(\frac{\ln c}{\ln a}\right) \cdot \left(\frac{\ln b}{\ln a}\right)^{-1} = \frac{\ln c}{\ln b} = \log_b(c)$$

2.

$$\log_a(c) + \log_a(d) = \frac{\ln c + \ln d}{\ln a} = \frac{\ln(c \cdot d)}{\ln a} = \log_a(c \cdot d)$$

3.

$$\begin{aligned} \log_a(c) - \log_a(d) &= \log_a(c) + (-1) \cdot \log_a(d) \\ &= \frac{\ln c - \ln d}{\ln a} = \frac{\ln c + \ln(d^{-1})}{\ln a} \\ &= \frac{\ln(c \cdot d^{-1})}{\ln a} = \frac{\ln\left(\frac{c}{d}\right)}{\ln a} = \log_a\left(\frac{c}{d}\right) \end{aligned}$$

4. יהי $x \in \mathbb{R}$,

$$\Rightarrow x \cdot \log_a(c) = x \cdot \frac{\ln c}{\ln a} = \frac{x \cdot \ln c}{\ln a} = \frac{\ln(c^x)}{\ln a} = \log_a(c^x)$$

■

9 רציפות במידה שווה

9.1 הגדרות

הגדרה 9.1. תהא f פונקציה המוגדרת על מקטע I , נאמר ש- f רציפה במידה שווה (להלן גם: רציפה במ"ש) על I אם לכל $0 < \varepsilon \in \mathbb{R}$ קיימת $0 < \delta \in \mathbb{R}$ כך שלכל $x_1, x_2 \in I$ המקיימים $|x_1 - x_2| < \delta$ מתקיים $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.


♣

בכל פעם שאנו רוצים למצוא גבול של פונקציה עלינו למצוא לכל $0 < \varepsilon$ את הסביבה הדלתאית שבה כל האיברים המדוברים קרובים לגבול עד כדי ε , אך כיצד נבחר את התחום המתאים? כמובן שע"פ ה- ε הנתון (יהי $0 < \varepsilon \dots$), בד"כ הבחירה תהיה תלויה בנקודה שבה אנו רוצים להוכיח את קיום הגבול ותדרוש חישובים מסובכים אך לפעמים הבחירה תהיה קלה מאוד: לדוגמה עבור פונקציה ליניארית יספיק תמיד לבחור ב- $\delta := \frac{\varepsilon}{|m|}$ כאשר m הוא שיפוע הפונקציה ולא משנה באיזו נקודה מדובר; רציפות במידה שווה אומרת בדיוק את הדבר הזה, ה- δ תלויה אך ורק ב- ε ולא בנקודה. הנה **מאמר** נהדר של אמיר חדאיו שמטיב להסביר את הרעיון.

¹⁹ניתן להסיק מכאן (באינדוקציה) גם ליותר משני מוכפלים.




עבור פונקציה רציפה במידה שווה לכל $0 < \varepsilon \in \mathbb{R}$ קיימת $0 < \delta \in \mathbb{R}$ כך שלכל נקודה בתחום הגרף בסביבה הדלתאית שלה נכנס למלבן באורך 2ε וברוחב של 2δ שמרכזו בנקודה.



איור 1: פונקציה רציפה במידה שווה



עבור פונקציה שאינה רציפה במידה שווה קיים $0 < \varepsilon \in \mathbb{R}$ כך שלכל $0 < \delta \in \mathbb{R}$ קיימת נקודה בתחום שהגרף בסביבה הדלתאית שלה אינו נכנס למלבן באורך 2ε וברוחב של 2δ שמרכזו בנקודה.



איור 2: פונקציה שאינה רציפה במידה שווה

מקור: שתי התמונות הנ"ל נלקחו מוויקישיתוף (ראו **כאן** ו**כאן**) והן מופיעות כאן ברישיון **CC BY-SA 4.0**.

צריך להוסיף הוכחות בפרק זה.

תהא f פונקציה המוגדרת על מקטע $I \subseteq \mathbb{R}$.

טענה 9.2. אם f רציפה במידה שווה על I אז f רציפה במידה שווה על כל מקטע $J \subseteq I$.

משפט 9.3. אם f רציפה במידה שווה על I אז f גם רציפה ב- I .

משפט 9.4. אם f רציפה במידה שווה על I אז לכל סדרה מתכנסת $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ שכל איבריה ב- I גם הסדרה $(f(a_n))_{n=1}^{\infty}$ היא סדרה מתכנסת.



שימו לב: העובדה ש- $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת ושכל איבריה ב- I אינה אומרת שגם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ נמצא ב- I , מסיבה זו המשפט אינו נכון לכל פונקציה רציפה.

לדוגמה: הפונקציה $f(x) = \frac{1}{x}$ רציפה בקטע $(0, 1]$ ו- $a_n = \frac{1}{n}$ היא סדרה מתכנסת שכל איבריה ב- $(0, 1]$ אך $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = \infty$.

משפט 9.5. "אפיון היינה" לרציפות במידה שווה של פונקציה

f רציפה במידה שווה על I אם ורק אם לכל שתי סדרות $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ ו- $(y_n)_{n=1}^{\infty}$ שכל איבריהן ב- I המקיימות $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - y_n| = 0$ מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_n) - f(y_n)| = 0$.

משפט 9.6. אריתמטיקה של רציפות במידה שווה

נניח ש- f רציפה במידה שווה על I ותהא g גם היא פונקציה רציפה במידה שווה על I (ובפרט מוגדרת בו).

1. $f + g$ רציפה במידה שווה על I .

2. אם f ו- g חסומות ב- I אז $f \cdot g$ רציפה במידה שווה על I .

3. אם קיים $0 < c \in \mathbb{R}$ כך ש- $|g(x)| \geq c$ לכל $x \in I$ אז $\frac{1}{g}$ רציפה במידה שווה על I .

4. אם f חסומה ב- I וגם קיים $0 < c \in \mathbb{R}$ כך ש- $|g(x)| \geq c$ לכל $x \in I$ אז $\frac{f}{g}$ רציפה במידה שווה על I .

משפט 9.7. נניח ש- f רציפה במידה שווה על I ותהא $g : \text{Im} f \rightarrow \mathbb{R}$ גם היא פונקציה רציפה במידה שווה על $\text{Im} f$,²⁰ גם הפונקציה $g \circ f$ רציפה במידה שווה על I .

משפט 9.8. נניח ש- I הוא קטע פתוח ויהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $I = (a, b)$, אם f רציפה במידה שווה על I אז הגבולות $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ ו- $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ קיימים.

מסקנה 9.9. "משפט וירשטראס" לרציפות במידה שווה

נניח ש- I הוא קטע פתוח, אם f רציפה במידה שווה על I אז f חסומה ב- I .

מסקנה 9.10. נניח ש- f רציפה במידה שווה על I ,

• אם $I = (a, \infty)$ (עבור $a \in \mathbb{R}$ כלשהו) אז הגבול $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ קיים.

• אם $I = (-\infty, a)$ (עבור $a \in \mathbb{R}$ כלשהו) אז הגבול $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ קיים.

משפט 9.11. תהא $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה, אם ל- g יש אסימפטוטות משופעות ב- $\pm\infty$ אז g רציפה במידה שווה על כל $\mathbb{R}$.

מסקנה 9.12. נניח ש- f רציפה ב- I ,

• אם I היא קרן ימנית ול- f יש אסימפטוטה משופעת ב- ∞ אז f רציפה במידה שווה על I .

• אם I היא קרן שמאלית ול- f יש אסימפטוטה משופעת ב- $-\infty$ אז f רציפה במידה שווה על I .

משפט 9.13. משפט קנטור

נניח ש- I הוא קטע סגור, אם f רציפה ב- I אז f רציפה במידה שווה על I .

²⁰מהעובדה ש- I הוא מקטע ו- f רציפה (משפט 9.3) נובע שגם $\text{Im} f$ הוא מקטע.

הוכחה. נניח ש- f רציפה ב- I ונניח בשלילה ש- f אינה רציפה במ"ש על I , א"כ קיים $0 < \varepsilon \in \mathbb{R}$ וקיימות שתי סדרות $(x_n)_{n=1}^\infty$ ו- $(y_n)_{n=1}^\infty$ כך שמתקיים $|x_n - y_n| < \frac{1}{n}$ וגם $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon$ לכל $n \in \mathbb{N}$; יהי ε ושתי סדרות $(x_n)_{n=1}^\infty$ ו- $(y_n)_{n=1}^\infty$ כנ"ל. ע"פ משפט בולצאנו-ויירשטראס יש ל- $(x_n)_{n=1}^\infty$ תת-סדרה $(x_{n_k})_{k=1}^\infty$ מתכנסת²¹, תהא $(n_k)_{k=1}^\infty$ סדרת אינדקסים עולה ממש כך ש- $(x_{n_k})_{k=1}^\infty$ מתכנסת ונסמן את גבולה ב- x_0 .

מהעובדה שלכל $k \in \mathbb{N}$ מתקיים $|x_{n_k} - y_{n_k}| < \frac{1}{n_k}$ נובע שגם הסדרה $(y_{n_k})_{k=1}^\infty$ מתכנסת ל- x_0 . בנוסף, מהעובדה שכל איברי $(x_{n_k})_{k=1}^\infty$ נמצאים בקטע הסגור I נובע שגם $x_0 \in I$ ²². מרציפות של f ומאפיון היינה לרציפות נובע כי:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(y_{n_k}) = f(x_0)$$

ולכן מאריתמטיקה של גבולות נובע שמתקיים:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| = 0$$

וזאת בסתירה לכך שלכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon$ ובפרט לכל $k \in \mathbb{N}$ מתקיים $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \geq \varepsilon$. מכאן שהנחת השלילה אינה נכונה ו- f רציפה במ"ש על I . ■

טענה 9.14. יהיו $I_1, I_2, \dots, I_n \subseteq \mathbb{R}$ מקטעים, נסמן $A := I_1 \cup I_2 \cup \dots \cup I_n$ ותהא g פונקציה המוגדרת ב- A , אם לכל $n \geq k \in \mathbb{N}$ הפונקציה g רציפה במידה שווה על I_k אז g רציפה במידה שווה על A ²³.

מסקנה 9.15. תהא $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה, אם g מחזורית ורציפה אז g רציפה במידה שווה על כל $\mathbb{R}$.

משפט 9.16. תנאי ליפשיץ²⁴

אם קיים $K \in \mathbb{R}$ כך שלכל $x_1, x_2 \in I$ שונים זה מזה ($x_1 \neq x_2$) מתקיים $\left| \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \right| \leq K$ אז f רציפה במידה שווה על I .

תנאי ליפשיץ הוא תנאי מספיק לרציפות במידה שווה אך אינו תנאי הכרחי, לדוגמה הפונקציה המעתיקה את x ל- $\sqrt{x}$ בקטע $[0, 1]$ היא פונקציה רציפה במידה שווה מפני שהיא פונקציה רציפה על קטע סגור²⁵ אך לכל $K \in \mathbb{R}$ $0 < K$ קיים $x \in [0, 1]$ כך שמתקיים:

$$\left| \frac{\sqrt{x} - \sqrt{0}}{x - 0} \right| = \frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}} > K$$

הוכחה. יהי K כנ"ל (אם אין K כזה אז המשפט מתקיים באופן ריק, מהגדרה $K \geq 0$).

יהי $0 < \varepsilon \in \mathbb{R}$ ונבחר $\delta := \frac{\varepsilon}{K}$, א"כ $K \cdot \delta = \varepsilon$.

יהיו $x_1, x_2 \in I$ כך ש- $|x_1 - x_2| < \delta$, אם $x_1 = x_2$ אז ודאי שמתקיים $|f(x_1) - f(x_2)| = 0 < \varepsilon$ ולכן נוכל לעסוק רק במקרה שבו $x_1 \neq x_2$.

$$\Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| \leq K \cdot |x_1 - x_2| < K \cdot \delta = \varepsilon$$

■

מסקנה 9.17. אם f גזירה ב- I ²⁶ ו- f' חסומה ב- I אז f רציפה במידה שווה על I .

²¹הסדרה $(x_n)_{n=1}^\infty$ חסומה מכיוון שכל איבריה בקטע I .

²²הטענה הזו אינה נכונה לו היה מדובר בקטע פתוח או חצי פתוח.

²³לשם כך נגדיר רציפות במידה שווה על איחוד מקטעים בצורה הבאה: g תיקרא רציפה במידה שווה על A אם לכל $0 < \varepsilon \in \mathbb{R}$ קיימת $0 < \delta \in \mathbb{R}$ כך

שלכל $x_1, x_2 \in A$ המקיימים $|x_1 - x_2| < \delta$ מתקיים $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

שימו לב לכך שאם A היא מקטע בעצמה (בנוסף לכך שהיא איחוד מקטעים) אז ההגדרה מתלכדת עם ההגדרה הרגילה.

²⁴ערך בוויקיפדיה: ליפשיץ רדולף, ראו גם ליפשיץ תנאי.

²⁵ראו את משפט קנטור להלן.

²⁶אם I סגור באחד הקצוות או מדובר בגזירות חד-צדדית בקצה כזה.