

טופולוגיה קבוצתית

מבוא לטופולוגיה - חלק ראשון

נכתב ע"י שריה אנסבכר

תוכן העניינים

2	1	התחלה
3	2	קבוצות במרחב טופולוגי
4	3	בסיסים
5	4	פונקציות
5	4.1	רציפות
6	4.2	הומיאומורפיזמים
7	5	מרחבי מכפלה
8	6	אקסיומות ההפרדה
8	6.1	רגולריות ונורמליות
8	6.2	האקסיומות והשלכותיהן
8	6.3	דוגמאות לכך שאין שקילות בין אקסיומות ההפרדה
9	7	מסננים
10	8	קומפקטיות
10	8.1	קומפקטיפיקציה
11	9	אקסיומות המנייה
12	10	קשירות
12	10.1	קשירות רגילה
12	10.2	קשירות מסילתית
12	10.3	קשירות מקומית וקשירות מסילתית מקומית

תודתי נתונה לגלעד שרם על הסיכום המצוין שלו, נעזרתי בו רבות בכתיבת הסיכום שלפניכם.

לסיכומים נוספים היכנסו לאתר:

אקסיומת השלמות - סיכומי הרצאות במתמטיקה

<https://math.srayaa.com>

1 התחלה



כשעסקנו במרחבים מטריים ראינו שהקבוצות הפתוחות מקיימות את שלוש התכונות הבאות:

1. המרחב כולו והקבוצה הריקה הם קבוצות פתוחות.
2. כל איחוד של קבוצות פתוחות הוא קבוצה פתוחה.
3. כל חיתוך סופי של קבוצות פתוחות הוא קבוצה פתוחה.

נראה כעת שבעזרת שלוש התכונות הללו ניתן להכליל את הרעיון של קבוצה פתוחה במקרה שבו אין מטריקה.

הגדרה 1.1. טופולוגיה

תהא $\mathbb{X}$ קבוצה לא ריקה, ותהא $\tau \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{X})$ משפחה של תתי-קבוצות של $\mathbb{X}$. נאמר ש- τ היא טופולוגיה על $\mathbb{X}$, אם מתקיימות שלוש התכונות הבאות:

1. $\emptyset, \mathbb{X} \in \tau$.
2. סגורה לאיחודים - לכל אוסף $\mathcal{S} \subseteq \tau$ מתקיים $\bigcup_{U \in \mathcal{S}} U \in \tau$.
3. סגורה לחיתוכים סופיים - לכל אוסף סופי $\mathcal{S} \subseteq \tau$ מתקיים $\bigcap_{U \in \mathcal{S}} U \in \tau$ ¹.

דוגמה 1.2. על כל קבוצה לא ריקה $\mathbb{X}$ ניתן להגדיר שתי טופולוגיות פשוטות:

- הטופולוגיה הטריווילית - $\{\emptyset, \mathbb{X}\}$
- הטופולוגיה הדיסקרטית - $\mathcal{P}(\mathbb{X})$

הגדרה 1.3. תהיינה τ ו- σ שתי טופולוגיות על קבוצה לא ריקה $\mathbb{X}$. נאמר ש- τ עדינה / חזקה יותר מ- σ , ו- σ גסה / חלשה יותר מ- σ , אם $\sigma \subseteq \tau$.



הרעיון הוא שככל שטופולוגיה עדינה יותר כך היא מיטיבה "להבחין" בין שתי נקודות שונות, כאשר "להבחין" פירושו שיש בטופולוגיה קבוצה שמבדילה בין שתי הנקודות (אחת מהן שייכת לה והאחרת איננה כזו). בהמשך הקורס נעסוק ביכולת של טופולוגיה להבחין בין נקודות ביתר פירוט.

הגדרה 1.4. מרחב טופולוגי

מרחב טופולוגי (להלן גם מ"ט) הוא זוג סדור $(\mathbb{X}, \tau)$ כאשר τ היא טופולוגיה על קבוצה לא ריקה $\mathbb{X}$, האיברים של $\mathbb{X}$ ייקראו לעיתים קרובות נקודות, ואילו איברי τ ייקראו קבוצות פתוחות.

סימון: לכל מרחב טופולוגי $(\mathbb{X}, \tau)$ ולכל תת-קבוצה $S \subseteq \mathbb{X}$ נסמן $\tau|_A := \{A \cap U : U \in \tau\}$.

הגדרה 1.5. תת-מרחב טופולוגי

יהי $(\mathbb{X}, \tau)$ מרחב מטרי ותהא $A \subseteq \mathbb{X}$, הזוג הסדור $(A, \tau|_A)$ נקרא תת-מרחב טופולוגי של $(\mathbb{X}, \tau)$.



כמובן שהרעיון הוא ש- (Y, d_Y) הוא מרחב מטרי עם אותה מטריקה.

טענה 1.6. אוסף הקבוצות הפתוחות של מרחב מטרי הוא טופולוגיה על המרחב.

הגדרה 1.7. אוסף הקבוצות הפתוחות של מרחב מטרי ייקרא הטופולוגיה המושרית ע"י המטריקה המתאימה.

הגדרה 1.8. מרחב טופולוגי ייקרא מטריזבילי אם קיימת מטריקה המשרה את הטופולוגיה שלו.

¹תכונה זו שקולה לכך שלכל $U, V \in \tau$ מתקיים $U \cap V \in \tau$.

2 קבוצות במרחב טופולוגי

יהי $(\mathbb{X}, \tau)$ מרחב טופולוגי.

תזכורת: A^c היא הקבוצה המשלימה של A , כלומר $A^c = \mathbb{X} \setminus A$ (כמובן שהסימון תלוי הקשר משום שהוא תלוי בשאלה מיהי $\mathbb{X}$).

2.1 הגדרה נקודות פנימיות, נקודות חיצוניות ונקודות קצה

תהא $A \subseteq \mathbb{X}$ תת-קבוצה, ותהא $x \in \mathbb{X}$ נקודה.

- נאמר ש- x היא נקודה פנימית של A , אם קיימת קבוצה פתוחה $U \subseteq \mathbb{X}$, כך ש- $x \in U \subseteq A$.
- נאמר ש- x היא נקודה חיצונית ל- A , אם קיימת קבוצה פתוחה $U \subseteq \mathbb{X}$, כך ש- $x \in U \subseteq A^c$.
- נאמר ש- x היא נקודת קצה של A , אם לכל קבוצה פתוחה $U \subseteq \mathbb{X}$, קיימים $x_1, x_2 \in U$ כך ש- $x_1 \in A$ ו- $x_2 \notin A$.
- נאמר ש- x היא נקודת הצטברות של A , אם לכל קבוצה פתוחה $U \subseteq \mathbb{X}$ כך ש- $x \in U$ קיימת נקודה $a \in A$ כך ש- $a \neq x$.

לא ראינו את ההגדרה שלעיל בכיתה.

2.2 הגדרה נאמר שתת-קבוצה $C \subseteq \mathbb{X}$ היא קבוצה סגורה אם היא כוללת כל נקודה שאינה חיצונית לה.

♣ קבוצה יכולה להיות גם פתוחה וגם סגורה, וכמובן שיכולות להיות קבוצות שאינן פתוחות ואינן סגורות.

לא ראינו את ההגדרה שלעיל בכיתה, אלא הגדרנו מהי קבוצה סגורה ע"פ המסקנה הבאה.

2.3 מסקנה תת-קבוצה $A \subseteq \mathbb{X}$ היא סגורה אם"ם A^c היא קבוצה פתוחה.

2.4 מסקנה אוסף הקבוצות הסגורות מקיים את שלוש התכונות הבאות:

1. $\emptyset$ ו- $\mathbb{X}$ הן קבוצות סגורות.
2. סגירות לחיתוכים - לכל אוסף $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{X})$ של קבוצות סגורות, הקבוצה $\bigcap_{C \in \mathcal{S}} C$ היא קבוצה סגורה.
3. סגירות לאיחודים סופיים - לכל אוסף סופי $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{X})$ של קבוצות סגורות, הקבוצה $\bigcup_{C \in \mathcal{S}} C$ היא קבוצה סגורה.

2.5 הגדרה

- קבוצת הנקודות הפנימיות של תת-קבוצה $A \subseteq \mathbb{X}$ תיקרא הפנים של A , ותסומן ב- A° או ב- $\text{Int}(A)$.
- קבוצת הנקודות החיצוניות לתת-קבוצה $A \subseteq \mathbb{X}$ תיקרא החוץ של A , ותסומן ב- $\text{Ext}(A)$.
- קבוצת נקודות הקצה של תת-קבוצה $A \subseteq \mathbb{X}$ תיקרא השפה של A , ותסומן ב- ∂A .
- קבוצת נקודות ההצטברות של תת-קבוצה A תסומן ב- A' .
- קבוצת כל הנקודות שאינן חיצוניות לתת-קבוצה $A \subseteq \mathbb{X}$ תיקרא הסגור של A ותסומן ב- $\bar{A}$ או ב- $\text{Cl}(A)$.

לא ראינו את ההגדרה שלעיל בכיתה, אלא הגדרנו את הפנים והסגור לפי המסקנה הבאה, ואת השפה ע"פ המסקנה שלאחריה.

2.6 מסקנה הפנים של קבוצה הוא איחוד כל הקבוצות הפתוחות המוכללות בה, ואילו הסגור של קבוצה הוא חיתוך כל הקבוצות הסגורות שמכילות אותה.

♣ כלומר A° הוא הקבוצה הפתוחה הכי גדולה שמוכללת ב- A , ו- $\bar{A}$ הוא הקבוצה הסגורה הכי קטנה שמכילה את A .

2.7 מסקנה לכל $A \subseteq \mathbb{X}$ מתקיים:

$$\begin{aligned}\bar{A} &= A^\circ \cup \partial A = A \cup A' \\ \partial A &= \bar{A} \setminus A^\circ \\ \mathbb{X} &= \text{Int}(A) \cup \partial A \cup \text{Ext}(A) \\ &= \text{Cl}(A) \cup \text{Ext}(A)\end{aligned}$$

מסקנה 2.8. לכל שתי קבוצות $A, B \subseteq \mathbb{X}$ מתקיים:

$$\begin{aligned}\overline{A \cup B} &= \overline{A} \cup \overline{B} & (A \cap B)^\circ &= A^\circ \cap B^\circ \\ \overline{A \cap B} &\subseteq \overline{A} \cap \overline{B} & A^\circ \cap B^\circ &\subseteq (A \cup B)^\circ\end{aligned}$$

הגדרה 2.9. תת-קבוצה $A \subseteq \mathbb{X}$ תיקרא צפופה אם לכל קבוצה פתוחה $U \subseteq \mathbb{X}$ מתקיים $U \cap A \neq \emptyset$.

מסקנה 2.10. תת-קבוצה $A \subseteq \mathbb{X}$ היא צפופה אם $\overline{A} = \mathbb{X}$.

3 בסיסים



כשעסקנו במרחבים מטריים ראינו שקבוצה היא פתוחה אם ניתן להציג אותה כאיחוד של כדורים פתוחים, מייד נראה שניתן להכליל זאת גם עבור מרחבים טופולוגיים.

תהא $\mathbb{X}$ קבוצה לא ריקה.

הגדרה 3.1. תהא τ טופולוגיה על $\mathbb{X}$. נאמר שמשפחה של קבוצות פתוחות $\mathcal{B} \subseteq \tau$ היא בסיס לטופולוגיה τ , ו- τ מושרית ע"י הבסיס $\mathcal{B}$, אם כל קבוצה פתוחה ניתנת להצגה כאיחוד של קבוצות מ- $\mathcal{B}$.

זו לא ההגדרה שראינו בכיתה, אבל ראינו שזוהי הגדרה שקולה.

מסקנה 3.2. קבוצת כל הכדורים הפתוחים במרחב מטרי τ היא בסיס לטופולוגיה המושרית ע"י המטריקה.

הגדרה 3.3. יהי $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{X})$ אוסף תתי-קבוצות של $\mathbb{X}$, נאמר ש- $\mathcal{B}$ הוא בסיס של $\mathbb{X}$ אם מתקיימות שתי התכונות הבאות:

1. לכל $x \in \mathbb{X}$ קיימת $B \in \mathcal{B}$ כך ש- $x \in B$ (כלומר $\mathbb{X} = \bigcup_{B \in \mathcal{B}} B$).

2. לכל $A, B \in \mathcal{B}$ ולכל $x \in A \cap B$ קיימת $C \in \mathcal{B}$ כך ש- $C \subseteq A \cap B$ ו- $x \in C$.

סימון: לכל $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{X})$ נסמן $\tau_{\mathcal{B}} := \left\{ U \subseteq \mathbb{X} \mid \forall x \in U \exists B \in \mathcal{B} x \in B \subseteq U \right\}$.

מסקנה 3.4. לכל $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{X})$ ולכל $U \in \tau_{\mathcal{S}}$ קיים אוסף $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{B}$ כך ש- $U = \bigcup_{B \in \mathcal{S}} B$.

משפט 3.5. יהי $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{X})$ אוסף תתי-קבוצות של $\mathbb{X}$. אם $\mathcal{B}$ הוא בסיס של $\mathbb{X}$, אז $\tau_{\mathcal{B}}$ היא טופולוגיה על $\mathbb{X}$, ו- $\mathcal{B}$ הוא בסיס לטופולוגיה $\tau_{\mathcal{B}}$.

דוגמה 3.6. האוסף $\left\{ a + d \cdot \mathbb{Z} \mid a, d \in \mathbb{Z} \right\}$ הוא בסיס של $\mathbb{Z}$.



נסמן $\mathcal{E} := \left\{ a + d \cdot \mathbb{Z} \mid a, d \in \mathbb{Z} \right\}$, ונוכיח מתכונות הטופולוגיה $(\mathbb{Z}, \tau_{\mathcal{E}})$ שישנם אין-סוף מספרים ראשוניים.

• כל קבוצה ב- $\mathcal{E}$ היא קבוצה סגורה שכן לכל $a, d \in \mathbb{Z}$ מתקיים:

$$\mathbb{Z} \setminus (a + d \cdot \mathbb{Z}) = \bigcup_{i=1}^{d-1} (a + (d+i) \cdot \mathbb{Z})$$

מכאן שאיחוד סופי של קבוצות מ- $\mathcal{E}$ הוא קבוצה סגורה.

• לכל $m \in \mathbb{Z} \setminus \{1, -1\}$ קיים $p \in \mathbb{Z}$ ראשוני כך ש- $p \cdot \mathbb{Z} \subseteq m \cdot \mathbb{Z}$, מכאן שמתקיים:

$$\mathbb{Z} \setminus \{1, -1\} = \bigcup_{p \in \text{Prime}} p \cdot \mathbb{Z}$$

ולכן אם יש מספר סופי של ראשוניים אז $\mathbb{Z} \setminus \{1, -1\}$ היא קבוצה סגורה, וממילא $\{1, -1\}$ פתוחה. אבל אנחנו יודעים ש- $\{1, -1\}$ אינה פתוחה, שהרי אין ב- $\mathcal{E}$ קבוצה המוכללת ב- $\{1, -1\}$, ומכאן שיש אין-סוף ראשוניים.

²ניתן להחליף קבוצה זו בקבוצת כל הכדורים עם רדיוס רציונלי / מהצורה $\frac{1}{n}$.

4 פונקציות

יהיו $(\mathbb{X}, \tau)$ ו- $(\mathbb{Y}, \sigma)$ מרחבים טופולוגיים.

4.1 רציפות

הגדרה 4.1. תהא $f : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{Y}$ פונקציה.

• נאמר ש- f רציפה בנקודה $x \in \mathbb{X}$ אם לכל קבוצה פתוחה $U \subseteq \mathbb{Y}$ כך ש- $f(x) \in U$, קיימת קבוצה פתוחה $V \subseteq \mathbb{X}$ כך ש- $x \in V$ ו- $f(V) \subseteq U$.

• נאמר ש- f רציפה אם היא רציפה בכל נקודה ב- $\mathbb{X}$.

♣ כמובן שהגדרה זו מכילה את הרציפות שהגדרנו במרחבים מטריים.

בכיתה לא הגדרנו כלל רציפות בנקודה, והגדרנו רציפות ע"י התנאי השני בטענה שלהלן.

הגדרה 4.2. קבוצה $A \subseteq \mathbb{X}$ תיקרא סביבה של נקודה $x \in \mathbb{X}$, אם קיימת קבוצה פתוחה $U \subseteq \mathbb{X}$ כך ש- $x \in U \subseteq A$.

טענה 4.3. תהא $f : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{Y}$ פונקציה, התנאים הבאים שקולים:

• f רציפה.

• לכל קבוצה פתוחה $U \subseteq \mathbb{Y}$ גם $f^{-1}(U)$ פתוחה.

• לכל קבוצה סגורה $C \subseteq \mathbb{Y}$ גם $f^{-1}(C)$ סגורה.

• לכל $x \in \mathbb{X}$, ולכל סביבה $W \subseteq \mathbb{Y}$ של $f(x)$, הקבוצה $f^{-1}(W)$ היא סביבה של x .

• לכל תת-קבוצה $A \subseteq \mathbb{X}$ מתקיים $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$.

• לכל בסיס $\mathcal{B}$ של σ , ולכל $B \in \mathcal{B}$, הקבוצה $f^{-1}(B)$ היא קבוצה פתוחה.

• קיים תת-בסיס $\mathcal{B}$ של σ , ולכל $B \in \mathcal{B}$, הפונקציה $f|_B$ רציפה.

• לכל n קבוצות סגורות $C_1, C_2, \dots, C_n \subseteq \mathbb{X}$ כך ש- $\mathbb{X} = \bigcup_{i=1}^n C_i$, ולכל $n \geq i \in \mathbb{N}$, הפונקציה $f|_{C_i}$ רציפה.

מסקנה 4.4. הרכבה של פונקציות רציפות היא פונקציה רציפה.

מסקנה 4.5. תהא $f : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{Y}$ פונקציה, ותהיינה τ^+ ו- σ^- טופולוגיות על $\mathbb{X}$ ו- $\mathbb{Y}$ בהתאמה. אם τ^+ עדינה יותר מ- τ ($\tau \subseteq \tau^+$) ו- σ^- גסה יותר מ- σ ($\sigma^- \subseteq \sigma$), אז f רציפה גם כפונקציה בין המרחבים הטופולוגיים $(\mathbb{X}, \tau^+)$ ו- $(\mathbb{Y}, \sigma^-)$.

משפט 4.6. למת ההדבקה

תהא $f : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{Y}$ פונקציה; אם קיימות שתי קבוצות סגורות $A, B \subseteq \mathbb{X}$ כך ש- $\mathbb{X} = A \cup B$, ובנוסף $f|_A$ ו- $f|_B$ רציפות, אז f רציפה.

טענה 4.7. תהיינה X, Y קבוצות, ותהיינה $f : X \rightarrow \mathbb{Y}$ ו- $g : \mathbb{X} \rightarrow Y$ פונקציות.

• הקבוצה $\{f^{-1}(U) \mid U \in \sigma\}$ היא תת-בסיס של X , f רציפה תחת הטופולוגיה המושרית ממנו, וזוהי הטופולוגיה החלשה ביותר על X ש- f רציפה עבורה.

• הקבוצה $\{U \subseteq Y \mid g^{-1}(U) \in \tau\}$ היא תת-בסיס של $\mathbb{Y}$, g רציפה תחת הטופולוגיה המושרית ממנו, וזוהי הטופולוגיה החזקה ביותר על X ש- g רציפה עבורה.

טענה 4.8. תהא $f : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{Y}$ פונקציה, ויהי $\mathcal{B}$ בסיס לטופולוגיה τ . אם f היא הומיאומורפיזם אז הקבוצה $\mathcal{C} := \{f(B) \mid B \in \mathcal{B}\}$ היא בסיס לטופולוגיה σ .

4.2 הומיאומורפיזמים

הגדרה 4.9. תהא $f : X \rightarrow Y$ פונקציה.

• f תיקרא העתקה פתוחה אם לכל קבוצה פתוחה $U \subseteq X$ גם $f(U)$ היא קבוצה פתוחה.

• f תיקרא העתקה סגורה אם לכל קבוצה סגורה $C \subseteq X$ גם $f(C)$ היא קבוצה סגורה.

הגדרה 4.10. פונקציה $f : X \rightarrow Y$ תיקרא הומיאומורפיזם בין X -ל- Y אם מתקיימים התנאים הבאים :

1. f רציפה

2. f חח"ע ועל

3. f^{-1} רציפה

מסקנה 4.11. תהא $f : X \rightarrow Y$ פונקציה רציפה והפיכה, התנאים הבאים שקולים :

• f היא הומיאומורפיזם.

• f היא העתקה פתוחה.

• f היא העתקה סגורה.

5 מרחבי מכפלה

יהי $\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$ אוסף קבוצות לא ריקות, ונסמן:

$$\prod_{\alpha \in I} X_\alpha := \left\{ f : I \rightarrow \bigcup_{\alpha \in I} X_\alpha \mid \forall \alpha \in I f(\alpha) \in X_\alpha \right\}$$

♣ אם נזכור שסדרה אין-סופית $(a_n)_{n=1}^\infty$ היא בעצם פונקציה מ- $\mathbb{N}$ לאיחוד כלשהו $\bigcup_{n=1}^\infty X_n$ כך ש- $a_n \in X_n$ לכל $n \in \mathbb{N}$,
נבין שהסימון שלעיל הוא בעצם הכללה של המכפלה הקרטזית הרגילה.

♣ כן, אנחנו מניחים כאן את אקסיומת הבחירה כדי ש- $\prod_{\alpha \in I} X_\alpha$ לא תהיה ריקה.

כמו כן, לכל $\beta \in I$, נגדיר את הפונקציה $\pi_\beta : \prod_{\alpha \in I} X_\alpha \rightarrow X_\beta$ ע"י $\pi_\beta(f) := f(\beta)$ (לכל $f \in \prod_{\alpha \in I} X_\alpha$), ונקרא לה ההטלה על X_β .

יהי $\{\tau_\alpha\}_{\alpha \in I}$ אוסף כך ש- τ_α היא טופולוגיה על X_α לכל $\alpha \in I$, ונסמן גם:

$$\mathcal{B}_{\text{box}} := \left\{ \prod_{\alpha \in I} U_\alpha \mid \forall \alpha \in I U_\alpha \in \tau_\alpha \right\}$$

$$\mathcal{B}_{\text{prod}} := \left\{ \prod_{\alpha \in I} U_\alpha \in \mathcal{B}_{\text{box}} \mid \text{קבוצת האינדקסים ב- } I \text{ כך ש- } U_\alpha \neq X_\alpha \text{ היא קבוצה סופית} \right\}$$

מסקנה 5.1. אם I סופית אז $\mathcal{B}_{\text{box}} = \mathcal{B}_{\text{prod}}$.

טענה 5.2. $\mathcal{B}_{\text{box}}$ ו- $\mathcal{B}_{\text{prod}}$ הם בסיסים של $\prod_{\alpha \in I} X_\alpha$.

הגדרה 5.3. הטופולוגיה המושרית ע"י $\mathcal{B}_{\text{box}}$ תיקרא טופולוגיית הקופסה, הטופולוגיה המושרית ע"י $\mathcal{B}_{\text{prod}}$ תיקרא טופולוגיית המכפלה.

♣ טופולוגיית הקופסה היא הטופולוגיה הטבעית שהיינו רוצים להגדיר על מכפלה (נשים לב ש- $\mathcal{B}_{\text{box}}$ אינה טופולוגיה על $\prod_{\alpha \in I} X_\alpha$, אלא רק בסיס).

♣ טופולוגיית המכפלה היא הטופולוגיה החלשה ביותר כך שההטלות תהיינה רציפות.

הסכמה: כשנדבר על מכפלה של מרחבים טופולוגיים מבלי להזכיר את הטופולוגיה של המכפלה כוונתנו לטופולוגיית המכפלה.

משפט 5.4. תהא $((\mathbb{X}_n, \rho_n))_{n=1}^\infty$ סדרת מרחבים מטריים, ונסמן $\mathbb{X} := \prod_{n=1}^\infty \mathbb{X}_n$. הפונקציה $\rho : \mathbb{X} \times \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י (לכל $x, y \in \mathbb{X}$):

$$\rho(x, y) := \sum_{n=1}^\infty \rho_n(x_n, y_n)$$

היא מטריקה על $\mathbb{X}$, והטופולוגיה המושרית על ידיה היא טופולוגיית המכפלה. בפרט, מרחב מכפלה של מרחבים מטריים הוא מרחב מטריזבילי.

³סדרה סופית $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ היא פונקציה מ- $\{k \in \mathbb{N} : k \leq n\}$ לאיחוד כלשהו $\bigcup_{k=1}^n X_k$ כך ש- $a_k \in X_k$ לכל $k \in \mathbb{N}$. $n \geq k$

6 אקסיומות ההפרדה

יהי $(\mathbb{X}, \tau)$ מרחב טופולוגי.

6.1 רגולריות ונורמליות

הגדרה 6.1. תהיינה $x, y \in \mathbb{X}$ ו- $A, B \subseteq \mathbb{X}$.

- נאמר ש- x ו- y ניתנות להפרדה זו מזו, אם קיימות שתי קבוצות פתוחות זרות $U, V \subseteq \mathbb{X}$ כך ש- $x \in U$ ו- $y \in V$.
- נאמר ש- x ו- A ניתנות להפרדה זו מזו, אם קיימות שתי קבוצות פתוחות זרות $U, V \subseteq \mathbb{X}$ כך ש- $x \in U$ ו- $A \subseteq V$.
- נאמר ש- A ו- B ניתנות להפרדה זו מזו, אם קיימות שתי קבוצות פתוחות זרות $U, V \subseteq \mathbb{X}$ כך ש- $A \subseteq U$ ו- $B \subseteq V$.

הגדרה 6.2. מרחב טופולוגי ייקרא רגולרי אם כל נקודה ניתנת להפרדה מכל קבוצה סגורה שאינה שייכת אליה.

טענה 6.3. $(\mathbb{X}, \tau)$ רגולרי אם"ם לכל $x \in \mathbb{X}$, ולכל קבוצה פתוחה $U \subseteq \mathbb{X}$ כך ש- $x \in U$, קיימת קבוצה פתוחה $V \subseteq \mathbb{X}$ כך ש- $x \in V \subseteq \bar{V} \subseteq U$.

טענה 6.4. מכפלה של שני מרחבים רגולריים היא מרחב רגולרי.

הגדרה 6.5. מרחב טופולוגי ייקרא נורמלי אם כל שתי קבוצות סגורות ניתנות להפרדה זו מזו.

טענה 6.6. $(\mathbb{X}, \tau)$ נורמלי אם"ם לכל קבוצה סגורה $C \subseteq \mathbb{X}$, ולכל קבוצה פתוחה $U \subseteq \mathbb{X}$ כך ש- $C \subseteq U$, קיימת קבוצה פתוחה $V \subseteq \mathbb{X}$ כך ש- $C \subseteq V \subseteq \bar{V} \subseteq U$.

6.2 האקסיומות והשלכותיהן

הגדרה 6.7. אקסיומות ההפרדה

- נאמר ש- $(\mathbb{X}, \tau)$ הוא מרחב T_0 , אם לכל שתי נקודות שונות במרחב, קיימת קבוצה פתוחה כך שבדיוק אחת משתי הנקודות שייכת אליה.

- נאמר ש- $(\mathbb{X}, \tau)$ הוא מרחב T_1 , אם לכל שתי נקודות שונות במרחב, לכל אחת מהן קיימת קבוצה פתוחה כך שאותה נקודה שייכת אליה והאחרת אינה כזו.

- נאמר ש- $(\mathbb{X}, \tau)$ הוא מרחב T_2 או שהוא מרחב האוסדורף⁴, אם כל שתי נקודות שונות ניתנות להפרדה.

- נאמר ש- $(\mathbb{X}, \tau)$ הוא מרחב T_3 , אם הוא מרחב T_1 רגולרי.

- נאמר ש- $(\mathbb{X}, \tau)$ הוא מרחב T_4 , אם הוא מרחב T_1 נורמלי.

מסקנה 6.8. כל מרחב מטריזבילי הוא מרחב T_4 .

מסקנה 6.9. $(\mathbb{X}, \tau)$ הוא מרחב T_1 אם"ם כל יחידון הוא קבוצה סגורה.

מסקנה 6.10. לכל $i, j \in \mathbb{N}_0$ כך ש- $i > j$, כל מרחב T_i הוא מרחב T_j .

טענה 6.11. לכל $i \in \mathbb{N}_0$, $3 \geq i$, כל תת-מרחב של מרחב T_i גם הוא מרחב T_i .

טענה 6.12. לכל $i \in \mathbb{N}_0$, $3 \geq i$, מכפלה של שני מרחבי T_i היא מרחב T_i .

טענה 6.13. $(\mathbb{X}, \tau)$ הוא מרחב האוסדורף אם"ם הקבוצה $\{(x, y) \in \mathbb{X}^2 \mid x = y\}$ היא קבוצה סגורה ב- $\mathbb{X}^2$.

משפט 6.14. הלמה של אוריסון⁵

אם $(\mathbb{X}, \tau)$ הוא מרחב T_4 אז לכל שתי קבוצות סגורות זרות ולא ריקות $C, D \subseteq \mathbb{X}$ קיימת פונקציה רציפה $f : \mathbb{X} \rightarrow [0, 1]$ כך ש- $f(D) = \{1\}$ ו- $f(C) = \{0\}$.

6.3 דוגמאות לכך שאין שקילות בין אקסיומות ההפרדה

יש לכתוב סעיף זה.

⁴על שם פליקס האוסדורף.

⁵על שם פאבל סמואילוביץ אוריסון.

7 מסננים

צריך לכתוב פרק זה.

8 קומפקטיות

יהי $(\mathbb{X}, \tau)$ מרחב טופולוגי.

הגדרה 8.1. אוסף של קבוצות פתוחות $\mathcal{S} \subseteq \tau$, ייקרא כיסוי פתוח של קבוצה $A \subseteq \mathbb{X}$ אם $A \subseteq \bigcup \mathcal{S}$. כמו כן, תת-קבוצה של כיסוי פתוח תיקרא תת-כיסוי שלו אם היא מהווה כיסוי פתוח בפני עצמה (עבור אותה קבוצה כמובן).

הגדרה 8.2. קבוצה $K \subseteq \mathbb{X}$ תיקרא קומפקטית, אם לכל כיסוי פתוח של K יש תת-כיסוי סופי. כמו כן $(\mathbb{X}, \tau)$ ייקרא מרחב קומפקטי אם $\mathbb{X}$ היא קבוצה קומפקטית.

מסקנה 8.3. איחוד סופי של קבוצות קומפקטיות הוא קבוצה קומפקטית.

הגדרה 8.4. נאמר שאוסף $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{X})$ מקיים את תכונת החיתוך הסופי, אם לכל תת-אוסף סופי $\mathcal{S}' \subseteq \mathcal{S}$ החיתוך $\bigcap \mathcal{S}'$ אינו ריק.

מסקנה 8.5. $(\mathbb{X}, \tau)$ הוא מרחב קומפקטי אם"ם לכל אוסף $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{X})$ של קבוצות סגורות המקיים את תכונת החיתוך הסופי, החיתוך $\bigcap \mathcal{S}$ אינו ריק.

משפט 8.6. יהי $(\mathbb{Y}, \sigma)$ מרחב קומפקטי, ותהא $f : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{Y}$ פונקציה רציפה. לכל קבוצה קומפקטית $K \subseteq \mathbb{X}$ גם $f(K)$ היא קבוצה קומפקטית.

מסקנה 8.7. משפט וירשטראס⁶

אם $(\mathbb{X}, \tau)$ קומפקטי אז כל פונקציה רציפה $f : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{R}$ מקבלת מקסימום ומינימום ובפרט חסומה.

טענה 8.8. לכל קבוצה קומפקטית $K \subseteq \mathbb{X}$, כל קבוצה סגורה $C \subseteq K$ היא קומפקטית.

משפט 8.9. במרחב האוסדורף, כל קבוצה קומפקטית היא קבוצה סגורה.

מסקנה 8.10. מרחב האוסדורף קומפקטי הוא נורמלי.

מסקנה 8.11. יהי $(\mathbb{Y}, \sigma)$ מרחב האוסדורף, אם $(\mathbb{X}, \tau)$ קומפקטי אז כל פונקציה רציפה חח"ע ועל $f : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{Y}$ היא הומיאומורפיזם.

משפט 8.12. משפט טיכונוף⁷

תהא $\{(X_\alpha, \tau_\alpha)\}_{\alpha \in I}$ קבוצת מרחבים טופולוגיים, אם X_α קומפקטי לכל $\alpha \in I$ אז גם מרחב המכפלה $\prod_{\alpha \in I} X_\alpha$ (עם טופולוגיית המכפלה) הוא מרחב קומפקטי.

8.1 קומפקטיפיקציה

הגדרה 8.13. $(\mathbb{X}, \tau)$ ייקרא קומפקטי מקומית, אם לכל נקודה ב- $\mathbb{X}$ יש סביבה קומפקטית.

סימון: נסמן⁸:

$$\hat{\mathbb{X}} := \mathbb{X} \cup \{\infty\}$$

$$\hat{\tau} := \tau \cup \{K \subseteq \mathbb{X} \mid K \text{ היא קבוצה קומפקטית} \mid \hat{\mathbb{X}} \setminus K\}$$

מסקנה 8.14. $\hat{\tau}$ היא טופולוגיה על $\hat{\mathbb{X}}$ (כלומר $(\hat{\mathbb{X}}, \hat{\tau})$ הוא מרחב טופולוגי), ומתקיים $\hat{\mathbb{X}} = \overline{\mathbb{X}}$.

הגדרה 8.15. המרחב $(\hat{\mathbb{X}}, \hat{\tau})$ ייקרא קומפקטיפיקציה חד-נקודתית של $(\mathbb{X}, \tau)$.

משפט 8.16. אם $(\mathbb{X}, \tau)$ קומפקטי אז $\{\infty\}$ היא קבוצה פתוחה ב- $(\hat{\mathbb{X}}, \hat{\tau})$; ואם $(\mathbb{X}, \tau)$ הוא מרחב האוסדורף קומפקטי מקומית, אז $(\hat{\mathbb{X}}, \hat{\tau})$ הוא מרחב האוסדורף קומפקטי.

⁶על שם קארל וירשטראס.

⁷על שם אנדריי טיכונוב

⁸ ∞ הוא איבר כלשהו שאינו שייך ל- $\mathbb{X}$, ע"פ האקסיומות של תורת הקבוצות אכן קיימת קבוצה כזו (לדוגמה $\{\mathbb{X}\}$).

9 אקסיומות המנייה

יהי $(\mathbb{X}, \tau)$ מרחב טופולוגי.

הגדרה 9.1. אוסף של קבוצות פתוחות $\mathcal{B} \subseteq \tau$ ייקרא בסיס מקומי לנקודה $x \in \mathbb{X}$ אם לכל קבוצה פתוחה $U \in \tau$ קיימת קבוצה $B \in \mathcal{B}$ כך ש- $x \in B \subseteq U$.

הסכמה: בקורס זה קבוצה A תיקרא בת-מנייה אם היא סופית או ש- $|A| = |\mathbb{N}|$.

9.2 הגדרה

1. נאמר ש- $(\mathbb{X}, \tau)$ מקיים את אקסיומת המנייה הראשונה, אם לכל נקודה יש בסיס מקומי בן-מנייה.

2. נאמר ש- $(\mathbb{X}, \tau)$ מקיים את אקסיומת המנייה השנייה, אם יש לטופולוגיה שלו בסיס בן-מנייה.

3. נאמר ש- $(\mathbb{X}, \tau)$ הוא מרחב לינדלוף⁹, אם לכל כיסוי פתוח של המרחב כולו יש תת-כיסוי בן-מנייה.

4. נאמר ש- $(\mathbb{X}, \tau)$ הוא מרחב ספרבילי, אם יש בו קבוצה צפופה בת-מנייה.

מסקנה 9.3. אם $(\mathbb{X}, \tau)$ מקיים את אקסיומת המנייה השנייה אז הוא ספרבילי, מרחב לינדלוף ומקיים את אקסיומת המנייה הראשונה.

טענה 9.4. מרחב רגולרי המקיים את אקסיומת המנייה השנייה הוא מרחב נורמלי, ולכן גם T_4 .

משפט 9.5. משפט המטריזביליות של אריסון

מרחב T_3 המקיים את אקסיומת המנייה השנייה הוא מרחב מטריזבילי.

הוכחה. **צריך לכתוב הוכחה.**

בהוכחה משתמשים בעובדה שהמרחב $[0, 1]^{\mathbb{N}}$ עם טופולוגיית המכפלה הוא מרחב מטריזבילי (נובע ממשפט 5.4).

■

⁹על שם Lindelöf Leonard Ernst.

10 קשירות

יהי $(\mathbb{X}, \tau)$ מרחב טופולוגי.

10.1 קשירות רגילה

הגדרה 10.1. קבוצה $A \subseteq \mathbb{X}$ תיקרא קשירה אם אין ל- A כיסוי פתוח שכל איבריו זרים זה לזה. כמו כן, נאמר ש- $(\mathbb{X}, \tau)$ הוא מרחב קשיר אם $\mathbb{X}$ קשירה.

מסקנה 10.2. קבוצה $A \subseteq \mathbb{X}$ היא קשירה אם"ם לא קיימות שתי קבוצות פתוחות זרות $U, V \subseteq \mathbb{X}$ כך ש- $A = U \cup V$.

מסקנה 10.3. הסגור של קבוצה קשירה גם הוא קשיר.

מסקנה 10.4. קבוצה $A \subseteq \mathbb{R}$ היא קשירה אם"ם A היא מקטע.

טענה 10.5. יהי גם $(\mathbb{Y}, \sigma)$ מרחב טופולוגי, ותהא $f : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{Y}$ פונקציה. אם f רציפה אז לכל קבוצה קשירה $A \subseteq \mathbb{X}$ גם $f(A)$ קשירה.

טענה 10.6. מכפלה של מרחבים היא מרחב קשיר (בטופולוגיית המכפלה) אם"ם כל אחד מהמרחבים במכפלה קשיר בפני עצמו.

למה 10.7. $(\mathbb{X}, \tau)$ הוא מרחב קשיר אם"ם לכל מרחב דיסקרטי $(\mathbb{Y}, \sigma)$, כל פונקציה רציפה $f : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{Y}$ היא פונקציה קבועה.

מסקנה 10.8 (למת הכוכב).

יהי S אוסף קבוצות קשירות ב- $\mathbb{X}$, אם קיימת $A \in S$ כך ש- $A \cap B \neq \emptyset$ לכל $B \in S$, אז $\cup S$ קשירה.

הגדרה 10.9. קבוצה $A \subseteq \mathbb{X}$ תיקרא רכיב קשירות ב- $\mathbb{X}$, אם היא קבוצה קשירה מרבית¹⁰. ע"פ **למת הכוכב** לכל $x \in \mathbb{X}$ קיים רכיב קשירות יחיד $A \subseteq \mathbb{X}$ כך ש- $x \in A$ ¹¹, רכיב קשירות זה ייקרא רכיב הקשירות של x .

10.2 קשירות מסילתית

הגדרה 10.10. מסילה ב- $\mathbb{X}$ היא פונקציה רציפה $\gamma : I \rightarrow \mathbb{X}$, כאשר I הוא קטע סגור ב- $\mathbb{R}$ עם הטופולוגיה הסטנדרטית.

הגדרה 10.11. קבוצה $A \subseteq \mathbb{X}$ תיקרא קשירה מסילתית אם לכל $x, y \in A$ קיימת מסילה $\gamma : [a, b] \rightarrow A$ כך ש- $\gamma(a) = x$ ו- $\gamma(b) = y$. כמו כן, נאמר ש- $(\mathbb{X}, \tau)$ הוא מרחב קשיר מסילתית אם $\mathbb{X}$ קשירה מסילתית.

מסקנה 10.12. אם קבוצה $A \subseteq \mathbb{X}$ קשירה מסילתית אז היא קשירה, בפרט, אם $(\mathbb{X}, \tau)$ קשיר מסילתית אז הוא קשיר.

♣ הכיוון ההפוך אינו נכון, לדוגמה הקבוצה $\{(0, 0)\} \cup \{(x, \sin(\frac{1}{x})) \mid x \in (0, 1)\}$ היא קבוצה קשירה ב- $\mathbb{R}^2$ שאינה קשירה מסילתית.

מסקנה 10.13. יהי $(\mathbb{Y}, \sigma)$ מרחב טופולוגי, ותהא $f : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{Y}$. אם f רציפה אז לכל קבוצה קשירה מסילתית $A \subseteq \mathbb{X}$ גם $f(A)$ קשירה מסילתית.

מסקנה 10.14. מכפלה של מרחבים קשירים מסילתית גם היא קשירה מסילתית.

10.3 קשירות מקומית וקשירות מסילתית מקומית

הגדרה 10.15.

• נאמר ש- $(\mathbb{X}, \tau)$ קשיר מקומית בנקודה $x \in \mathbb{X}$, אם לכל סביבה $W \subseteq \mathbb{X}$ של x , קיימת קבוצה פתוחה וקשירה $U \subseteq W$ כך ש- $x \in U$.

• נאמר ש- $(\mathbb{X}, \tau)$ קשיר מקומית אם הוא קשיר מקומית בכל נקודה.

• נאמר ש- $(\mathbb{X}, \tau)$ קשיר מסילתית מקומית בנקודה $x \in \mathbb{X}$, אם לכל סביבה $W \subseteq \mathbb{X}$ של x , קיימת קבוצה פתוחה וקשירה מסילתית $U \subseteq W$ כך ש- $x \in U$.

• נאמר ש- $(\mathbb{X}, \tau)$ קשיר מסילתית מקומית אם הוא קשיר מסילתית מקומית בכל נקודה.

טענה 10.16. אם $(\mathbb{X}, \tau)$ קשיר וקשיר מסילתית מקומית אז הוא קשיר מסילתית.

¹⁰לכל קבוצה קשירה $B \subseteq \mathbb{X}$ כך ש- $A \subseteq B$ מתקיים $A = B$.
¹¹זהו האיחוד של כל הקבוצות הקשירות ש- x שייך אליהן.