

2023-2024-1 概率统计 (A) 参考答案及评分标准

一、选择题 (每题 3 分, 共 15 分) ACBDC

二、填空题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. $6/7$; 2. 0.5 ; 3. 5 ; 4. 0.975 ($39/40$); 5. $D\hat{\theta}_1 < D\hat{\theta}_2$

三、(本题 10 分)

解: 设 X 表示此县农民的年平均收入, 则 $X \sim N(7100, 400^2)$,

$$(1) P\{7000 < X < 8000\} = \Phi\left(\frac{8000-7100}{400}\right) - \Phi\left(\frac{7000-7100}{400}\right) \quad \text{-----2 分}$$

$$= \Phi(2.25) - \Phi(-0.25) = \Phi(2.25) - [1 - \Phi(0.25)] \\ = 0.5865. \quad \text{-----3 分}$$

$$(2) P\{7100-k < X < 7100+k\} \\ = \Phi\left(\frac{k}{400}\right) - \Phi\left(-\frac{k}{400}\right) = 2\Phi\left(\frac{k}{400}\right) - 1 \geq 0.95 \quad \text{-----3 分}$$

$$\text{所以, } \Phi\left(\frac{k}{400}\right) \geq 0.975, \text{ 查表知: } \frac{k}{400} \geq 1.96, \text{ 从而 } k \geq 784. \quad \text{-----2 分}$$

四、(本题 16 分) 解: (1) $0 < x < 1$ 时

$$F(x) = \int_0^x 6t(1-t)dt = (3t^2 - 2t^3)_0^x = 3x^2 - 2x^3 \\ F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 3x^2 - 2x^3 & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases} \quad \text{-----4 分}$$

$$(2) \text{法一: } P\{-1 < X < 0.5\} = F(0.5) - F(-1) = 0.5$$

$$\text{法二: } P\{-1 < X < 0.5\} = \int_0^{0.5} 6x(1-x)dx = 0.5 \quad \text{-----4 分}$$

(3) 由 $y = 2x+1$ 得 $x = \frac{y-1}{2}$, $x' = \frac{1}{2}$, 则 Y 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} 6 \times \frac{y-1}{2} \left(1 - \frac{y-1}{2}\right) \times \frac{1}{2}, & 0 < \frac{y-1}{2} < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad \text{-----2 分}$$

$$= \begin{cases} \frac{3}{4}(3-y)(y-1), & 1 < y < 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad \text{-----2 分}$$

$$(4) EX = \int_0^1 x \cdot 6x(1-x) dx = \left(2x^3 - \frac{3}{2}x^4 \right)_0^1 = \frac{1}{2}$$

$$E(X^2) = \int_0^1 x^2 \cdot 6x(1-x) dx = \left(\frac{3}{2}x^4 - \frac{6}{5}x^5 \right)_0^1 = \frac{3}{10}$$

$$D(X) = E(X^2) - (EX)^2 = \frac{3}{10} - \frac{1}{4} = \frac{1}{20} \quad \text{-----4 分}$$

五、（本题 8 分）

解：设 A_1 代表动物为猫， A_2 代表动物为狗， B 代表动物患该种疾病：

$$(1) P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2)$$

$$= \frac{40}{160} \times 0.02 + \frac{120}{160} \times 0.05 = 0.0425 \quad \text{-----4 分}$$

$$(2) P(A_1|B) = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)} = \frac{0.005}{0.0425} = \frac{2}{17} \approx 0.1176 \quad \text{-----4 分}$$

六、（本题 12 分）

解：（1）（本小问 4 分） σ^2 的置信度为 0.9 的置信区间为

$$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right) \quad \text{-----2 分}$$

$$= \left(\frac{24 \times 6.3^2}{36.415}, \frac{24 \times 6.3^2}{13.848} \right) = (26.16, 68.79) \quad \text{-----2 分}$$

（2）（本小问 8 分）

$$H_0: \mu = 26.5, H_1: \mu \neq 26.5 \quad \text{-----1 分}$$

$$\text{构造检验统计量: } T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

$$\text{则原假设 } H_0 \text{ 的拒绝域: } W = \{|T| > t_{\alpha/2}(n-1)\},$$

$$\text{由已知 } \alpha = 0.05, n = 25, \text{ 查 } t \text{ 分布表得临界值: } t_{\alpha/2}(n-1) = t_{0.025}(24) = 2.0639,$$

$$\text{得拒绝域: } W = \{|t| > 2.0639\},$$

$$\text{将 } \bar{x} = 24.2, s = 6.3, \text{ 代入统计量, 得 } |t| = \left| \frac{24.2 - 26.5}{6.3/\sqrt{25}} \right| = 1.83 \notin W,$$

所以不能拒绝 H_0 , -----6 分

故在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 认为该超市食品经理的结论是正确的. - -----1 分

七、(本题 10 分)

解: (1) 矩估计

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_5^6 x(\theta+1)(x-5)^\theta dx \\ &= \int_5^6 (x-5+5)(\theta+1)(x-5)^\theta dx \\ &= \int_5^6 (x-5)(\theta+1)(x-5)^\theta dx + \int_5^6 5(\theta+1)(x-5)^\theta dx \\ &= (\theta+1) \int_5^6 (x-5)^{\theta+1} dx + 5(\theta+1) \int_5^6 (x-5)^\theta dx \\ &= \frac{\theta+1}{\theta+2} (x-5)^{\theta+2} \Big|_5^6 + 5(x-5)^{\theta+1} \Big|_5^6 \\ &= \frac{\theta+1}{\theta+2} + 5 = 6 - \frac{1}{\theta+2} = \bar{X}. \end{aligned}$$

$$\text{解得参数的矩估计量为: } \hat{\theta} = \frac{1}{6 - \bar{X}} - 2. \text{ -----4 分}$$

(2) 最大似然估计

1) 构造似然函数

$$L(\theta) = \begin{cases} \prod_{i=1}^n f(x_i) = \prod_{i=1}^n (\theta+1)(x_i-5)^\theta = (\theta+1)^n \prod_{i=1}^n (x_i-5)^\theta, & 5 < x_i < 6 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \text{ -----2 分}$$

$$\text{记 } L_1(\theta) = (\theta+1)^n \prod_{i=1}^n (x_i-5)^\theta$$

$$2) \text{ 取对数, 则有: } \ln L_1(\theta) = n \ln(\theta+1) + \theta \sum_{i=1}^n \ln(x_i-5).$$

$$3) \text{ 求导, 并令其为零, 则有: } \frac{d \ln L_1(\theta)}{d\theta} = \frac{n}{\theta+1} + \sum_{i=1}^n \ln(x_i-5) = 0.$$

$$\text{得最大似然估计值为 } \hat{\theta} = -1 - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln(x_i-5)}. \text{ -----4 分}$$

八、(本题 8 分) 解: (1) 若 X 与 Y 相互独立, 则 $p_{ij} = p_{i\cdot} \cdot p_{\cdot j}$, 联合分布律为

$X \backslash Y$	-1	0	2
0	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{18}$
1	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$

-----6 分

(2) $\max(X, Y)$ 的分布律为

$\max(X, Y)$	0	1	2
P	$\frac{5}{18}$	$\frac{5}{9}$	$\frac{1}{6}$

$$\text{则 } E[\max(X, Y)] = \frac{8}{9}$$

-----2 分

九、(本题 6 分) 解 由条件知 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 1/4, & 1 \leq x \leq 5; \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

-----1 分

令 Y 表示三次独立观测中观测值大于 4 的次数, 则 $Y \sim B(3, p)$,

$$p = P\{X > 4\} = \int_4^5 \frac{1}{4} dx = \frac{1}{4}$$

-----3 分

故有

$$P\{Y \geq 1\} = 1 - P\{Y = 0\} = 1 - C_3^0 \left(\frac{1}{4}\right)^0 \left(1 - \frac{1}{4}\right)^3 = 1 - \frac{27}{64} = \frac{37}{64} = 0.578125$$

-----2 分