

# Primorsko klimatsko-vegetacijsko područje


izražen utjecaj sredozemne klime (Csa) i čovjeka na tlo i vegetaciju


najraširenija obojena tla

- crvenica
- smeđa tla

 vegetacija prilagođena klimi (tvrdolisno bilje)

- zimzeleni hrast crnika
- bor i čempres
- makija, garig i kamenjar

















## Gorsko-kotlinsko klimatsko-vegetacijsko područje

- dominiraju podzoli smeđa isprana tla (zbog učestalih padalina i otapanja snijega)
- tla siromašna hranjivim tvarima
- vegetacija ovisi o nadmorskoj visini
- najzastupljenije su šume i livade
  - bukva, jela, smreka, klekovina
  - iznad 1600 m goleti
  - prašume *(Čorkova uvala)*


















### Panonsko-peripanonsko klimatsko-vegetacijsko područje

- istočna Hrvatska plodna crna tla
- u naplavnim ravnima močvarne crnice melioracijom postaju poljodjelska zemljišta
- u vlažnim nizinama šume hrasta lužnjaka, vrbe, topole, johe
- u suhim nizinama šume hrasta kitnjaka i graba
- na višim predjelima (iznad 300 m) bukva, kesten i jela
- brojna zaštićena područja (Lonjsko polje, Kopački rit, Crna mlaka)





## Gospodarsko vrednovanje

- oko 40% površine RH obraslo šumom listopadna šuma i jela
- ostatak livade, oranice, goleti, kamenjar i naselja
- gospodarsko vrednovanje šuma: drvna masa, lov, uzgoj divljači i turizam

#### - primorsko područje

 na crvenici i smeđim tlima se uzgajaju maslina, vinova loza i voće (Istra, Vinodol, Ravni kotari, Kaštele, Poljica i Konavli)

### gorsko-kotlinsko područje

uzgoj krumpira, povrtnica i voća, a šume za obradu i izvoz drva

#### panonsko-peripanonsko područje

uzgoj žitarica, industrijskog i krmnog bilja, voćarstvo i vinogradarstvo