

Primorsko klimatsko-vegetacijsko područje


izražen utjecaj sredozemne klime (Csa) i čovjeka na tlo i vegetaciju


najraširenija obojena tla

- crvenica
- smeđa tla

 vegetacija prilagođena klimi (tvrdolisno bilje)

- zimzeleni hrast crnika
- bor i čempres
- makija, garig i kamenjar

















Gorsko-kotlinsko klimatsko-vegetacijsko područje

- dominiraju podzoli smeđa isprana tla (zbog učestalih padalina i otapanja snijega)
- tla siromašna hranjivim tvarima
- vegetacija ovisi o nadmorskoj visini
- najzastupljenije su šume i livade
 - bukva, jela, smreka, klekovina
 - iznad 1600 m goleti
 - prašume *(Čorkova uvala)*


















Panonsko-peripanonsko klimatsko-vegetacijsko područje

- istočna Hrvatska plodna crna tla
- u naplavnim ravnima močvarne crnice melioracijom postaju poljodjelska zemljišta
- u vlažnim nizinama šume hrasta lužnjaka, vrbe, topole, johe
- u suhim nizinama šume hrasta kitnjaka i graba
- na višim predjelima (iznad 300 m) bukva, kesten i jela
- brojna zaštićena područja (Lonjsko polje, Kopački rit, Crna mlaka)





Gospodarsko vrednovanje

- oko 40% površine RH obraslo šumom listopadna šuma i jela
- ostatak livade, oranice, goleti, kamenjar i naselja
- gospodarsko vrednovanje šuma: drvna masa, lov, uzgoj divljači i turizam

- primorsko područje

 na crvenici i smeđim tlima se uzgajaju maslina, vinova loza i voće (Istra, Vinodol, Ravni kotari, Kaštele, Poljica i Konavli)

gorsko-kotlinsko područje

uzgoj krumpira, povrtnica i voća, a šume za obradu i izvoz drva

panonsko-peripanonsko područje

uzgoj žitarica, industrijskog i krmnog bilja, voćarstvo i vinogradarstvo

- velika biljna raznolikost 8600 biljnih vrsta
- 3 klimatsko-vegetacijska područja:
 - 1. primorsko
 - 2. gorsko-kotlinsko
 - 3. panonsko-peripanonsko

PRIMORSKO KLIMATSKO-VEGETACIJSKO PODRUČJE

- najraširenija obojena tla crvenica i smeđa tla
- vegetacija prilagođena klimi (tvrdolisno bilje)
 - zimzeleni hrast crnika
 - bor i čempres
 - makija, garig i kamenjar

na **crvenici** i **smeđim tlima** se uzgajaju **maslina**, **vinova loza** i **voće** (Istra, Vinodol, Ravni kotari, Kaštele, Poljica i Konavli)

GORSKO-KOTLINSKO KLIMATSKO-VEGETACIJSKO PODRUČJE

- dominiraju podzoli smeđa isprana tla (siromašna hranjivim tvarima)
- vegetacija ovisi o nadmorskoj visini
- najzastupljenije su šume i livade
 - bukva, jela, smreka, klekovina
 - iznad 1600 m goleti
 - prašume (Čorkova uvala)

uzgoj **krumpira**, povrtnica i voća, a **šume** za obradu i izvoz drva

Biljni pokrov i tlo

(plan ploče)

PANONSKO-PERIPANONSKO KLIMATSKO-VEGETACIJSKO PODRUČJE

- istočna Hrvatska plodna crna tla
- u naplavnim ravnima močvarne crnice melioracijom postaju poljodjelska zemljišta
- u vlažnim nizinama šume hrasta lužnjaka, vrbe, topole, johe
- u suhim nizinama šume hrasta kitnjaka i graba
- na višim predjelima (iznad 300 m) bukva, kesten i jela
- brojna zaštićena područja (Lonjsko polje, Kopački rit, Crna mlaka)

uzgoj **žitarica**, industrijskog i krmnog bilja, voćarstvo i **vinogradarstvo**