





SRR975554.tsv
SRR975572.tsv
SRR975585.tsv
SRR975582.tsv
SRR975577.tsv
SRR975574.tsv
SRR975556.tsv
SRR975567.tsv
SRR975559.tsv
SRR975564.tsv
20
0
−20
−25
0
25
50
PC2: 16% variance
PC1: 55% variance
group
p1:NormalX
p1:Tumor
p2:NormalX
p2:Tumor
p3:NormalX
p3:Tumor
p4:NormalX
p4:Tumor
p5:NormalX
p5:Tumor


Sample−to−sample distances
SRR975556.tsv
SRR975585.tsv
SRR975572.tsv
SRR975574.tsv
SRR975582.tsv
SRR975577.tsv
SRR975564.tsv
SRR975554.tsv
SRR975559.tsv
SRR975567.tsv
150
100
50
0


Dispersion estimates
dispersion
1e+00
1e−02
1e−04
1e−06
1e−08
1e−01
1e+00
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
1e+06
mean of normalized counts
gene−est
fitted
final


Histogram of p−values for condition: Tumor vs NormalX
frequency
0
1000
2000
3000
4000
5000
0
1
p−values


MA−plot for condition: Tumor vs NormalX
log fold change
5
0
−5
1e−01
1e+00
1e+01
1e+02
1e+03
1e+04
1e+05
1e+06
mean of normalized counts