

Assignment-11: Nesterov Accelerated Gradient Descent

Manual Calculations

STEP-1: read $[X, Y]$, $m=1$, $c=-1$, $\eta=0.1$, $\gamma=0.9$, $V_m=0$,
 $V_c=0$, epochs = 2, no-of-samples = 2

STEP-2: iter = 1

X	Y
0.2	3.4
0.4	3.8

STEP-3: sample = 1

$$\begin{aligned}\text{STEP-4: } g_m &= -(y_i - (m + \gamma V_m) x_i - (c + \gamma V_c)) x_i \\ &= -(3.4 - (1 + (0.9) \times 0) \times 0.2 - ((-1) + 0)) \times 0.2 \\ &= -(3.4 - 0.2 + 1) \times 0.2 = -(4.2 \times 0.2) = -0.84 \\ g_c &= -4.2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{STEP-5: } V_m &= \gamma V_m - \eta g_m = (0.9)(0) - (0.1)(-0.84) \\ &= 0.084\end{aligned}$$

$$V_c = \gamma V_c - \eta g_c = (0) - (0.1)(-4.2) = 0.42$$

$$\begin{aligned}\text{STEP-6: } m &= m + V_m = 1 + 0.084 = \underline{1.084} \\ c &= c + V_c = -1 + 0.42 = \underline{-0.58}\end{aligned}$$

STEP-7: sample = 1 + 1 = 2

STEP-8: if sample > no-of-samples $\Rightarrow 2 > 2 \Rightarrow \text{false}$
goto STEP 4

$$\text{STEP-9: } g_m = -(3.8 - (1.084 + (0.9) \times (0.084)) \times 0.4 - (-0.58 + (0.9) \times (0.42)) \times 0.4)$$

$$\Rightarrow J_m = -(3.8 - (1.1596 \times 0.4) + 0.958) \times 0.4$$

$$= -(4.29416) \times 0.4 = -1.717664$$

$$J_c = -4.29416$$

STEP-10: $V_m = \eta V_m - \eta J_m = (0.9)(0.084) - (0.1)(-1.717664)$

$$= 0.2473664$$

$$V_c = \eta V_c - \eta J_c = (0.9)(0.42) - (0.1)(-4.29416) = 0.807416$$

STEP-11: $m = m + V_m = 1.084 + 0.24736 = 1.33136$

$$c = c + V_c = -0.58 + 0.807416 = 0.227416$$

STEP-12: Sample = 2 + 1 = 3

STEP-13: if sample > no-of-samples = 3 > 2 = true

goto next step

STEP-14: iter = 1 + 1 = 2

STEP-15: if iter > epochs $\Rightarrow 2 > 2 = \text{false}$

go to step 3

STEP-16: sample = 1

$$\begin{aligned}
 \text{step 17: } g_m &= -(y_i - (m + \gamma V_m) x_i - (c + \gamma V_c)) x_i \\
 &= -(3.4 - [(1.33136 + (0.9) \times (0.24736))] \times 0.2 - \\
 &\quad (0.227416 + (0.9) \times 0.807416)) \\
 &= -(3.4 - [1.553984] \times 0.2 - [0.95409]) \\
 &= -(2.13511)
 \end{aligned}$$

$$g_c = -(3.4 - 1.553984 - 0.95409) = -0.891926$$

$$\begin{aligned}
 \text{step 18: } V_m &= \gamma V_m - \eta g_m = (0.9) \times 0.2473664 - (0.1) \times \\
 &\quad (-2.13511) \\
 &= 0.43614
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_c &= \gamma V_c - \eta g_c = (0.9) \times 0.807416 - (0.1) \times (-0.891926) \\
 &= 0.815867
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{STEP 19: } m &= m + V_m = 1.3316 + 0.43614 = \underline{1.76774} \\
 c &= c + V_c = 0.227416 + 0.815867 = \underline{1.043283}
 \end{aligned}$$

$$\text{STEP 20: } \text{sample} = \text{sample} + 1 = 1 + 1 = 2$$

$$\begin{aligned}
 \text{STEP 21: } \text{if } \text{sample} > n_s &\Rightarrow 2 > 2 \rightarrow \text{false} \\
 &\quad \text{repeat step 4}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{STEP 22: } g_m &= -(y_i - (m + \gamma V_m) x_i - (c + \gamma V_c)) x_i \\
 &= -(3.8 - (1.76774 + (0.9) \times 0.43614) \times 0.4 - (1.043283 \\
 &\quad + (0.9) \times 0.815867) \times 0.4)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= -(3.8 - (2.160266) \times 0.4 - 1.7775633) \times 0.4 \\
 &= -0.463332
 \end{aligned}$$

$$g_c = -[3.8 - (2.160266 \times 0.4) - 1.1583303]$$

$$= -1.1583303$$

STEP 23: $V_m = \gamma V_m - \eta \frac{\partial E}{\partial m}$

$$= (0.9) \times 0.43614 - (0.1) \times (-0.463332)$$

$$= 0.4388592$$

$$V_c = \gamma V_c - \eta \frac{\partial E}{\partial c}$$

$$= (0.9) \times 0.815867 - (0.1) \times (-1.1583303)$$

$$= 0.8501133$$

STEP 24: $m = 1.76774 + 0.4388592 = 2.2065992$

$$c = 1.043283 + 1.1583303 = 2.2016133$$

STEP 25: $sample = 2 + 1 = 3 > 2 \Rightarrow sample > epochs$
goto step 26

STEP 26: $iters = 2 + 1 = 3 > epochs$
Step 27

STEP 27: Print (m, c)

$$\Rightarrow 2.2065992, 2.2016133$$

STEP 28: Mean Squared Error

$$= (3.4 - (2.2065992 \times 0.2) - 2.2016133)^2$$

$$+ (3.8 - (2.2065992 \times 0.4) - 2.2016133)^2$$

$$= \frac{(0.57315) + (0.512293)}{2}$$

$$= \frac{1.085443}{2} = 0.54271$$