



Álgebra Linear na Construção da Arquitetura de Conomo com Rodas Ominidirecionais

Alexandre Pereira de Freitas
Lucas Rafael de Aguiar Silva
Samuel Morais Barros
Sérgio Reinier Sousa Macário
Vinícius de Freitas Lima Moraes

08/11/2019

Sumário

1	Introdução	2
2	Enunciado do problema	2
2.1	Deslizamento de Rodas	2
2.2	Economia de Energia	2
3	Resolução do problema	2
3.1	Item 1	2
3.2	Item 2	2
4	Conclusão	3

1 Introdução

2 Enunciado do problema

2.1 Deslizamento de Rodas

Considere um robô simétrico, com $m = (v_1, v_2, v_3, v_4)^T$ indicando a velocidade tangencial dos motores, D a matriz de velocidades, e v um vetor tridimensional $(v_x, v_y, R\omega)^T$. Dado isso, teste a inconsistência da velocidade dos motores e, conseqüentemente, se há rodas deslizando.

2.2 Economia de Energia

Considerando o resultado do problema anterior, ou seja, caso seja detectado inconsistência com os motores e alguma das rodas esteja deslizando. É possível corrigir rapidamente esse problema sem alterar a configuração física do robô (número de motores, número de rodas etc.)? Se sim proponha uma solução adequada.

3 Resolução do problema

3.1 Item 1

3.2 Item 2

Para identificarmos uma possível perda ou desperdício de energia precisamos identificar como funciona o vetor aceleração do robô, dado por: $a = C_\alpha f_k$. Partindo desse ponto, é fácil notar que existem combinações de forças dos motores que geram uma aceleração nula: $a = 0$, como o vetor: $f_o = (1, -1, 1, -1)$. Em outras palavras, o vetor f_o pertence ao núcleo de C_α .

Essa interessante observação nos permite expandir o raciocínio para resolver o problema de desperdício de energia. Note que se um vetor g pertence ao núcleo de C_α , então qualquer combinação de vetores f que inclua g produz a mesma aceleração que $f - g$, pois:

$$a = C_\alpha(f) = C_\alpha(f - g) + C_\alpha(g) = C_\alpha(f - g)$$

Como calculado anteriormente na seção 3.1, a dimensão Aplicando o teorema do posto-nulidade para C_α , temos:

$$\text{Rank}(C_\alpha) + \text{Ker}(C_\alpha) = \text{Dim}(\text{coluna})$$

Daí tiramos que $\text{Ker}(C_\alpha) = 1$, e portanto qualquer vetor no núcleo de C_α é da forma λf_k

4 Conclusão