

**Varianza:** Medida de dispersión que indica qué tan alejados están los datos respecto a su media aritmética, expresada en unidades al cuadrado.

**Desviación estándar:** Raíz cuadrada de la varianza; indica el alejamiento promedio de los datos con respecto a la media en la misma unidad original.

**Cuartiles:** Tres valores que dividen un conjunto de datos ordenados en cuatro partes iguales (25%, 50% y 75%).

**Deciles:** Nueve valores que dividen una serie de datos ordenados en diez partes iguales (del 10% al 90%).

**Coefficiente de variación:** Medida relativa de dispersión que permite comparar la variabilidad entre diferentes variables o conjuntos de datos, expresada generalmente en porcentaje.

**Muestral:** Referente a la muestra, es decir, al subconjunto representativo seleccionado a partir de una población total para realizar un estudio estadístico.

**Coefficiente de curtosis:** Medida estadística que determina el grado de concentración o apuntamiento de los datos alrededor de la región central de la distribución.

**Coefficiente de asimetría:** Indicador que evalúa si los datos se distribuyen de forma simétrica respecto a la media o si se inclinan hacia la derecha (positiva) o izquierda (negativa).

**Shapiro (Prueba de Shapiro-Wilk):** Test estadístico utilizado específicamente para verificar si un conjunto de datos (por lo general en muestras pequeñas,  $n < 50$ ) proviene de una distribución normal.

**Prueba de normalidad:** Procedimiento o prueba de hipótesis estadística para determinar si una muestra de datos proviene de una población con distribución normal.