

រៀបចំប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង៖

វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យា (វិទ្យាសាស្ត្រពិត)

រយៈពេល ១៥០នាទី

ពិន្ទុសរុប ១២៥ពិន្ទុ

មណ្ឌលប្រឡង

លេខបន្ទប់ លេខតុ

ឈ្មោះបេក្ខជន

ហត្ថលេខា

វិញ្ញាសា ១០

I គណនាលីមីតខាងក្រោម

ក $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{-x^2 + 2x + 3}{x^5 + 1}$

ខ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos ax)}{\ln(\cos bx)}$

គ $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1}{x+3} \right)^{x+1}$

ឃ $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$

II គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = 1 + i$ និង $z_2 = (\sqrt{3} + 1) + i(\sqrt{3} - 1)$ ។

ក សរសេរ $z = z_1 \times z_2$ ជាទម្រង់ពីជគណិត និងត្រីកោណមាត្រ។

ខ សរសេរ z_1, z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ រួចកំណត់ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃ z_2 ។

គ កំណត់ចំនួន n ដើម្បីឱ្យ z^n ជាចំនួននិមិត្តសុទ្ធ។

III ក្នុងក្រុមមួយមានប្អូលក្រហម 5 ខ្មៅ 7 និងខៀវ 8 គ្រាប់។ គេចាប់យកប្អូលពីរគ្រាប់ម្តងមួយៗ ដោយមិនដាក់ចូលវិញ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

A: ចាប់បានប្អូលក្រហមនៅលើកទី១ និងខៀវនៅលើកទី២។

B: ចាប់បានប្អូលពណ៌ដូចគ្នា។

C: ចាប់បានប្អូលពណ៌ខុសៗគ្នា។

IV ១ គណនាអាំងតេក្រាល $I = \int_2^4 \frac{x^2 dx}{x^2 - 2x + 2}$ និង $J = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} (\tan x - \cot x)^2 dx$ ។

២ គេឱ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) : $y'' - 2y' + y = \frac{4x-4}{e^x}$ និង (F) : $y'' - 2y' + y = 0$ ។

ក កំណត់ចំនួនពិត α, β ដើម្បីឱ្យ $g(x) = \frac{\alpha x + \beta}{e^x}$ ជាចម្លើយមួយនៃ (E) ។

ខ បង្ហាញថាបើ $f(x) = g(x) + h(x)$ ជាចម្លើយនៃ (E) នោះ $h(x)$ ជាចម្លើយនៃ (F) ។

គ ដោះស្រាយសមីការ (F) រួចទាញរកចម្លើយទូទៅនៃ (E) ។

V ក្នុងតម្រុយអវកាសមានទិសដៅវិជ្ជមាន $(\vec{0}, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេឱ្យប្លង់ (P) : $x + 2y + 2z - 4 = 0$ និងចំណុច $P(1, 2, 4)$ ។

ក កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់ (L) ដែលកាត់តាមចំណុច P ហើយកែងនឹងប្លង់ (P) ត្រង់ Q ។ រកកូអរដោនេចំណុច Q ។

ខ កំណត់សមីការស្វ៊ែរ (S) មានផ្ចិត P ហើយប៉ះទៅនឹងប្លង់ (P) ។

គ ប្លង់ (P) កាត់អ័ក្ស (ox), (oy) និង (oz) រៀងគ្នាត្រង់ A, B និង C ។ រកកូអរដោនេចំណុច A, B, C ។

ឃ គណនា $\vec{n} = \vec{AB} \times \vec{AC}$ រួចទាញរក S_{ABC} និង V_{PABC} ។

VI អ៊ីប៉េរូលមួយមានកំពូល $V_1(3, 0)$ និង $V_2(-3, 0)$ ហើយកាត់តាមចំណុច $P(5, 2)$ ។ សរសេរសមីការស្តង់ដារ រួចសង់អ៊ីប៉េរូល។

VII ១ គណនាដេរីវេទីមួយ និងទាញរកសញ្ញានៃអនុគមន៍ $g(x) = 2 \ln x - x^2 - 2$ ដែល $x > 0$ ដោយមិនបាច់រកលីមីតចុងដែនកំណត់។

២ គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = 1 - x - \frac{2 \ln x}{x}$; $x > 0$ ។

ក គណនា $f'(x)$ រួចទាញរកសញ្ញានៃ $f'(x)$ ។

ខ គណនាលីមីតចុងដែនកំណត់ រួចទាញរកអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C) តាងអនុគមន៍ f ។

គ បង្ហាញថាបន្ទាត់ (L) : $y = 1 - x$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C) ។

ឃ រកសមីការបន្ទាត់ (T) ប៉ះក្រាប (C) ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ (L) ។

ង គណនា $f(1)$ រួចសង់តារាងអថេរភាព f ។

ច) សង់ក្រាប (C) ; (L) និង (T) ក្នុងតម្រុយតែមួយ។ (គេឱ្យ $e = 2.7$; $\frac{2}{e} = 0.7$)

ឆ) គណនាផ្ទៃក្រឡាដែលបង្កប់ខណ្ឌដោយ (C) និង (L) នៅចន្លោះបន្ទាត់ $x = 1$, $x = e$ ។

ដំណោះស្រាយ

I ក) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{-x^2 + 2x + 3}{x^5 + 1} \quad \left(\text{រាងមិនកំណត់} \frac{0}{0} \right)$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{-x^2 + 2x + 3}{x^5 + 1} &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(-x+3)}{(x+1)(x^4 - x^3 + x^2 - x + 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{-x+3}{x^4 - x^3 + x^2 - x + 1} \\ &= \frac{-1+3}{(-1)^4 - (-1)^3 + (-1)^2 - (-1) + 1} \\ &= \frac{2}{1+1+1+1+1} \\ &= \frac{2}{5} \end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\boxed{\lim_{x \rightarrow -1} \frac{-x^2 + 2x + 3}{x^5 + 1} = \frac{2}{5}}$

ខ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos ax)}{\ln(\cos bx)} \quad \left(\text{រាងមិនកំណត់} \frac{0}{0} \right)$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos ax)}{\ln(\cos bx)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln\left(1 - 2\sin^2 \frac{ax}{2}\right)}{\ln\left(1 - 2\sin^2 \frac{bx}{2}\right)} \quad \left[\because \cos x = 1 - 2\sin^2 \frac{x}{2} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\ln\left(1 - 2\sin^2 \frac{ax}{2}\right)}{-2\sin^2 \frac{ax}{2}} \times \left(-2\sin^2 \frac{ax}{2}\right) \right] \cdot \left[\frac{-2\sin^2 \frac{bx}{2}}{\ln\left(1 - 2\sin^2 \frac{bx}{2}\right)} \times \frac{1}{-2\sin^2 \frac{bx}{2}} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[1 \cdot \left(-2\sin^2 \frac{ax}{2}\right) \right] \cdot \left(1 \cdot \frac{1}{-2\sin^2 \frac{bx}{2}} \right) \quad \left[\because \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+u)}{u} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{u}{\ln(1+u)} = 1 \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 \frac{ax}{2}}{\sin^2 \frac{bx}{2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin \frac{ax}{2}}{\sin \frac{bx}{2}} \right)^2 \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin \frac{ax}{2}}{\frac{ax}{2}} \cdot \frac{ax}{2} \cdot \frac{\frac{bx}{2}}{\sin \frac{bx}{2}} \cdot \frac{1}{\frac{bx}{2}} \right)^2 \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 \cdot \frac{ax}{2} \cdot 1 \cdot \frac{1}{\frac{bx}{2}} \right)^2 \\ &= \left(\frac{a}{b} \right)^2 \end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos ax)}{\ln(\cos bx)} = \left(\frac{a}{b} \right)^2}$

$$\textcircled{\text{គ}} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1}{x+3} \right)^{x+1} \quad (\text{រាងមិនកំណត់ } 1^\infty)$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1}{x+3} \right)^{x+1} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3-4}{x+3} \right)^{x+1} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-4}{x+3} \right)^{x+1} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{x+3}{-4}} \right)^{\frac{x+3}{-4} \cdot \frac{-4}{x+3} \cdot (x+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{x+3}{-4}} \right)^{\frac{x+3}{-4}} \right]^{\frac{-4(x+1)}{x+3}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{-4(x+1)}{x+3}} \quad \left[\because \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{u} \right)^u = e \text{ បើ } \lim_{x \rightarrow \infty} u = \infty \right] \\ &= e^{-4} \quad \left[\because \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-4(x+1)}{x+3} = -4 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \left(1 + \frac{1}{x} \right)}{x \left(1 + \frac{3}{x} \right)} = -4 \times 1 = -4 \right] \\ &= \frac{1}{e^4} \end{aligned}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1}{x+3} \right)^{x+1} = \frac{1}{e^4}}$$

$$\textcircled{\text{ឃ}} \lim_{x \rightarrow 0^+} x^x \quad (\text{រាងមិនកំណត់ } 0^0)$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} x^x &= \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\ln x^x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x \ln x} \\ &= e^0 \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$[\because a = e^{\ln a} ; a > 0]$$

$$[\because \ln a^n = n \ln a]$$

$$\left[\because \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \right]$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = 1}$$

II គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = 1 + i$ និង $z_2 = (\sqrt{3} + 1) + i(\sqrt{3} - 1)$

ក សរសេរ $z = z_1 \times z_2$ ជាទម្រង់ពីជគណិត និងត្រីកោណមាត្រ

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } z &= (1 + i) [(\sqrt{3} + 1) + i(\sqrt{3} - 1)] \\ &= (1 + i)(\sqrt{3} + 1) + (1 + i)(i\sqrt{3} - i) \\ &= \sqrt{3} + 1 + i\sqrt{3} + i + i\sqrt{3} - i - \sqrt{3} + 1 \\ &= 2 + 2i\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ហើយ } z &= 4 \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ &= 4 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) \end{aligned}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{z = 2 + 2i\sqrt{3} \text{ និង } z = 4 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)}$$

ខ) សរសេរ z_1 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ រួចកំណត់ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃ z_2

យើងមាន $z_1 = 1 + i$

$$\begin{aligned}\text{យើងបាន } z_1 &= \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \\ &= \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)\end{aligned}$$

ហើយ $z_1 \times z_2 = z$

$$\begin{aligned}\text{នាំឱ្យ } z_2 &= \frac{z}{z_1} \\ &= \frac{4 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)}{\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)} \\ &= \frac{4}{\sqrt{2}} \left[\cos \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right) \right] \\ &= 2\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12} \right)\end{aligned}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{z_1 = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) \text{ និង } z_2 = 2\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12} \right)}$$

គ) កំណត់ចំនួន n ដើម្បីឱ្យ z^n ជាចំនួននិមិត្តសុទ្ធ

$$\begin{aligned}\text{យើងបាន } z^n &= \left[4 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) \right]^n \\ &= 4^n \left(\cos \frac{n\pi}{3} + i \sin \frac{n\pi}{3} \right) \\ &= 4^n \cos \frac{n\pi}{3} + 4^n i \sin \frac{n\pi}{3}\end{aligned}$$

z^n ជាចំនួននិមិត្តសុទ្ធភាគណនាផ្នែកពិតស្មើសូន្យគឺ $4^n \cos \frac{n\pi}{3} = 0$

$$\cos \frac{n\pi}{3} = 0 \quad [\because 4^n > 0]$$

$$\Rightarrow \frac{n\pi}{3} = (2k-1) \frac{\pi}{2} \quad \left[\because \cos \alpha = 0 \Rightarrow \alpha = (2k-1) \frac{\pi}{2} ; k \in \mathbb{N} \right]$$

$$n = \frac{3}{2}(2k-1) \quad \left[\because \text{យើងយក } k \in \mathbb{N} \text{ ព្រោះថា } n \in \mathbb{N} \right]$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{n = \frac{3}{2}(2k-1) \text{ ដែល } k \in \mathbb{N}}$$

III) ចំនួនប៊ូលសរុបមាន $5 + 7 + 8 = 20$ គ្រាប់

ដោយគេចាប់យកប៊ូលពីរគ្រាប់ម្តងមួយៗ ដោយមិនដាក់ចូលវិញ

នោះយើងបាន៖

ការចាប់លើកទីមួយមាន 20 ករណី និងការចាប់លើកទីពីរមាន 19 ករណី

តាមគោលការណ៍ផលគុណ នាំឱ្យ $n(S) = 20 \times 19 = 380$

រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

A: ចាប់បានប៊ូលក្រហមនៅលើកទី១ និងខៀវនៅលើកទី២

ការចាប់បានប៊ូលក្រហមនៅលើកទី១មាន 5 ករណី ការចាប់បានប៊ូលខៀវនៅលើកទី២មាន 8 ករណី

យើងបាន $n(A) = 5 \times 8 = 40$

$$\text{នាំឱ្យ } P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{40}{380} = \frac{2}{19}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{P(A) = \frac{2}{19}}$$

B: ចាប់បានប៊ូលពណ៌ដូចគ្នាៗ

ការចាប់នេះមានបីករណីកើតឡើងដូចខាងក្រោម៖

- ចាប់បានប៊ូលក្រហមទាំងពីរ នោះ ចំនួនរបៀប $= 5 \times 4 = 20$
- ចាប់បានប៊ូលខ្មៅទាំងពីរ នោះ ចំនួនរបៀប $= 7 \times 6 = 42$
- ចាប់បានប៊ូលខៀវទាំងពីរ នោះ ចំនួនរបៀប $= 8 \times 7 = 56$

តាមគោលការណ៍ផលបូក នាំឱ្យ $n(B) = 20 + 42 + 56 = 118$

$$\text{យើងបាន } P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{118}{380} = \frac{59}{190}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{P(B) = \frac{59}{190}}$$

C: ចាប់បានប៊ូលពណ៌ខុសៗគ្នា

ការចាប់នេះមានប្រាំមួយករណីដូចខាងក្រោម៖

- ចាប់លើកទីមួយបានឃ្លីក្រហម និងលើកទីពីរបានឃ្លីខ្មៅ នោះ ចំនួនរបៀប $= 5 \times 7 = 35$
- ចាប់លើកទីមួយបានឃ្លីខ្មៅ និងលើកទីពីរបានឃ្លីក្រហម នោះ ចំនួនរបៀប $= 7 \times 5 = 35$
- ចាប់លើកទីមួយបានឃ្លីក្រហម និងលើកទីពីរបានឃ្លីខៀវ នោះ ចំនួនរបៀប $= 5 \times 8 = 40$
- ចាប់លើកទីមួយបានឃ្លីខៀវ និងលើកទីពីរបានឃ្លីក្រហម នោះ ចំនួនរបៀប $= 8 \times 5 = 40$
- ចាប់លើកទីមួយបានឃ្លីខ្មៅ និងលើកទីពីរបានឃ្លីខៀវ នោះ ចំនួនរបៀប $= 7 \times 8 = 56$
- ចាប់លើកទីមួយបានឃ្លីខៀវ និងលើកទីពីរបានឃ្លីខ្មៅ នោះ ចំនួនរបៀប $= 8 \times 7 = 56$

តាមគោលការណ៍ផលបូក នាំឱ្យ $n(C) = 35 + 35 + 40 + 40 + 56 + 56 = 262$

$$\text{យើងបាន } P(C) = \frac{262}{380} = \frac{131}{190}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{P(C) = \frac{131}{190}}$$

IV ១ គណនាអាំងតេក្រាល

$$\begin{aligned} I &= \int_2^4 \frac{x^2 dx}{x^2 - 2x + 2} \\ &= \int_2^4 \frac{(x^2 - 2x + 2) + (2x - 2)}{x^2 - 2x + 2} dx \\ &= \int_2^4 \left(1 + \frac{2x - 2}{x^2 - 2x + 2} \right) dx \\ &= \int_2^4 dx + \int_2^4 \frac{(2x - 2) dx}{x^2 - 2x + 2} \\ &= [x]_2^4 + \int_2^4 \frac{d(x^2 - 2x + 2)}{x^2 - 2x + 2} \\ &= (4 - 2) + \left[\ln |x^2 - 2x + 2| \right]_2^4 \\ &= 2 + (\ln |4^2 - 2 \times 4 + 2| - \ln |2^2 - 2 \times 2 + 2|) \\ &= 2 + (\ln 10 - \ln 2) \\ &= 2 + \ln \frac{10}{2} \\ &= 2 + \ln 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [\because d(x^2 - 2x + 2) &= (x^2 - 2x + 2)' dx = (2x - 2) dx] \\ \left[\because \int \frac{du}{u} &= \ln |u| \right] \end{aligned}$$

$$\left[\ln a - \ln b = \ln \frac{a}{b} \right]$$

$$\begin{aligned} J &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} (\tan x - \cot x)^2 dx \\ &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} (\tan^2 x - 2 \tan x \cdot \cot x + \cot^2 x) dx \\ &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} (\tan^2 x - 2 + \cot^2 x) dx \end{aligned}$$

$$[\because (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2]$$

$$[\because \tan x \cdot \cot x = 1]$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} [(1 + \tan^2 x) + (1 + \cot^2 x) - 4] dx \\
&= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} (1 + \tan^2 x) dx + \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} (1 + \cot^2 x) dx - 4 \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} dx \\
&= \left[\tan x \right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} - \left[\cot x \right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} - 4 \left[x \right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \\
&= \left(\tan \frac{\pi}{3} - \tan \frac{\pi}{6} \right) - \left(\cot \frac{\pi}{3} - \cot \frac{\pi}{6} \right) - 4 \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} \right) \\
&= \left(\sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{3} \right) - \left(\frac{\sqrt{3}}{3} - \sqrt{3} \right) - \frac{4\pi}{6} \\
&= 2\sqrt{3} - \frac{2\sqrt{3}}{3} - \frac{2\pi}{3} \\
&= \frac{6\sqrt{3} - 2\sqrt{3} - 2\pi}{3} \\
&= \frac{4\sqrt{3} - 2\pi}{3}
\end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\boxed{I = 2 + \ln 5 \text{ និង } J = \frac{4\sqrt{3} - 2\pi}{3}}$

២) គេឱ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) : $y'' - 2y' + y = \frac{4x-4}{e^x}$ និង (F) : $y'' - 2y' + y = 0$

ក) កំណត់ចំនួនពិត α, β ដើម្បីឱ្យ $g(x) = \frac{\alpha x + \beta}{e^x}$ ជាចម្លើយមួយនៃ (E)

$g(x)$ ជាចម្លើយមួយនៃ (E) : $y'' - 2y' + y = \frac{4x-4}{e^x}$ កាលណា $g''(x) - 2g'(x) + g(x) = \frac{4x-4}{e^x}$ (*)

ដោយ $g'(x) = \left(\frac{\alpha x + \beta}{e^x} \right)' = \frac{(\alpha x + \beta)'e^x - (\alpha x + \beta)(e^x)'}{(e^x)^2} \quad \left[\because \left(\frac{u}{v} \right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \right]$

$$= \frac{\alpha e^x - (\alpha x + \beta)e^x}{e^{2x}} = \frac{e^x(\alpha - \alpha x - \beta)}{e^{2x}} = \frac{\alpha - \alpha x - \beta}{e^x}$$

និង $g''(x) = \frac{(\alpha - \alpha x - \beta)'e^x - (\alpha - \alpha x - \beta)(e^x)'}{e^{2x}}$

$$= \frac{-\alpha e^x - (\alpha - \alpha x - \beta)e^x}{e^{2x}}$$

$$= \frac{-\alpha - \alpha + \alpha x + \beta}{e^x} \quad \left[\because \text{សម្រួលនឹង } e^x \right]$$

$$= \frac{\alpha x - 2\alpha + \beta}{e^x}$$

តាម (*) យើងបាន

$$\frac{\alpha x - 2\alpha + \beta}{e^x} - \frac{2(\alpha - \alpha x - \beta)}{e^x} + \frac{\alpha x + \beta}{e^x} = \frac{4x-4}{e^x}$$

$$\frac{4\alpha x - 4\alpha + 4\beta}{e^x} = \frac{4x-4}{e^x}$$

$$4\alpha x - 4\alpha + 4\beta = 4x - 4 \quad \left[\because \text{គុណអង្គទាំងពីរនឹង } e^x \right]$$

$$\alpha x - \alpha + \beta = x - 1 \quad \left[\because \text{ចែកអង្គទាំងពីរនឹង } 4 \right]$$

$$\text{នាំឱ្យ } \begin{cases} \alpha = 1 \\ -\alpha + \beta = -1 \end{cases} \quad \left[\because \text{ផ្អែមមេគុណត្រូវគ្នា} \right]$$

$$\text{នាំឱ្យ } \begin{cases} \alpha = 1 \\ \beta = 0 \end{cases}$$

ដូចនេះ: $\boxed{\alpha = 1 \text{ និង } \beta = 0}$

ខ) បង្ហាញថាបើ $f(x) = g(x) + h(x)$ ជាចម្លើយនៃ (E) នោះ $h(x)$ ជាចម្លើយនៃ (F)

$$f(x) \text{ ជាចម្លើយនៃ (E) កាលណា } f''(x) - 2f'(x) + f(x) = \frac{4x-4}{e^x}$$

$$\text{យើងបាន } [g(x) + h(x)]'' - 2[g(x) + h(x)]' + [g(x) + h(x)] = \frac{4x-4}{e^x}$$

$$g''(x) + h''(x) - 2g'(x) - 2h'(x) + g(x) + h(x) = \frac{4x-4}{e^x}$$

$$[h''(x) - 2h'(x) + h(x)] + [g''(x) - 2g'(x) + g(x)] = \frac{4x-4}{e^x}$$

$$h''(x) - 2h'(x) + h(x) + \frac{4x-4}{e^x} = \frac{4x-4}{e^x}$$

$$h''(x) - 2h'(x) + h(x) = 0 \quad (F)$$

នាំឱ្យ $h(x)$ ជាចម្លើយនៃសមីការ (F) : $y'' - 2y' + y = 0$

ដូចនេះ : បើ $f(x) = g(x) + h(x)$ ជាចម្លើយនៃ (E) នោះ $h(x)$ ជាចម្លើយនៃ (F)

គ) ដោះស្រាយសមីការ (F) រួចទាញរកចម្លើយទូទៅនៃ (E)

សមីការ (F) : $y'' - 2y' + y = 0$ មានសមីការសម្គាល់ $\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$

$$(\lambda - 1)^2 = 0$$

$$\lambda - 1 = 0$$

$$\lambda = 1 \quad (\text{ឫសឌុប})$$

នោះសមីការ (F) មានចម្លើយ $h(x) = (Ax + B)e^{\lambda x} = (Ax + B)e^x$ ដែល $A, B \in \mathbb{R}$

ហើយ $g(x)$ ជាចម្លើយមួយនៃសមីការ (E)

នាំឱ្យចម្លើយទូទៅនៃ (E) គឺ $f(x) = g(x) + h(x) = \frac{x}{e^x} + (Ax + B)e^x$

ដូចនេះ : ចម្លើយនៃ (F) គឺ $h(x) = (Ax + B)e^x$ និងចម្លើយទូទៅនៃ (E) គឺ $f(x) = \frac{x}{e^x} + (Ax + B)e^x$; $A, B \in \mathbb{R}$

V ក) កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់ (L) និងរកកូអរដោនេចំណុច Q

ប្លង់ (P) : $x + 2y + 2z - 4 = 0$ មានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n} = (1, 2, 2)$

ដោយ $(L) \perp (P)$ នោះ $\vec{n}$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ (P)

ហើយបន្ទាត់ (L) កាត់តាមចំណុច $P(1, 2, 4)$ នោះបន្ទាត់ (L) មានសមីការ
$$\begin{cases} x = t + 1 \\ y = 2t + 2 \\ z = 2t + 4 \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$$

ដូចនេះ : សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់ (L) :
$$\begin{cases} x = t + 1 \\ y = 2t + 2 \\ z = 2t + 4 \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$$

មួយវិញទៀត $Q \in (L) : \begin{cases} x = t + 1 \\ y = 2t + 2 \\ z = 2t + 4 \end{cases} \quad (1) \quad \text{ហើយ } Q \in (P) : x + 2y + 2z - 4 = 0 \quad (2)$

យក (1) ជំនួសចូល (2) យើងបាន $(t + 1) + 2(2t + 2) + 2(2t + 4) - 4 = 0$

$$t + 1 + 4t + 4 + 4t + 8 - 4 = 0$$

$$9t + 9 = 0$$

$$t = -1 \quad \text{ជំនួសចូល (1)}$$

តាម (1) យើងបាន
$$\begin{cases} x = -1 + 1 = 0 \\ y = 2(-1) + 2 = 0 \\ z = 2(-1) + 4 = 2 \end{cases} \implies Q(0, 0, 2)$$

ដូចនេះ : កូអរដោនេចំណុច Q គឺ $Q(0, 0, 2)$

- ខ) កំណត់សមីការស្វ៊ែរ (S) មានផ្ចិត P ហើយប៉ះទៅនឹងប្លង់ (P) ដោយប្លង់ (P) ប៉ះទៅនឹងស្វ៊ែរ (S) នោះកាំ R នៃស្វ៊ែរជាចម្ងាយពីចំណុច P(1, 2, 4) ទៅនឹងប្លង់ (P) : $x + 2y + 2z - 4 = 0$
- យើងបាន $R = \frac{|(1)(1) + (2)(2) + (4)(2) - 4|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}} = \frac{|1 + 4 + 8 - 4|}{\sqrt{1 + 4 + 4}} = \frac{9}{3} = 3$
- ស្វ៊ែរ (S) មានផ្ចិត P(1, 2, 4) មានកាំ R = 3 មានសមីការកំណត់ដោយ $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 4)^2 = 3^2$
- ដូចនេះ $\boxed{\text{សមីការស្វ៊ែរ (S) : } (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 4)^2 = 3^2}$

គ) រកកូអរដោនេចំណុច A, B, C

- ប្លង់ (P) កាត់ (ox) ត្រង់ A នោះ $y_A = 0$, $z_A = 0$ យកជំនួសចូលសមីការប្លង់ (P) យើងបាន

$$x_A + 2(0) + 2(0) - 4 = 0$$

$$x_A = 4$$

នាំឱ្យ A(4, 0, 0)

- ប្លង់ (P) កាត់ (oy) ត្រង់ B នោះ $x_B = 0$, $z_B = 0$ យកជំនួសចូលសមីការប្លង់ (P) យើងបាន

$$0 + 2y_B + 2(0) - 4 = 0$$

$$y_B = 2$$

នាំឱ្យ B(0, 2, 0)

- ប្លង់ (P) កាត់ (oz) ត្រង់ C នោះ $x_C = 0$, $y_C = 0$ យកជំនួសចូលសមីការប្លង់ (P) យើងបាន

$$0 + 2(0) + 2z_C - 4 = 0$$

$$z_C = 2$$

នាំឱ្យ C(0, 0, 2)

ដូចនេះ $\boxed{\text{កូអរដោនេចំណុច A(4, 0, 0) ; B(0, 2, 0) និង C(0, 0, 2)}}$

ឃ) គណនា $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ រួចទាញរក S_{ABC} និង V_{PABC}

យើងមាន $\overrightarrow{AB} = (0 - 4, 2 - 0, 0 - 0) = (-4, 2, 0)$

$\overrightarrow{AC} = (0 - 4, 0 - 0, 2 - 0) = (-4, 0, 2)$

យើងបាន $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -4 & 2 & 0 \\ -4 & 0 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} -4 & 0 \\ -4 & 2 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} -4 & 2 \\ -4 & 0 \end{vmatrix} \vec{k} = 4\vec{i} + 8\vec{j} + 8\vec{k}$

ដូចនេះ $\boxed{\vec{n} = 4\vec{i} + 8\vec{j} + 8\vec{k}}$

តាមរូបមន្ត $S_{ABC} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \frac{1}{2} \sqrt{4^2 + 8^2 + 8^2} = \frac{1}{2} \sqrt{144} = 6$

មួយវិញទៀត $V_{PABC} = \frac{1}{3} S_{ABC} \cdot h$

កម្ពស់ h នៃចតុមុខ PABC ជាចម្ងាយពីចំណុច P ទៅប្លង់ (ABC) ឬប្លង់ (P) មានន័យថាស្មើនឹងកាំ R នៃស្វ៊ែរ (S)

គឺ $h = R = 3 \implies V_{PABC} = \frac{1}{3} \times 6 \times 3 = 6$

ដូចនេះ $\boxed{S_{ABC} = 6 \text{ ឯកតាផ្ទៃ និង } V_{PABC} = 6 \text{ ឯកតាមាឌ}}$

VI សរសេរសមីការស្តង់ដារ រួចសង់អ៊ីពែបូល

ដោយអ៊ីពែបូលមានកំពូល $V_1(3, 0)$ និង $V_2(-3, 0)$ នោះអ៊ីពែបូលមានអ័ក្សទទឹងជាអ័ក្សដេក និងមានផ្ចិតលើគល់តម្រុយ

នាំឱ្យសមីការស្តង់ដារនៃអ៊ីពែបូលគឺ $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ដែល $a > b > 0$

ដោយអ៊ីពែបូលមានកំពូល $V(\pm a, 0)$ នោះ $a = 3$

យើងបាន $\frac{x^2}{3^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (*)$

មួយវិញទៀតអ៊ីពែបូលកាត់តាមចំណុច $P(5, 2)$

តាម (*) យើងបាន $\frac{5^2}{3^2} - \frac{2^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \left(\frac{2}{b}\right)^2 = \frac{25}{9} - 1$

$$\left(\frac{2}{b}\right)^2 = \frac{16}{9}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{b} = \frac{4}{3}$$


$$b = \frac{3}{2}$$

$$= 1.5$$

នោះសមីការស្តង់ដារអ៊ីពែបូលគឺ $\frac{x^2}{3^2} - \frac{y^2}{1.5^2} = 1$

ដូចនេះ: $\text{សមីការស្តង់ដារអ៊ីពែបូលគឺ } \frac{x^2}{3^2} - \frac{y^2}{1.5^2} = 1$

សំណាងអ៊ីពែបូល



VII ១ គណនាដេរីវេទីមួយ និងទាញរកសញ្ញានៃអនុគមន៍ g ដោយមិនបាច់រកលីមីតចុងដែនកំណត់

យើងមាន $g(x) = 2 \ln x - x^2 - 2$ ដែល $x > 0$

យើងបាន $g'(x) = (2 \ln x - x^2 - 2)'$

$$= \frac{2}{x} - 2x$$

$$= \frac{2 - 2x^2}{x}$$

$$= \frac{2(1 - x^2)}{x}$$

ដូចនេះ: $g'(x) = \frac{2(1 - x^2)}{x} ; \forall x > 0$

ចំពោះ $x > 0$ នោះ $g'(x)$ មានសញ្ញាដូច $1 - x^2$

យក $g'(x) = 0 \Rightarrow 1 - x^2 = 0 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$

យើងបានតារាងសញ្ញា $g'(x)$

x	0	-1	0	1	$+\infty$	
$g'(x)$	-	0	+	+	0	-

(តំបន់ពណ៌ប្រផេះនៅក្រៅដែនកំណត់នៃអនុគមន៍)

តាមតារាងសញ្ញាខាងលើឃើញថា

- $g'(x) = 0$ ពេល $x = 1$
- $g'(x) > 0$ ពេល $x \in (0, 1)$
- $g'(x) < 0$ ពេល $x \in (1, +\infty)$

ដោយអនុគមន៍ g ប្តូរសញ្ញាពី (+) ទៅ (-) ត្រង់ $x = 1$ នោះ g មានតម្លៃអតិបរមាធៀប $g(1) = 2 \ln 1 - 1^2 - 2 = -3$ តារាងអថេរភាព g

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$		+ 0 -	
$g(x)$		-3	

តាមតារាងអថេរភាពខាងលើ ឃើញថា $g(x) \leq -3$ នោះ $g(x) < 0$

ដូចនេះ $g(x) < 0$ ចំពោះគ្រប់ $x > 0$

២ គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = 1 - x - \frac{2 \ln x}{x}$; $x > 0$

ក គណនា $f'(x)$ រួចទាញរកសញ្ញានៃ $f'(x)$

$$\begin{aligned}
 \text{យើងបាន } f'(x) &= \left(1 - x - \frac{2 \ln x}{x}\right)' \\
 &= -1 - \frac{(2 \ln x)'x - (x)'(2 \ln x)}{x^2} \\
 &= -1 - \frac{\frac{2}{x} \cdot x - 2 \ln x}{x^2} \\
 &= -1 - \frac{2 - 2 \ln x}{x^2} \\
 &= \frac{-x^2 - 2 + 2 \ln x}{x^2} \\
 &= \frac{2 \ln x - x^2 - 2}{x^2}
 \end{aligned}$$

$$\text{ដូចនេះ } f'(x) = \frac{2 \ln x - x^2 - 2}{x^2} ; x > 0$$

ដោយ $x^2 > 0$ នោះ $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $2 \ln x - x^2 - 2 = g(x)$ នោះ $f'(x) < 0$

ដូចនេះ $f'(x) < 0$ ចំពោះគ្រប់ $x > 0$

ខ គណនាលីមីតចុងដែនកំណត់ រួចទាញរកអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C) តាងអនុគមន៍ f

$$\begin{aligned}
 \text{យើងបាន } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 - x - \frac{2 \ln x}{x}\right) \\
 &= 1 - 0 - (-\infty)
 \end{aligned}$$

$$\left[\because \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty \right]$$

$$\begin{aligned}
 &= +\infty \\
 \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - x - \frac{2 \ln x}{x} \right) \\
 &= 1 - (+\infty) - 0 \\
 &= -\infty
 \end{aligned}$$

$$\left[\because \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \right]$$

គ) បង្ហាញថាបន្ទាត់ (L) : $y = 1 - x$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C)

$$\begin{aligned}
 \text{ពិនិត្យ } \lim_{x \rightarrow +\infty} (y_C - y_L) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[1 - x - \frac{2 \ln x}{x} - (1 - x) \right] \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{2 \ln x}{x} \right) = 0
 \end{aligned}$$

ដូចនេះ បន្ទាត់ (L) : $y = 1 - x$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C)

ឃ) រកសមីការបន្ទាត់ (T) ប៉ះក្រាប (C) ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ (L)

ឧបមាថាបន្ទាត់ (T) ប៉ះទៅនឹងក្រាប (C) ត្រង់ចំណុចដែលមានអាប់ស៊ីស x_0

នោះមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ (T) គឺ $f'(x_0)$ ហើយ (T) ស្របនឹង (L) : $y = 1 - x = -x + 1$

យើងបាន $f'(x_0) = -1$

$$\frac{2 \ln x_0 - x_0^2 - 2}{x_0^2} = -1$$

$$2 \ln x_0 - x_0^2 - 2 = -x_0^2$$

$$2 \ln x_0 = 2$$

$$\ln x_0 = 1$$

$$x_0 = e \text{ ហើយ } f(e) = 1 - e - \frac{2 \ln e}{e} = 1 - e - \frac{2}{e}$$

នោះសមីការនៃ (T) គឺ $y = -1(x - e) + 1 - e - \frac{2}{e}$

$$= -x + e + 1 - e - 0.7 \quad \left[\because \frac{2}{e} = 0.7 \right]$$

$$= -x + 0.3$$

ដូចនេះ សមីការបន្ទាត់ប៉ះ (T) : $y = -x + 0.3$

ង) គណនា $f(1)$ រួចសង់តារាងអថេរភាព f

$$\text{យើងបាន } f(1) = 1 - 1 - \frac{2 \ln 1}{1} = 0$$


យើងបានតារាងអថេរភាព f

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		$\begin{array}{c} - \\ 0 \\ - \end{array}$	
$f(x)$	$+\infty$	$\begin{array}{c} \nearrow 0 \searrow \end{array}$	$-\infty$

ច) សង់ក្រាប (C) ; (L) និង (T) ក្នុងតម្រុយតែមួយ (គេឱ្យ $e = 2.7$; $\frac{2}{e} = 0.7$)

$$\text{បន្ទាត់ (L) : } y = 1 - x \quad \begin{array}{c|cc} x & 0 & 1 \\ \hline y & 1 & 0 \end{array}$$

$$\text{បន្ទាត់ (T) : } y = -x + 0.3 \quad \begin{array}{c|cc} x & 0 & 0.3 \\ \hline y & 0.3 & 0 \end{array}$$



៨) គណនាផ្ទៃក្រឡាប្លង់ខណ្ឌដោយ (C) និង (L) នៅចន្លោះបន្ទាត់ $x = 1$, $x = e$

$$\begin{aligned}
 \text{តាមរូបមន្ត} \quad S &= \int_1^e (y_L - y_C) dx & [\because L \text{ លើ } C] \\
 &= \int_1^e \frac{2 \ln x}{x} dx \\
 &= 2 \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx \\
 &= 2 \int_1^e \ln x d(\ln x) & [\because d(\ln x) = \frac{1}{x} dx] \\
 &= 2 \left[\frac{\ln^2 x}{2} \right]_1^e & [\because \int u du = \frac{u^2}{2}] \\
 &= [\ln^2 x]_1^e \\
 &= \ln^2 e - \ln^2 1 \\
 &= 1^2 - 0^2 \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

ដូចនេះ: ផ្ទៃក្រឡាប្លង់ខណ្ឌដោយក្រាប (C) និង (L) នៅចន្លោះបន្ទាត់ $x = 1$, $x = e$ គឺ $S = 1$ ឯកតាផ្ទៃ