

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង៖ ០៤ សីហា ២០១៤

វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យា (វិទ្យាសាស្ត្រពិត)

រយៈពេល ១៥០នាទី

ពិន្ទុសរុប ១២៥ពិន្ទុ

មណ្ឌលប្រឡង

លេខបន្ទប់ លេខតុ

ឈ្មោះបេក្ខជន

ហត្ថលេខា

វិញ្ញាសា ១១

I គណនាលីមីតខាងក្រោម

ក $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{2 \sin \left(x - \frac{\pi}{4} \right)}{\left(\frac{\pi}{4} - x \right)}$

ខ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin 5x}{\sqrt{5} - \sqrt{x+5}}$

គ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 3x}{-2x^2}$

ឃ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - x}{|x|}$

II គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = -1 + i\sqrt{3}$ និង $z_2 = -1 - i\sqrt{3}$ ។

ក គណនា $z_1 + z_2$; $z_1 - z_2$ និង $z_1 \cdot z_2$ ។

ខ សរសេរចំនួនកុំផ្លិច z_1 និង z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

គ បង្ហាញថា z_1 និង z_2 ជាឫសនៃសមីការ $z^3 - 8 = 0$ ។

III នៅក្នុងចុងមួយគេមានប៊ូល 12 ដែលគេសរសេរលេខពី 1 ដល់ 12។ គេចាប់យកប៊ូល 3 ចេញពីចុងព្រមគ្នាដោយចៃដន្យ។

ក រកប្រូបាបដែល «គេចាប់បានប៊ូលទាំងបីមានលេខសុទ្ធតែចែកដាច់នឹង 3» ។

ខ រកប្រូបាបដែល «គេចាប់បានប៊ូលតែមួយគត់មានលេខចែកដាច់នឹង 3» ។

គ រកប្រូបាបដែល «គេចាប់បានប៊ូលមានលេខតាមលំដាប់កើនជាស្វ៊ីតនព្វន្តដែលមានផលសងរួម $d = 3$ » ។

IV f ជាអនុគមន៍កំណត់លើ $]0, +\infty[$ ដោយ $f(x) = x - 5 + \frac{8 \ln x}{x} + \frac{9}{x}$ និង C ជាក្រាបរបស់វា។

1. ក រក $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ។

ខ រក $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ ។

គ ស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ Δ ដែលមានសមីការ $y = x - 5$ ជាអាស៊ីមតូតនៃខ្សែកោង C នៅជិត $+\infty$ ។

ឃ កំណត់អាប៉ូស៊ីសនៃចំណុចប្រសព្វរវាង Δ និង C ។

2. ក បង្ហាញថាចំពោះគ្រប់ x នៅលើ $]0, +\infty[$ គេបាន $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$ ។

ខ សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f ដោយដឹងថាសមីការ $g(x) = 0$ មានចម្លើយ $x' = 1$ និង $x'' = \alpha$ ($1 < \alpha$) ។

V f ជាអនុគមន៍កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x) = 4 - x - 2e^{-x}$ ។ គេតាងដោយ C ជាក្រាបរបស់វា។

1. ក រក $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ។

ខ បង្ហាញថាបន្ទាត់ D មានសមីការ $y = -x + 4$ ជាអាស៊ីមតូតនៃខ្សែកោង C ។

គ តើខ្សែកោង C នៅលើឬក្រោមបន្ទាត់ D ចូរបញ្ជាក់។

ឃ ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាគ្រប់ចំនួនពិត x , $f(x) = \frac{4e^x - xe^x - 2}{e^x}$ ។

ង រក $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ (ប្រើលទ្ធផល $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$) ។

2. ក គណនា $f'(x)$ ។ សិក្សាអថេរភាពនៃ f ។ កំណត់តម្លៃពិតនៃអតិបរមារបស់ f ។

ខ A ជាចំណុចមួយនៅលើខ្សែកោង C ដែលមានអាប៉ូស៊ីស 0 ។ កំណត់សមីការបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង C ត្រង់ A ។

គ បង្ហាញថាសមីការ $f(x) = 0$ មានចម្លើយតែមួយគត់ដែលគេតាងដោយ β នៅចន្លោះ $[-1, 0]$ ។

I គណនាលីមីតខាងក្រោម

ក) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{2 \sin \left(x - \frac{\pi}{4} \right)}{\left(\frac{\pi}{4} - x \right)} \quad \left(\text{រាងមិនកំណត់ } \frac{0}{0} \right)$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{2 \sin \left(x - \frac{\pi}{4} \right)}{\left(\frac{\pi}{4} - x \right)} &= -2 \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin \left(x - \frac{\pi}{4} \right)}{x - \frac{\pi}{4}} \\ &= -2 \times 1 \\ &= -2 \end{aligned}$$

$$\left[\because \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin u}{u} = 1 \text{ បើ } \lim_{x \rightarrow a} u = 0 \right]$$

ដូចនេះ: $\boxed{\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{2 \sin \left(x - \frac{\pi}{4} \right)}{\left(\frac{\pi}{4} - x \right)} = -2}$

ខ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin 5x}{\sqrt{5} - \sqrt{x+5}} \quad \left(\text{រាងមិនកំណត់ } \frac{0}{0} \right)$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin 5x}{\sqrt{5} - \sqrt{x+5}} &= -2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{5} + \sqrt{x+5}) \sin 5x}{(\sqrt{5} - \sqrt{x+5})(\sqrt{5} + \sqrt{x+5})} \\ &= -2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{5} + \sqrt{x+5}) \sin 5x}{5 - (x+5)} \\ &= -2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{5} + \sqrt{x+5}) \sin 5x}{-x} \\ &= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \left(\sqrt{5} + \sqrt{x+5} \right) \cdot \frac{\sin 5x}{5x} \cdot (5) \\ &= 2(\sqrt{5} + \sqrt{5})(5) \\ &= 20\sqrt{5} \end{aligned}$$

$$[\because \text{គុណកន្សោមផ្លាស់}]$$

$$[\because (\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b}) = \sqrt{a}^2 - \sqrt{b}^2 = a - b]$$

គ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 3x}{-2x^2} \quad \left(\text{រាងមិនកំណត់ } \frac{0}{0} \right)$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 3x}{-2x^2} &= -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 3x}{x^2} \\ &= -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 3x}{3x} \times 3 \right)^2 \\ &= -\frac{1}{2} \cdot (1 \times 3)^2 \\ &= -\frac{9}{2} \end{aligned}$$

$$[\because \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \implies 1 - \cos^2 \alpha = \sin^2 \alpha]$$

ដូចនេះ: $\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 3x}{-2x^2} = -\frac{9}{2}}$

ឃ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - x}{|x|} \quad \left(\text{រាងមិនកំណត់ } \frac{0}{0} \right)$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x-1)}{|x|}$$

• ករណី $x \rightarrow 0^-$ នោះ $|x| = -x$

យើងបាន $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 - x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x(x-1)}{-x} = \frac{-1}{-1} = 1$

- ករណី $x \rightarrow 0^+$ នោះ $|x| = x$

$$\text{យើងបាន } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 - x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x(x-1)}{x} = \frac{-1}{1} = -1$$

$$\text{ដូចនេះ: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - x}{|x|} = \begin{cases} 1 & \text{បើ } x \rightarrow 0^- \\ -1 & \text{បើ } x \rightarrow 0^+ \end{cases}$$

II

ក គណនា $z_1 + z_2$; $z_1 - z_2$ និង $z_1 \cdot z_2$

យើងមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = -1 + i\sqrt{3}$ និង $z_2 = -1 - i\sqrt{3}$

យើងបាន $z_1 + z_2 = (-1 + i\sqrt{3}) + (-1 - i\sqrt{3})$

$$= -1 + i\sqrt{3} - 1 - i\sqrt{3}$$

$$= -2$$

$$z_1 - z_2 = (-1 + i\sqrt{3}) - (-1 - i\sqrt{3})$$

$$= -1 + i\sqrt{3} + 1 + i\sqrt{3}$$

$$= 2i\sqrt{3}$$

$$\text{និង } z_1 \cdot z_2 = (-1 + i\sqrt{3})(-1 - i\sqrt{3})$$

$$= (-1)^2 - (i\sqrt{3})^2 \quad [\because (a-b)(a+b) = a^2 - b^2]$$

$$= 1 + 3$$

$$= 4$$

$$\text{ដូចនេះ: } z_1 + z_2 = -2; z_1 - z_2 = 2i\sqrt{3} \text{ និង } z_1 \cdot z_2 = 4$$

ខ សរសេរចំនួនកុំផ្លិច z_1 និង z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ


$$\text{យើងបាន } z_1 = 2 \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$= 2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right)$$

$$\text{និង } z_2 = 2 \left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$= 2 \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right)$$

$$\text{ដូចនេះ: } z_1 = 2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right) \text{ និង } z_2 = 2 \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right)$$



គ បង្ហាញថា z_1 និង z_2 ជាឫសនៃសមីការ $z^3 - 8 = 0$

z_1 និង z_2 ជាឫសនៃសមីការ $z^3 - 8 = 0$ កាលណា $z_1^3 - 8 = 0$ និង $z_2^3 - 8 = 0$

$$\text{យើងបាន } z_1^3 = \left[2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right) \right]^3$$

$$= 8 (\cos 2\pi + i \sin 2\pi)$$

$$= 8(1 + 0)$$

$$= 8 \quad (\text{ពិត})$$

$$\left[\because \sin n\pi = 0; \cos n\pi = \begin{cases} 1 & \text{បើ } n \text{ គូ} \\ -1 & \text{បើ } n \text{ សេស} \end{cases} \quad \text{ចំពោះ } n \in \mathbb{Z} \right]$$

$$\text{និង } z_2^3 = \left[2 \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right) \right]^3$$

$$= 8 (\cos 4\pi + i \sin 4\pi)$$

$$= 8(1 + 0)$$

$$= 8 \quad (\text{ពិត})$$

នាំឱ្យ z_1 ; z_2 ជាឫសនៃសមីការ $z^3 - 8 = 0$

$$\text{ដូចនេះ: } z_1; z_2 \text{ ជាឫសនៃសមីការ } z^3 - 8 = 0$$

III តាង S ជាលំហសំណាកនៃពិសោធន៍ចៃដន្យនេះ

ដោយគេចាប់យកប៊ូល 3 គ្រាប់ចេញពីប៊ូលសរុប 12 គ្រាប់

យើងបាន $n(S) = C(12, 3) = \frac{12!}{(12-3)! \times 3!} = \frac{12!}{9! \times 3!} = \frac{12 \times 11 \times 10}{3 \times 2} = 220$

ក) កម្រិតប្រូបាបដែល «គេចាប់បានប៊ូលទាំងបីមានលេខស្តុកតែចែកដាច់នឹង 3» តាង A ជាព្រឹត្តិការណ៍នេះ

ប៊ូលដែលមានលេខចែកដាច់នឹង 3 មាន 3, 6, 9, 12 សរុប 4 ប៊ូល

បានន័យថាគេត្រូវចាប់ប៊ូល 3 ចេញពីប៊ូលទាំង 4 ខាងលើនេះ

យើងបាន $n(A) = C(4, 3) = 4$

នាំឱ្យ $P(A) = \frac{4}{220} = \frac{1}{55}$

ដូចនេះ: $P(A) = \frac{1}{55}$

ខ) កម្រិតប្រូបាបដែល «គេចាប់បានប៊ូលតែមួយគត់មានលេខចែកដាច់នឹង 3» តាង B ជាព្រឹត្តិការណ៍នេះ

គេត្រូវចាប់ប៊ូល 1 ចេញពីប៊ូលដែលមានលេខចែកដាច់នឹង 3 ទាំង 4 គ្រាប់ និងចាប់ប៊ូល 2 គ្រាប់បន្ថែមចេញពីប៊ូល 8 គ្រាប់ផ្សេងទៀត

យើងបាន $n(B) = C(4, 1) \times C(8, 2) = 4 \times \frac{8!}{(8-2)! \times 2!} = 4 \times \frac{8!}{6! \times 2!} = 4 \times \frac{8 \times 7}{2} = 112$

នាំឱ្យ $P(B) = \frac{112}{220} = \frac{28}{55}$

ដូចនេះ: $P(B) = \frac{28}{55}$

គ) កម្រិតប្រូបាបដែល «គេចាប់បានប៊ូលមានលេខតាមលំដាប់កើនជាស្មើគ្នាដែលមានផលសងរួម $d = 3$ »

តាង C ជាព្រឹត្តិការណ៍នេះ

បីចំនួនគត្តានោះរួមមាន (1, 4, 7); (2, 5, 8); (3, 6, 9); (4, 7, 10); (5, 8, 11); (6, 9, 12) នោះ $n(C) = 6$

យើងបាន $P(C) = \frac{6}{220} = \frac{3}{110}$

ដូចនេះ: $P(C) = \frac{3}{110}$

IV f ជាអនុគមន៍កំណត់លើ $]0, +\infty[$ ដោយ $f(x) = x - 5 + \frac{8 \ln x}{x} + \frac{9}{x}$ និង C ជាក្រាបរបស់វា។

1. ក) រក $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

យើងបាន $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - 5 + \frac{8 \ln x}{x} + \frac{9}{x} \right)$

$= +\infty - 5 + 0 + 0$

$= +\infty$

$\left[\because \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 ; \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \right]$

ដូចនេះ: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

ខ) រក $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$

យើងបាន $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x - 5 + \frac{8 \ln x}{x} + \frac{9}{x} \right)$

$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[x - 5 + \frac{1}{x} (8 \ln x + 9) \right]$

$= 0 - 5 + \infty(-\infty + 9)$

$= -\infty$

$\left[\because \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty ; \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \right]$

ដូចនេះ: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$

- គ) ស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ Δ ដែលមានសមីការ $y = x - 5$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃខ្សែកោង C នៅជិត $+\infty$

$$\text{ពិនិត្យ } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x - 5 + \frac{8 \ln x}{x} + \frac{9}{x} - (x - 5) \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{8 \ln x}{x} + \frac{9}{x} \right) = 0$$

នាំឱ្យបន្ទាត់ $\Delta : y = x - 5$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ C នៅជិត $+\infty$

ដូចនេះ: បន្ទាត់ $\Delta : y = x - 5$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ C នៅជិត $+\infty$

- ឃ) កំណត់អាប៉ូស៊ីសនៃចំណុចប្រសព្វរវាង Δ និង C

$$\text{ដោយ } \Delta : y = x - 5 \text{ និង } f(x) = x - 5 + \frac{8 \ln x}{x} + \frac{9}{x}$$

$$\text{យើងបាន } x - 5 + \frac{8 \ln x}{x} + \frac{9}{x} = x - 5$$

$$\frac{8 \ln x}{x} + \frac{9}{x} = 0$$

$$\frac{8 \ln x + 9}{x} = 0$$

$$8 \ln x + 9 = 0$$

$$8 \ln x = -9$$

$$\ln x = -\frac{9}{8}$$

$$\text{នាំឱ្យ } x = e^{-\frac{9}{8}} \quad [\because \ln a = b \Leftrightarrow a = e^b, a > 0]$$

ដូចនេះ: អាប៉ូស៊ីសនៃចំណុចប្រសព្វរវាង Δ និង C គឺ $x = e^{-\frac{9}{8}}$

2. ក) បង្ហាញថាចំពោះគ្រប់ x នៅលើ $]0, +\infty[$ គេបាន $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$

$$\text{យើងបាន } f'(x) = \left(x - 5 + \frac{8 \ln x}{x} + \frac{9}{x} \right)'$$

$$= 1 + \frac{(8 \ln x)'x - 8 \ln x(x)'}{x^2} - \frac{9}{x^2}$$

$$\left[\because \left(\frac{u}{v} \right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2}; \left(\frac{1}{x} \right)' = -\frac{1}{x^2} \right]$$

$$= 1 + \frac{8 - 8 \ln x}{x^2} - \frac{9}{x^2}$$

$$= \frac{x^2 + 8 - 8 \ln x - 9}{x^2}$$

$$= \frac{x^2 - 8 \ln x - 1}{x^2}$$

$$= \frac{g(x)}{x^2} \quad \text{ដែល } g(x) = x^2 - 8 \ln x - 1$$

ដូចនេះ: $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$ ដែល $g(x) = x^2 - 8 \ln x - 1$

- ខ) សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f ដោយដឹងថាសមីការ $g(x) = 0$ មានចម្លើយ $x' = 1$ និង $x'' = \alpha$ ($1 < \alpha$)

$$\text{ដោយ } f'(x) = \frac{g(x)}{x^2} \text{ ចំពោះ } x \in]0, +\infty[\text{ នោះ } f'(x) \text{ មានសញ្ញាដូច } g(x) = x^2 - 8 \ln x - 1$$

$$\text{យើងបាន } g'(x) = (x^2 - 8 \ln x - 1)'$$

$$= 2x - \frac{8}{x}$$

$$= \frac{2x^2 - 8}{x}$$

$$= \frac{2(x^2 - 4)}{x}$$

$$= \frac{2(x+2)(x-2)}{x}$$

$$\text{ចំពោះ } x \in]0, +\infty[\text{ នោះ } \frac{2(x+2)}{x} > 0 \implies g'(x) \text{ មានសញ្ញាដូច } x - 2$$

$$\text{យក } g'(x) = 0 \implies x - 2 = 0 \implies x = 2$$

យើងបានតារាងសញ្ញានៃ $g'(x)$ ដូចខាងក្រោម

x	0	2	$+\infty$	
$g'(x)$		-	0	+

ហើយ $g(2) = 2^2 - 8 \ln 2 - 1 = 3 - 8 \ln 2$

សមីការ $g(x) = 0$ មានចម្លើយ $x' = 1$ និង $x'' = \alpha$ ($1 < \alpha$) មានន័យថា $g(1) = 0$ និង $g(\alpha) = 0$ ($1 < \alpha$)

មួយវិញទៀត $g(e) = e^2 - 8 \ln e - 1 = e^2 - 9 < 0$

និង $g(4) = 4^2 - 8 \ln 4 - 1 = 15 - 16 \ln 2 > 0$

នាំឱ្យ $g(e) \cdot g(4) < 0$

នោះសមីការ $g(x) = 0$ មានឫសមួយនៅចន្លោះ $(e, 4)$ បានន័យថា $e < \alpha < 4 \Rightarrow \alpha > 2$

តារាងអថេរភាពនៃ $g(x)$

x	0	1	2	α	$+\infty$	
$g'(x)$		-	-	0	+	+
$g(x)$						

Diagram showing the sign of $g(x)$ between roots: $g(x) < 0$ for $x \in (0, 1) \cup (2, \alpha)$ and $g(x) > 0$ for $x \in (1, 2) \cup (\alpha, +\infty)$. Arrows indicate the sign change at roots 1, 2, and α .

តាមតារាងខាងលើយើងទាញបាន

- $g(x) > 0$ ពេល $x \in (0, 1) \cup (\alpha, +\infty)$
- $g(x) < 0$ ពេល $x \in (1, \alpha)$

យើងបានដឹងថា $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $g(x)$ និង $f(1) = 1 - 5 + \frac{8 \ln 1}{1} + \frac{9}{1} = 5$

យើងបានតារាងអថេរភាពនៃ $f(x)$ ដូចខាងក្រោម

x	0	1	α	$+\infty$		
$f'(x)$		+	0	-	0	+
$f(x)$						

$-\infty$ $\nearrow$ 5 $\searrow$ $f(\alpha)$ $\nearrow$ $+\infty$

V

1. ក) រក $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

យើងមាន $f(x) = 4 - x - 2e^{-x}$ កំណត់លើ $\mathbb{R}$

យើងបាន $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (4 - x - 2e^{-x})$

$= 4 - (+\infty) - 2(0)$

$= -\infty$

$\left[\because \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = 0 \right]$

ដូចនេះ: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$

ខ) បង្ហាញថាបន្ទាត់ D មានសមីការ $y = -x + 4$ ជាអាស៊ីមតូតនៃខ្សែកោង C

ពិនិត្យ $\lim_{x \rightarrow +\infty} [y_C - y_D] = \lim_{x \rightarrow +\infty} [4 - x - 2e^{-x} - (-x + 4)]$

$= \lim_{x \rightarrow +\infty} (-2e^{-x})$

$= 0$

ដូចនេះ: $\boxed{\text{បន្ទាត់ } D : y = -x + 4 \text{ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប } C \text{ ខាង } +\infty}$

គ) តើខ្សែកោង C នៅលើប្រភេទបន្ទាត់ D ចូរបញ្ជាក់

យើងមាន $y_C - y_D = -2e^{-x}$

ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$; $e^{-x} > 0 \implies -2e^{-x} < 0$ នោះ $y_C - y_D < 0$ មានន័យថាខ្សែកោង C នៅក្រោមបន្ទាត់ D ជានិច្ច

ដូចនេះ: $\boxed{\text{ខ្សែកោង } C \text{ នៅក្រោមបន្ទាត់ } D \text{ ជានិច្ច}}$

ឃ) ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាគ្រប់ចំនួនពិត x , $f(x) = \frac{4e^x - xe^x - 2}{e^x}$

យើងមាន $f(x) = 4 - x - 2e^{-x}$

យើងបាន $f(x) = 4 - x - \frac{2}{e^x} \quad \left[\because a^{-n} = \frac{1}{a^n} \right]$
 $= \frac{4e^x - xe^x - 2}{e^x} \quad \left[\because e^x \text{ ជាភាគបែងរួម} \right]$

ដូចនេះ: $\boxed{f(x) = \frac{4e^x - xe^x - 2}{e^x}; \forall x \in \mathbb{R}}$

ង) រក $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ (ប្រើលទ្ធផល $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$)

យើងបាន $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(4 - x - \frac{2}{e^x} \right)$
 $= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[4 - \frac{1}{e^x} (xe^x + 2) \right]$
 $= 4 - (+\infty)(0 + 2) \quad \left[\because \lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0; \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{e^x} = +\infty \right]$
 $= -\infty$

ដូចនេះ: $\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty}$

2. ក) គណនា $f'(x)$ សិក្សាអថេរភាពនៃ f និង កំណត់តម្លៃពិតនៃអតិបរមារបស់ f

យើងបាន $f'(x) = (4 - x - 2e^{-x})'$
 $= -1 + 2e^{-x}$
 $= -1 + \frac{2}{e^x}$
 $= \frac{-e^x + 2}{e^x}$

ដូចនេះ: $\boxed{f'(x) = \frac{-e^x + 2}{e^x}}$

ដោយ $e^x > 0$; $\forall x \in \mathbb{R}$ នោះ $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $-e^x + 2$

- $f'(x) = 0 \implies -e^x + 2 = 0 \implies e^x = 2 \implies x = \ln 2$
- $f'(x) > 0 \implies -e^x + 2 > 0 \implies e^x < 2 \implies x < \ln 2$
- $f'(x) < 0 \implies -e^x + 2 < 0 \implies e^x > 2 \implies x > \ln 2$

យើងបានតារាងសញ្ញានៃ $f'(x)$

x	$-\infty$	$\ln 2$	$+\infty$
$f'(x)$		$\begin{array}{c} + \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \end{array}$	$-$

តារាងអថេរភាពនៃ $f(x)$

x	$-\infty$	$\ln 2$	$+\infty$
$f'(x)$		$+$ 0 $-$	
$f(x)$		$-\infty \nearrow f(\ln 2) \searrow -\infty$	

តាមតារាងអថេរភាព f ខាងលើយើងបាន៖

- អនុគមន៍ f កើនចន្លោះ $(-\infty, \ln 2)$
- អនុគមន៍ f ចុះលើចន្លោះ $(\ln 2, +\infty)$
- ហើយតម្លៃបរិមាណនៃ f គឺ $f(\ln 2) = 4 - \ln 2 - 2e^{-\ln 2}$

$$\begin{aligned}
 &= 4 - \ln 2 - \frac{2}{e^{\ln 2}} \\
 &= 4 - \ln 2 - 1 \quad [\because e^{\ln a} = a] \\
 &= 3 - \ln 2
 \end{aligned}$$

- ខ) កំណត់សមីការបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង C ត្រង់ចំណុច A
 បន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង C ត្រង់ចំណុច A ដែលមានអាប់ស៊ីស 0 កំណត់ដោយ $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$

ដោយ $f'(0) = \frac{-e^0 + 2}{e^0} = 1$ និង $f(0) = 4 - 0 - 2e^0 = 2$ នាំឱ្យ $y = x + 2$

ដូចនេះ: សមីការបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង C ត្រង់ A គឺ $y = x + 2$

- គ) បង្ហាញថាសមីការ $f(x) = 0$ មានចម្លើយតែមួយគត់ដែលគេតាងដោយ β នៅចន្លោះ $[-1, 0]$
 តាមតារាងអថេរភាពខាងលើឃើញថា f កើនលើចន្លោះ $(-\infty, \ln 2)$ នោះ f ក៏កើនលើចន្លោះ $[-1, 0]$ ដែរ

ហើយ $f(-1) = 4 - (-1) - 2e^{-(-1)} = 4 + 1 - 2e = 5 - 2e < 0$

$f(0) = 4 - 0 - 2e^0 = 4 - 2 = 2 > 0$

នាំឱ្យ $f(-1) \cdot f(0) < 0$

(មានបកស្រាយរួចនៅវិញ្ញាសា ០៣)

នោះសមីការ $f(x) = 0$ មានចម្លើយតែមួយគត់តាង β នៅចន្លោះ $[-1, 0]$

ដូចនេះ: សមីការ $f(x) = 0$ មានចម្លើយតែមួយគត់តាង β នៅចន្លោះ $[-1, 0]$