

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង៖ ១៣ តុលា ២០១៤

វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យា (វិទ្យាសាស្ត្រពិត)

រយៈពេល ១៥០នាទី

ពិន្ទុសរុប ១២៥ពិន្ទុ

មណ្ឌលប្រឡង

លេខបន្ទប់ លេខតុ

ឈ្មោះបេក្ខជន

ហត្ថលេខា

វិញ្ញាសា ១២

I គណនាលីមីតខាងក្រោម

ក $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x^2 + x - 1}{x - 1}$

ខ $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x - 1}{1 + \sin x}$

គ $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x)$

ឃ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{-x} + e^x) \sin^2 x}{2x^2}$

ង $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln(x+2) - \ln x - \frac{2}{x+2} + \frac{1}{4} \right]$

II 1. គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = \sqrt{2}$; $z_2 = -i\sqrt{2}$ និង $z_3 = +i\sqrt{2}$ ។

ក គណនា $z_1 + z_2$; $z_1 + z_3$ និង $(z_1 + z_2)(z_1 + z_3)$ ។

ខ កំណត់ម៉ូឌុល និងអាក្យុយម៉ង់ $z_1 + z_2$; $z_1 + z_3$ និង $\left(\frac{z_1 + z_3}{z_1 + z_2} \right)^2$ ។

2. គណនា i^n ចំពោះតម្លៃនៃចំនួនគត់វិជ្ជាទីប $n \geq 1$ ។ ទាញយកតម្លៃ $i^{2015} - i^{2014}$ ។

III ក្នុងថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្សអាស៊ី 4 នាក់ សិស្សអាហ្វ្រិក 2 នាក់ និងសិស្សអឺរ៉ុប 3 នាក់។ គេរៀបចំសិស្សជាក្រុមស្វ័យសិក្សាក្នុងមួយក្រុមមានសិស្ស 3 នាក់ដោយចៃដន្យ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម៖

ក យ៉ាងតិចមានសិស្ស 2 នាក់ជាសិស្សអាស៊ី។

ខ យ៉ាងតិចមានសិស្ស 2 នាក់ជាសិស្សអឺរ៉ុប។

គ មានសិស្សម្នាក់ក្នុងមួយទ្វីប។

IV គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $I =]0, +\infty[$ ដោយ $f(x) = \frac{x + \ln x}{x^2}$ ។

A: h ជាអនុគមន៍កំណត់លើ I ដោយ $h(x) = -x + 1 - 2 \ln x$ ។ គណនា $h(1)$ និងសិក្សាអថេរភាពនៃ $h(x)$ ដោយមិនតម្រូវឱ្យគណនាលីមីតនៃ $h(x)$ ត្រង់ 0 និង $+\infty$ ឡើយ។

B: ក គណនាលីមីតនៃ $f(x)$ ត្រង់ 0 និង $+\infty$ ។

ខ គណនាដេរីវេ $f'(x)$ នៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។

គ បង្ហាញថាលើ I , $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $h(x)$ ។

ឃ ទាញរកអថេរភាពនៃ f លើ I និងសង់ក្រាប C នៃ $f(x)$ នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ។

V គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E) : y'' + 4y = x^2 + 2x - 1$ ។

A: រកអនុគមន៍ $f_1(x) = ax^2 + bx + c$ ជាចម្លើយនៃសមីការ (E) ។

B: បង្ហាញថាបើ $f(x)$ ជាចម្លើយនៃសមីការ (E) នោះ $f(x) - f_1(x)$ ជាចម្លើយនៃសមីការ $y'' + 4y = 0$ ។

VI A. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេមានចំណុច $A(2, 2, 1)$; $B(4, -2, 0)$; $C(3, 1, 1)$ និង $D(1, 5, 2)$ ។ បង្ហាញថា ABCD ជាប្រលេឡូក្រាម រួចរកផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាមនេះ។

B. រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច $A(2, 2, 1)$ និង $B(4, -2, 0)$ ។

C. រកសមីការប្លង់ដែលកាត់តាមចំណុច $A(2, 2, 1)$; $B(4, -2, 0)$; $D(1, 5, 2)$ ។

I គណនាលីមីតខាងក្រោម

$$\begin{aligned} \textcircled{ក} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x^2 + x - 1}{x - 1} & \quad \left(\text{រាងមិនកំណត់ } \frac{0}{0} \right) \\ \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x^2 + x - 1}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^3 - x^2) + (x - 1)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2(x - 1) + (x - 1)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cancel{(x - 1)}(x^2 + 1)}{\cancel{x - 1}} \\ &= 1^2 + 1 \\ &= 2 \end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\boxed{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x^2 + x - 1}{x - 1} = 2}$

$$\begin{aligned} \textcircled{ខ} \quad \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x - 1}{1 + \sin x} & \quad \left(\text{រាងមិនកំណត់ } \frac{0}{0} \right) \\ \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x - 1}{1 + \sin x} &= \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{(\sin x + 1)(\sin x - 1)}{\sin x + 1} \quad [\because a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)] \\ &= \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) - 1 \\ &= -1 - 1 \\ &= -2 \end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\boxed{\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x - 1}{1 + \sin x} = -2}$

$$\begin{aligned} \textcircled{គ} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x) & \quad \left(\text{រាងមិនកំណត់ } \infty - \infty \right) \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + x} + x}{(\sqrt{x^2 + x} - x)(\sqrt{x^2 + x} + x)} \quad [\because \text{គុណកន្សោមផ្លាស់}] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 \left(1 + \frac{1}{x}\right)} + x}{(\sqrt{x^2 + x})^2 - x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|x| \sqrt{1 + \frac{1}{x}} + x}{x^2 + x - x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \sqrt{1 + \frac{1}{x}} + x}{x} \quad [\because |x| = x \text{ បើ } x > 0] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1 \right)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1 \right) \\ &= \sqrt{1 + 0} + 1 \quad \left[\because \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \right] \\ &= 2 \end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x) = 2}$

$$\textcircled{\text{ឃ}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{-x} + e^x) \sin^2 x}{2x^2} \quad \left(\text{រាងមិនកំណត់ } \frac{0}{0} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{-x} + e^x) \sin^2 x}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x} + e^x}{2} \cdot \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2$$

$$= \frac{e^0 + e^0}{2} \cdot (1)^2$$

$$= 1$$

ដូចនេះ: $\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{-x} + e^x) \sin^2 x}{2x^2} = 1}$

$$\textcircled{\text{ង}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln(x+2) - \ln x - \frac{2}{x+2} + \frac{1}{4} \right] \quad \left(\text{រាងមិនកំណត់ } \infty - \infty \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln(x+2) - \ln x - \frac{2}{x+2} + \frac{1}{4} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln \left(\frac{x+2}{x} \right) - \frac{2}{x+2} + \frac{1}{4} \right] \quad \left[\because \ln a - \ln b = \ln \frac{a}{b} \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln \left(1 + \frac{2}{x} \right) - \frac{2}{x+2} + \frac{1}{4} \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln \left(1 + \frac{2}{x} \right) - \frac{2}{x+2} + \frac{1}{4} \right]$$

$$= \ln(1+0) - 0 + \frac{1}{4}$$

$$= \frac{1}{4}$$

$$\left[\because \frac{\text{លេខ}}{\text{អនន្ត}} = 0 \right]$$

ដូចនេះ: $\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln(x+2) - \ln x - \frac{2}{x+2} + \frac{1}{4} \right] = \frac{1}{4}}$

II 1. គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = \sqrt{2}$; $z_2 = -i\sqrt{2}$ និង $z_3 = i\sqrt{2}$

ក) គណនា $z_1 + z_2$; $z_1 + z_3$ និង $(z_1 + z_2)(z_1 + z_3)$

យើងបាន $z_1 + z_2 = \sqrt{2} + (-i\sqrt{2}) = \sqrt{2} - i\sqrt{2}$

$$z_1 + z_3 = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$$

និង $(z_1 + z_2)(z_1 + z_3) = (\sqrt{2} - i\sqrt{2})(\sqrt{2} + i\sqrt{2}) = (\sqrt{2})^2 - (i\sqrt{2})^2 = 2 + 2 = 4$

ដូចនេះ: $\boxed{z_1 + z_2 = \sqrt{2} - i\sqrt{2}; z_1 + z_3 = \sqrt{2} + i\sqrt{2} \text{ និង } (z_1 + z_2)(z_1 + z_3) = 4}$

ខ) កំណត់ម៉ូឌុល និងអាកុយម៉ង់ $z_1 + z_2$; $z_1 + z_3$ និង $\left(\frac{z_1 + z_3}{z_1 + z_2} \right)^2$

$$\bullet z_1 + z_2 = 2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 2 \left[\cos \left(-\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right]$$

ដូចនេះ: $\boxed{|z_1 + z_2| = 2; \arg(z_1 + z_2) = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi \text{ ដែល } k \in \mathbb{Z}}$


$$\bullet z_1 + z_3 = 2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 2 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

ដូចនេះ: $\boxed{|z_1 + z_3| = 2; \arg(z_1 + z_3) = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \text{ ដែល } k \in \mathbb{Z}}$

$$\bullet \frac{z_1 + z_3}{z_1 + z_2} = \frac{2 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)}{2 \left[\cos \left(-\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right]}$$

$$= \cos \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} \right)$$

$$= \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}$$



$$\begin{aligned}\text{នាំឱ្យ } \left(\frac{z_1 + z_3}{z_1 + z_2}\right)^2 &= \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}\right)^2 \\ &= \cos \pi + i \sin \pi\end{aligned}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \left|\left(\frac{z_1 + z_3}{z_1 + z_2}\right)^2\right| = 1 \text{ និង } \arg \left[\left(\frac{z_1 + z_3}{z_1 + z_2}\right)^2\right] = \pi + 2k\pi \text{ ដែល } k \in \mathbb{Z}$$

2. គណនា i^n ចំពោះតម្លៃនៃចំនួនគត់វិជ្ជមាន $n \geq 1$ រួចទាញយកតម្លៃ $i^{2015} - i^{2014}$

$$\text{យើងមាន } i^2 = -1$$

$$i^3 = i^2 \cdot i = -i$$

$$i^4 = i^2 \cdot i^2 = 1$$

$\vdots$

$$\text{ចំពោះគ្រប់ } k \in \mathbb{N} \text{ យើងបាន } i^{4k} = (i^4)^k = 1^k = 1$$

$$i^{4k+1} = i^{4k} \cdot i = i$$

$$i^{4k+2} = i^{4k} \cdot i^2 = -1$$

$$i^{4k+3} = i^{4k} \cdot i^3 = -i$$

$$\text{ដូចនេះ: } i^n = \begin{cases} 1 & \text{បើ } n = 4k \\ i & \text{បើ } n = 4k + 1 \\ -1 & \text{បើ } n = 4k + 2 \\ -i & \text{បើ } n = 4k + 3 \end{cases} \text{ ដែល } k \in \mathbb{N}$$

$$\text{មួយវិញទៀត } i^{2015} - i^{2014} = i^{4 \times 503 + 3} - i^{4 \times 503 + 2}$$

$$= -i - (-1)$$

$$= 1 - i$$

$$\text{ដូចនេះ: } i^{2015} - i^{2014} = 1 - i$$

III តាង S ជាលំហសំណាកនៃពិសោធន៍ចៃដន្យនេះ

ដោយគេជ្រើសរើសសិស្ស 3 នាក់ ចេញពីសិស្សសរុប 9 នាក់

$$\text{នោះយើងបាន } n(S) = C(9, 3) = \frac{9!}{(9-3)! \times 3!} = \frac{9!}{6! \times 3!} = \frac{9 \times 8 \times 7}{3 \times 2} = 12 \times 7$$

រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម៖

ក) យ៉ាងតិចមានសិស្ស 2 នាក់ជាសិស្សអាស៊ី តាង A ជាព្រឹត្តិការណ៍នេះ

ការជ្រើសរើសបានសិស្សយ៉ាងតិច 2 នាក់ជាសិស្សអាស៊ីមានពីរករណីដូចខាងក្រោម៖

- ជ្រើសរើសបានសិស្សអាស៊ី 2 នាក់ចេញពីសិស្សអាស៊ីសរុបទាំង 4 នាក់ និងសិស្ស 1 នាក់ទៀតចេញពីសិស្ស 5 នាក់នៃសិស្ស អាហ្វ្រិកនិងអឺរ៉ុប

$$\text{នោះ ចំនួនរបៀប} = C(4, 2) \times C(5, 1) = 6 \times 5 = 30$$

- ជ្រើសរើសបានសិស្សអាស៊ីទាំង 3 នាក់ចេញពីសិស្សអាស៊ីសរុបទាំង 4 នាក់

$$\text{នោះ ចំនួនរបៀប} = C(4, 3) = 4$$

$$\text{យើងបាន } n(A) = 30 + 4 = 34$$

$$\text{នាំឱ្យ } P(A) = \frac{34}{12 \times 7} = \frac{17}{42}$$

$$\text{ដូចនេះ: } P(A) = \frac{17}{42}$$

ខ) យ៉ាងតិចមានសិស្ស 2 នាក់ជាសិស្សអឺរ៉ុប

ការជ្រើសរើសបានសិស្សយ៉ាងតិច 2 នាក់ជាសិស្សអឺរ៉ុបមាន 2 ករណីដូចខាងក្រោម៖

- ជ្រើសរើសបានសិស្សអឺរ៉ុប 2 នាក់ចេញពីសិស្សអឺរ៉ុបសរុបទាំង 3 នាក់ និងសិស្ស 1 នាក់ទៀតចេញពីសិស្ស 6 នាក់នៃសិស្សអាស៊ី និងអាហ្វ្រិក

នោះ ចំនួនរបៀប = $C(3, 2) \times C(6, 1) = 3 \times 6 = 18$

- ជ្រើសរើសបានសិស្សអ៊ីប 3 នាក់ចេញពីសិស្សអ៊ីបទាំង 3 នាក់

នោះ ចំនួនរបៀប = $C(3, 3) = 1$

យើងបាន $n(B) = 18 + 1 = 19$

នាំឱ្យ $P(B) = \frac{19}{12 \times 7} = \frac{19}{84}$

ដូចនេះ $P(B) = \frac{19}{84}$

គ) មានសិស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃប

បានន័យថាគេត្រូវជ្រើសរើសសិស្សអាស៊ី 1 នាក់ចេញពីសិស្សអាស៊ីសរុបទាំង 4 នាក់ សិស្សអាហ្វ្រិច 1 នាក់ចេញពីសិស្សអាហ្វ្រិចសរុបទាំង 2 នាក់ និងសិស្សអឺរ៉ុប 1 ចេញពីសិស្សអឺរ៉ុបសរុបទាំង 3 នាក់

យើងបាន $n(C) = C(4, 1) \times C(2, 1) \times C(3, 1) = 4 \times 2 \times 3 = 24$

នាំឱ្យ $P(C) = \frac{24}{12 \times 7} = \frac{2}{7}$

ដូចនេះ $P(C) = \frac{2}{7}$

IV គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $I =]0, +\infty[$ ដោយ $f(x) = \frac{x + \ln x}{x^2}$

A: គណនា $h(1)$ និងសិក្សាអថេរភាពនៃ $h(x)$ ដោយមិនតម្រូវឱ្យគណនាលីមីតនៃ $h(x)$ ត្រង់ 0 និង $+\infty$ ឡើយ

យើងមាន $h(x) = -x + 1 - 2 \ln x$ កំណត់លើ $I =]0, +\infty[$

យើងបាន $h(1) = -1 + 1 - 2 \ln 1 = 0$

ហើយ $h'(x) = (-x + 1 - 2 \ln x)'$

$$= -1 - \frac{2}{x}$$

$$= -\frac{x+2}{x}$$

ចំពោះ $x \in I =]0, +\infty[$ នោះ $-\frac{x+2}{x} < 0 \implies h'(x) < 0$

តារាងអថេរភាពនៃ $h(x)$ ដូចខាងក្រោម

x	0	1	$+\infty$
$h'(x)$		— 0 —	—
$h(x)$		↘ 0 ↘	

តាមតារាងខាងលើឃើញថា

- $h(x) > 0$ ពេល $x \in (0, 1)$
- $h(x) < 0$ ពេល $x \in (1, +\infty)$

B: ក) គណនាលីមីតនៃ $f(x)$ ត្រង់ 0 និង $+\infty$

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{x + \ln x}{x^2} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} (x + \ln x) \\ &= +\infty(0 - \infty) \\ &= -\infty \end{aligned}$$

$$\left[\because \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} = +\infty ; \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \right]$$

$$\text{និង } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \ln x}{x^2}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} + \frac{\ln x}{x^2} \right) \\
&= 0 + 0 \\
&= 0
\end{aligned}$$

$$\left[\because \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 ; \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2} \right]$$

ដូចនេះ: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$ និង $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

ខ) គណនាដេរីវេ $f'(x)$ នៃអនុគមន៍ $f(x)$

$$\begin{aligned}
\text{ហើយ } f'(x) &= \left(\frac{x + \ln x}{x^2} \right)' \\
&= \frac{(x + \ln x)'x^2 - (x^2)'(x + \ln x)}{(x^2)^2} \quad \left[\because \left(\frac{u}{v} \right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \right] \\
&= \frac{\left(1 + \frac{1}{x} \right)x^2 - 2x(x + \ln x)}{x^4} \\
&= \frac{x^2 + x - 2x^2 - 2x \ln x}{x^4} \\
&= \frac{-x^2 + x - 2x \ln x}{x^4} \\
&= \frac{-x + 1 - 2 \ln x}{x^3}
\end{aligned}$$

ដូចនេះ: $f'(x) = \frac{-x + 1 - 2 \ln x}{x^3}$

គ) បង្ហាញថាលើ I , $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $h(x)$

$$\text{យើងមាន } f'(x) = \frac{-x + 1 - 2 \ln x}{x^3}$$

ចំពោះ $x \in (0, +\infty)$ នោះ $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $-x + 1 - 2 \ln x = h(x)$

ដូចនេះ: $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $h(x)$

ឃ) ទាញរកអថេរភាពនៃ f លើ I និងសង់ក្រាប C នៃ $f(x)$ នៅក្នុងតម្រុយអវត្តមានម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j})$


ដោយ $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $h(x)$ នោះយើងបាន

- $f'(x) = 0$ ពេល $x = 1$
- $f'(x) > 0$ ពេល $x \in (0, 1)$
- $f'(x) < 0$ ពេល $x \in (1, +\infty)$

$$\text{យើងបាន } f(1) = \frac{1 + \ln 1}{1^2} = 1$$

តារាងអថេរភាពនៃ f

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$-\infty$	1	0



V គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) : $y'' + 4y = x^2 + 2x - 1$

A: រកអនុគមន៍ $f_1(x) = ax^2 + bx + c$ ជាចម្លើយនៃសមីការ (E)

យើងបាន $f_1'(x) = 2ax + b$ និង $f_1''(x) = 2a$

$f_1(x)$ ជាចម្លើយនៃ (E) កាលណា $f_1''(x) + 4f_1(x) = x^2 + 2x - 1$ យើងបាន៖

$$2a + 4(ax^2 + bx + c) = x^2 + 2x - 1$$

$$2a + 4ax^2 + 4bx + 4c = x^2 + 2x - 1$$

$$4ax^2 + 4bx + (2a + 4c) = x^2 + 2x - 1$$

$$\text{នាំឱ្យ } \begin{cases} 4a = 1 \\ 4b = 2 \\ 2a + 4c = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1/4 \\ b = 1/2 \\ c = \frac{-1 - 2a}{4} = \frac{-1 - 1/2}{4} = -\frac{3/2}{4} = -\frac{3}{8} \end{cases} \Rightarrow f_1(x) = \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{3}{8}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{f_1(x) = \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{3}{8}}$$

B: បង្ហាញថាបើ $f(x)$ ជាចម្លើយនៃសមីការ (E) នោះ $f(x) - f_1(x)$ ជាចម្លើយនៃសមីការ $y'' + 4y = 0$

ដោយ $f(x)$ ជាចម្លើយនៃ (E) នោះ $f''(x) + 4f(x) = x^2 + 2x - 1$ (1)

ហើយ $f_1(x)$ ក៏ជាចម្លើយនៃ (E) នោះ $f_1''(x) + 4f_1(x) = x^2 + 2x - 1$ (2)

យក (1) - (2) យើងបាន $[f''(x) + 4f(x)] - [f_1''(x) + 4f_1(x)] = 0$

$$[f''(x) - f_1''(x)] + 4[f(x) - f_1(x)] = 0$$

$$[f(x) - f_1(x)]'' + 4[f(x) - f_1(x)] = 0$$

នាំឱ្យ $f(x) - f_1(x)$ ជាចម្លើយនៃសមីការ $y'' + 4y = 0$

ដូចនេះ: $\boxed{\text{បើ } f(x) \text{ ជាចម្លើយនៃសមីការ (E) នោះ } f(x) - f_1(x) \text{ ជាចម្លើយនៃសមីការ } y'' + 4y = 0}$

VI A. បង្ហាញថា ABCD ជាប្រលេឡូក្រាម រួចរកផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាមនេះ


គេមានចំណុច $A(2, 2, 1)$; $B(4, -2, 0)$; $C(3, 1, 1)$ និង $D(1, 5, 2)$

យើងបាន $\overrightarrow{AB} = (4-2, -2-2, 0-1) = (2, -4, -1)$

$\overrightarrow{DC} = (3-1, 1-5, 1-2) = (2, -4, -1)$

នាំឱ្យ $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

នាំឱ្យ $\begin{cases} AB \parallel DC \\ AB = DC \end{cases}$ នោះ ABCD ជាប្រលេឡូក្រាម



ដូចនេះ: $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម

យើងមាន $\overrightarrow{AB} = (2, -4, -1)$ និង $\overrightarrow{AD} = (1-2, 5-2, 2-1) = (-1, 3, 1)$

យើងបាន $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -4 & -1 \\ -1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4 & -1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = -\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$

តាមរូបមន្ត $S_{ABCD} = |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD}| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{1+1+4} = \sqrt{6}$

ដូចនេះ: $S_{ABCD} = \sqrt{6}$ ឯកតាផ្ទៃ

B. រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច $A(2, 2, 1)$ និង $B(4, -2, 0)$

បន្ទាត់ដែលកាត់តាម $A(2, 2, 1)$ និងមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\overrightarrow{AB} = (2, -4, -1)$ មានសមីការកំណត់ដោយ

$$\begin{cases} x = 2t + 2 \\ y = -4t + 2 \\ z = -t + 1 \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$$

ដូចនេះ: $\text{សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់គឺ} \begin{cases} x = 2t + 2 \\ y = -4t + 2 \\ z = -t + 1 \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$

C. រកសមីការប្លង់ដែលកាត់តាមចំណុច $A(2, 2, 1)$; $B(4, -2, 0)$; $D(1, 5, 2)$

ដោយប្លង់កាត់ចំណុច A, B, D នោះ $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD} = (-1, -1, 2)$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់

នោះសមីការនៃប្លង់កំណត់ដោយ $-(x-2) - (y-2) + 2(z-1) = 0$

$$-x + 2 - y + 2 + 2z - 2 = 0$$

$$-x - y + 2z + 2 = 0$$

ដូចនេះ: $\text{សមីការនៃប្លង់គឺ } -x - y + 2z + 2 = 0$