

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង៖ ២៤ សីហា ២០១៥

វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យា (វិទ្យាសាស្ត្រពិត)

រយៈពេល ១៥០នាទី

ពិន្ទុសរុប ១២៥ពិន្ទុ

មណ្ឌលប្រឡង

លេខបន្ទប់ លេខតុ

ឈ្មោះបេក្ខជន

ហត្ថលេខា

វិញ្ញាសា ១៣

- I** គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = -1 + i\sqrt{3}$ និង $z_2 = 1 - i\sqrt{3}$ ។
- ក គណនា $z_1 + z_2$; $z_1 - z_2$ និង $z_1 \times z_2$ ។
- ខ សរសេរជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃ $z_1 - z_2$ និង $z_1 \times z_2$ ។
- II** គណនាលីមីត
- ក $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{\sqrt{x} + 2 - 2}$
- ខ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{\sin^2 x}$
- គ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin 3x}{x}$
- III** ក្នុងស្បែងមួយមានប៊ូលស 3 ប៊ូលខៀវ 3 និងប៊ូលក្រហម 2។ គេចាប់យកប៊ូលម្តង 3 គ្រាប់ចេញពីស្បែងដោយចៃដន្យ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖
- ក A : យ៉ាងតិចមានប៊ូលពីរពណ៌ខៀវ។
- ខ B : ប៊ូលទាំងបីមានពណ៌ខុសៗគ្នា។
- IV** ១ គណនាអាំងតេក្រាល $I = \int_1^2 \left(\frac{x^2}{3} - \frac{x}{2} + 3 \right) dx$ ។
- ២ គេមានអនុគមន៍ $f(x) = -\frac{2-x}{(1-x)^2}$ ។ បង្ហាញថា $f(x) = -\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{x-1}$ ។ គណនា $K = \int_{-1}^0 f(x) dx$ ។
- V** A: គេមានវ៉ិចទ័រ $\vec{u} = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$; $\vec{v} = -\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$ និង $\vec{w} = \vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$ ។ រកវ៉ិចទ័រ
- ក $\vec{u} + \vec{v}$
- ខ $\vec{w} \times \vec{u}$
- គ $\vec{w} \times \vec{v}$
- B: រកសមីការស្តង់ដារអេលីបដែលកំណុំមួយជាចំណុចមានកូអរដោនេ $(-1, 0)$ និងកំពូលពីរទៀតមានកូអរដោនេ $(-3, 0)$ និង $(3, 0)$ ។ សង់អេលីបនេះ។
- VI** គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) : $y' + 2y = \frac{2e^{-x}}{1 + 2e^x}$ ។
- ក ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាអនុគមន៍ f ដែល $f(x) = e^{-2x} \ln(1 + 2e^x)$ ជាចម្លើយមួយនៃ (E) ។
- ខ បង្ហាញថាអនុគមន៍ ϕ ជាចម្លើយនៃ (E) លុះត្រាតែ $(\phi - f)$ ជាចម្លើយនៃ (F) : $y' + 2y = 0$ ។
- VII** A: គេឱ្យអនុគមន៍ g កំណត់លើ $(0, +\infty)$ ដោយ $g(x) = x^2 + \ln x$ ។
- ១ a: បង្ហាញថា g ជាអនុគមន៍កើនដាច់ខាតលើ $(0, +\infty)$ ។
- b: គណនា $g(1)$ ។
- ២ a: ទាញយកពីលទ្ធផលសំណួរទី១ បញ្ជាក់លទ្ធផលខាងក្រោម
- បើ $x \geq 1$ នោះ $x^2 + \ln x \geq 1$ បើ $0 < x \leq 1$ នោះ $x^2 + \ln x \leq 1$ ។
- b: កំណត់សញ្ញានៃកន្សោម $x^2 + \ln x - 1$ ពេល $x \in (0, +\infty)$ ។
- B: អនុគមន៍ f កំណត់លើ $(0, +\infty)$ ដោយ $f(x) = x + 1 - \frac{\ln x}{x}$ និងមានក្រាប (C) របស់វាក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ។
- ១ សិក្សាលីមីតនៃអនុគមន៍ f ត្រង់ 0 និង $+\infty$ (បើ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$) ។
- ២ បង្ហាញថាដេរីវេនៃ f គឺ $f'(x) = \frac{x^2 + \ln x - 1}{x^2}$ ។
- ៣ ប្រើលទ្ធផលសំណួរ A សិក្សាសញ្ញានៃ $f'(x)$ រួចសង់តារាងអថេរភាព f លើ $(0, +\infty)$ ។

- ៤ a: បង្ហាញថាបន្ទាត់ Δ មានសមីការ $y = x + 1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រូនៃ (C) ត្រង់ $+\infty$ ។
 b: សិក្សាទីតាំង (C) ធៀបនឹង Δ រួចបញ្ជាក់កូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ I រវាង (C) និង Δ ។ សង់ Δ និង (C) ។

ដំណោះស្រាយ

- I ក គណនា $z_1 + z_2$; $z_1 - z_2$ និង $z_1 \times z_2$

យើងមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = -1 + i\sqrt{3}$ និង $z_2 = 1 - i\sqrt{3}$

យើងបាន $z_1 + z_2 = (-1 + i\sqrt{3}) + (1 - i\sqrt{3}) = 0$

$$z_1 - z_2 = (-1 + i\sqrt{3}) - (1 - i\sqrt{3}) = -2 + 2i\sqrt{3}$$

$$\begin{aligned} z_1 \times z_2 &= (-1 + i\sqrt{3})(1 - i\sqrt{3}) \\ &= -1 + i\sqrt{3} + i\sqrt{3} - (i\sqrt{3})^2 \\ &= -1 + 2i\sqrt{3} + 3 \\ &= 2 + 2i\sqrt{3} \end{aligned}$$

ដូចនេះ $z_1 + z_2 = 0$; $z_1 - z_2 = -2 + 2i\sqrt{3}$ និង $z_1 \times z_2 = 2 + 2i\sqrt{3}$


- ខ សរសេរជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃ $z_1 - z_2$ និង $z_1 \times z_2$

យើងបាន $z_1 - z_2 = -2 + 2i\sqrt{3}$

$$\begin{aligned} &= 4 \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ &= 4 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right) \end{aligned}$$

និង $z_1 \times z_2 = 2 + 2i\sqrt{3}$

$$\begin{aligned} &= 4 \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ &= 4 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) \end{aligned}$$



ដូចនេះ $z_1 - z_2 = 4 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right)$ និង $z_1 \times z_2 = 4 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$

- II ក $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{\sqrt{x+2} - 2}$ (រាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{\sqrt{x+2} - 2} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^3 - 2^3)(\sqrt{x+2} + 2)}{(\sqrt{x+2} - 2)(\sqrt{x+2} + 2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x^2 + 2x + 4)(\sqrt{x+2} + 2)}{x + 2 - 4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\cancel{(x-2)}(x^2 + 2x + 4)(\sqrt{x+2} + 2)}{\cancel{(x-2)}} \\ &= \frac{(2^2 + 2(2) + 4)(\sqrt{2+2} + 2)}{1} \\ &= 48 \end{aligned}$$

ដូចនេះ $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{\sqrt{x+2} - 2} = 48$

[$\because$ គុណកន្សោមឆ្លាស់]

$$[\because a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)]$$

- ខ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin^2 x}$ (រាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{\sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-(1 - \cos x)}{1 - \cos^2 x}$$

$$[\because \cos^2 x + \sin^2 x = 1 \implies \sin^2 x = 1 - \cos^2 x]$$

$$\begin{aligned}
&= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{1 - \cos^2 x} \\
&= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cancel{1 - \cos x}}{(\cancel{1 - \cos x})(1 + \cos x)} \\
&= -\frac{1}{1 + \cos 0} \\
&= -\frac{1}{2}
\end{aligned}$$

$$[\because a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)]$$

ដូចនេះ: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{\sin^2 x} = -\frac{1}{2}$

គ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin 3x}{x} \quad \left(\text{រាងមិនកំណត់ } \frac{0}{0} \right)$

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin 3x}{x} &= 3 \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 3x}{3x} \right) \cdot (3) \\
&= 3 \cdot (1) \cdot (3) \\
&= 9
\end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin 3x}{x} = 9$

III តាង S ជាលំហសំណាកនៃពិសោធន៍ចៃដន្យនេះ

ដោយគេចាប់យកប៊ូល 3 គ្រាប់ ចេញពីប៊ូលសរុបទាំង 8 គ្រាប់

យើងបាន $n(S) = C(8, 3) = \frac{8!}{(8-3)! \times 3!} = \frac{8!}{5! \times 3!} = \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2} = 56$

ក) A : យ៉ាងតិចមានប៊ូលពីរពណ៌ខៀវ

គេត្រូវចាប់យកប៊ូលខៀវឱ្យបាន 2 ឬ 3 គ្រាប់ នោះមានពីរករណីកើតឡើង

- ករណីចាប់យកបានប៊ូលខៀវ 2 គ្រាប់

គេត្រូវចាប់ឱ្យបានប៊ូលខៀវ 2 ចេញពីប៊ូលខៀវសរុបទាំង 3 និងប៊ូល 1 ទៀតចេញពីប៊ូលពណ៌សនិងក្រហមទាំង 5

យើងបានចំនួនរបៀប = $C(3, 2) \times C(5, 1) = 3 \times 5 = 15$

$$[\because C(n, 1) = n ; C(n, n-1) = n]$$

- ករណីចាប់បានប៊ូលខៀវទាំង 3 គ្រាប់

គេត្រូវចាប់ឱ្យយកប៊ូលខៀវ 3 ចេញពីប៊ូលខៀវសរុបទាំង 3

យើងបានចំនួនរបៀប = $C(3, 3) = 1$

នោះ: $n(A) = 15 + 1 = 16$

នាំឱ្យ $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{16}{56} = \frac{2}{7}$

ដូចនេះ: $P(A) = \frac{2}{7}$

ខ) B : ប៊ូលទាំងបីមានពណ៌ខុសៗគ្នា

គេត្រូវចាប់ឱ្យបានប៊ូលស 1 ខៀវ 1 និងក្រហម 1 ដែលចេញពីប៊ូលសសរុប 3 ប៊ូលខៀវសរុប 3 និងប៊ូលក្រហមសរុប 2 រៀងគ្នា

យើងបាន $n(B) = C(3, 1) \times C(3, 1) \times C(2, 1) = 3 \times 3 \times 2 = 18$

នាំឱ្យ $P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{18}{56} = \frac{9}{28}$

ដូចនេះ: $P(B) = \frac{9}{28}$

IV ១ គណនាអាំងតេក្រាល

យើងមាន $I = \int_1^2 \left(\frac{x^2}{3} - \frac{x}{2} + 3 \right) dx$

$$\begin{aligned}
 \text{យើងបាន } I &= \left[\frac{x^3}{9} - \frac{x^2}{4} + 3x \right]_1^2 \\
 &= \left(\frac{8}{9} - 1 + 6 \right) - \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{4} + 3 \right) \\
 &= \frac{7}{9} + \frac{1}{4} + 2 \\
 &= \frac{28 + 9 + 72}{36} \\
 &= \frac{109}{36}
 \end{aligned}$$

$$\left[\because \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} ; \int a dx = ax \right]$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{I = \frac{109}{36}}$$

២) បង្ហាញថា $f(x) = -\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{x-1}$ រួចគណនា $K = \int_{-1}^0 f(x) dx$

$$\text{យើងមានអនុគមន៍ } f(x) = -\frac{2-x}{(1-x)^2}$$

$$\begin{aligned}
 \text{យើងបាន } f(x) &= \frac{x-1-1}{(1-x)^2} \\
 &= \frac{x-1}{(1-x)^2} - \frac{1}{(1-x)^2} \\
 &= -\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{x-1}{(x-1)^2} \quad [\because (1-x)^2 = (x-1)^2] \\
 &= -\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{x-1}
 \end{aligned}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{f(x) = -\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{x-1}}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ម្យ៉ាងទៀត } K &= \int_{-1}^0 f(x) dx \\
 &= \int_{-1}^0 \left[-\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{x-1} \right] dx \\
 &= \left[\frac{1}{x-1} + \ln|x-1| \right]_{-1}^0 \quad \left[\because \int \frac{dx}{(x+a)^n} = -\frac{1}{(n-1)(x+a)^{n-1}} \quad (n \neq 1) ; \int \frac{dx}{x+a} = \ln|x+a| \right] \\
 &= \left(\frac{1}{0-1} + \ln|0-1| \right) - \left(\frac{1}{-1-1} + \ln|-1-1| \right) \\
 &= -1 + \ln 1 + \frac{1}{2} - \ln 2 \\
 &= -\frac{1}{2} - \ln 2
 \end{aligned}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{K = -\frac{1}{2} - \ln 2}$$

V A: គេមានវ៉ិចទ័រ $\vec{u} = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$; $\vec{v} = -\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$ និង $\vec{w} = \vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$
រកវ៉ិចទ័រ

ក) $\vec{u} + \vec{v} = (\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}) + (-\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k})$ ដូចនេះ: $\boxed{\vec{u} + \vec{v} = 0\vec{i} + \vec{j} + 4\vec{k}}$
 $= 0\vec{i} + \vec{j} + 4\vec{k}$

ខ) $\vec{w} \times \vec{u} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \vec{k}$
 $= 0\vec{i} - 4\vec{j} - 2\vec{k}$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{\vec{w} \times \vec{u} = 0\vec{i} - 4\vec{j} - 2\vec{k}}$$

$$\textcircled{គ} \quad \vec{w} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} \vec{k}$$

$$= 6\vec{i} - 0\vec{j} + 3\vec{k}$$

ដូចនេះ: $\boxed{\vec{w} \times \vec{v} = 6\vec{i} - 0\vec{j} + 3\vec{k}}$

B: រកសមីការស្តង់ដារអេលីប៊ីប រួចសង់អេលីប៊ីបនេះ

ដោយអេលីប៊ីបមានកំណុំមួយជាចំណុចមានកូអរដោនេ $(-1, 0)$ និងកំពូលពីរទៀតមានកូអរដោនេ $(-3, 0)$ និង $(3, 0)$


នោះអេលីប៊ីបមានសមីការស្តង់ដាររាង $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$

យើងបាន $\begin{cases} \text{កំណុំ} & F_1(h-c, k) \\ \text{កំពូល} & V_{1,2}(h \pm a, k) \end{cases}$ នាំឱ្យ $\begin{cases} (h-c, k) = (-1, 0) \\ (h-a, k) = (-3, 0) \\ (h+a, k) = (3, 0) \end{cases}$ នាំឱ្យ $\begin{cases} k=0 \\ h-c=-1 \\ h-a=-3 \\ h+a=3 \end{cases}$ នាំឱ្យ $\begin{cases} k=0; h=0 \\ c=1; a=3 \end{cases}$

ម្យ៉ាងទៀត $a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{3^2 - 1^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$

នោះសមីការអេលីប៊ីបគឺ $\frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{(2\sqrt{2})^2} = 1$

ដូចនេះ: $\boxed{\text{សមីការអេលីប៊ីបគឺ } \frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{(2\sqrt{2})^2} = 1}$



VI ក ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាអនុគមន៍ f ដែល $f(x) = e^{-2x} \ln(1 + 2e^x)$ ជាចម្លើយមួយនៃ (E)

គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) : $y' + 2y = \frac{2e^{-x}}{1 + 2e^x}$

f ជាចម្លើយនៃ (E) កាលណា $f'(x) + 2f(x) = \frac{2e^{-x}}{1 + 2e^x}$

ដោយ $f'(x) = [e^{-2x} \ln(1 + 2e^x)]' = (e^{-2x})' \ln(1 + 2e^x) + e^{-2x} [\ln(1 + 2e^x)]'$ [$\because (uv)' = u'v + uv'$]

$= -2e^{-2x} \ln(1 + 2e^x) + e^{-2x} \cdot \frac{(1 + 2e^x)'}{1 + 2e^x}$ [$\because (e^u)' = u'e^u$; $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$]

$= -2e^{-2x} \ln(1 + 2e^x) + e^{-2x} \cdot \frac{2e^x}{1 + 2e^x}$

$= -2e^{-2x} \ln(1 + 2e^x) + \frac{2e^{-x}}{1 + 2e^x}$

នាំឱ្យ $f'(x) + 2f(x) = -2e^{-2x} \ln(1 + 2e^x) + \frac{2e^{-x}}{1 + 2e^x} + 2e^{-2x} \ln(1 + 2e^x)$

$$= \frac{2e^{-x}}{1+2e^x} \quad (\text{ពិត})$$

ដូចនេះ: f ជាចម្លើយមួយនៃ (E)

- ② បង្ហាញថាអនុគមន៍ ϕ ជាចម្លើយនៃ (E) លុះត្រាតែ $(\phi - f)$ ជាចម្លើយនៃ (F) : $y' + 2y = 0$
 យើងនឹងបង្ហាញពីករណីដូចខាងក្រោម៖

- បើ ϕ ជាចម្លើយនៃ (E) នោះ $(\phi - f)$ ជាចម្លើយ (F) : $y' + 2y = 0$

$$\text{ដោយ } \phi \text{ ជាចម្លើយនៃ (E) នោះ } \phi' + 2\phi = \frac{2e^{-x}}{1+2e^x} \quad (1)$$

$$\text{ហើយ } f \text{ ក៏ជាចម្លើយនៃ (E) ដែរគឺ } f' + 2f = \frac{2e^{-x}}{1+2e^x} \quad (2)$$

$$\text{ដោយយក (1) - (2) យើងបាន } \phi' + 2\phi - (f' + 2f) = 0$$

$$(\phi' - f') + (2\phi - 2f) = 0$$

$$(\phi - f)' + 2(\phi - f) = 0 \quad (F)$$

នាំឱ្យ $\phi - f$ ជាចម្លើយនៃ (F)

- បើ $(\phi - f)$ ជាចម្លើយ (F) : $y' + 2y = 0$ នោះ ϕ ជាចម្លើយនៃ (E)

$$\text{បើ } (\phi - f) \text{ ជាចម្លើយ (F) : } y' + 2y = 0 \text{ នោះ } (\phi - f)' + 2(\phi - f) = 0$$

$$\phi' - f' + 2\phi - 2f = 0$$

$$(\phi' + 2\phi) - (f' + 2f) = 0$$

$$\phi' + 2\phi = f' + 2f$$

$$\phi' + 2\phi = \frac{2e^{-x}}{1+e^x} \quad [\because f \text{ ជាចម្លើយនៃ (E)}]$$

នាំឱ្យ ϕ ជាចម្លើយនៃ (E)

ដូចនេះ: អនុគមន៍ ϕ ជាចម្លើយនៃ (E) លុះត្រាតែ $\phi - f$ ជាចម្លើយនៃ (F)

VII

- A: ⑨ a: បង្ហាញថា g ជាអនុគមន៍កើនដាច់ខាតលើ $(0, +\infty)$

យើងមានអនុគមន៍ g កំណត់លើ $(0, +\infty)$ ដោយ $g(x) = x^2 + \ln x$

យើងបាន $g'(x) = (x^2 + \ln x)' = 2x + \frac{1}{x} = \frac{2x^2 + 1}{x} > 0$ ចំពោះគ្រប់ $x \in (0, +\infty)$

នាំឱ្យ g ជាអនុគមន៍កើនដាច់ខាតលើ $(0, +\infty)$

ដូចនេះ: g ជាអនុគមន៍កើនដាច់ខាតលើ $(0, +\infty)$

- b: គណនា $g(1)$

$$\text{យើងបាន } g(1) = 1^2 + \ln 1 = 1 + 0 = 1$$

$$\text{ដូចនេះ: } g(1) = 1$$

- ⑩ a: បញ្ជាក់លទ្ធផល បើ $x \geq 1$ នោះ $x^2 + \ln x \geq 1$ បើ $0 < x \leq 1$ នោះ $x^2 + \ln x \leq 1$
 តាមលទ្ធផលសំណួរទី១ យើងបានតារាងអថេរភាព g ដូចខាងក្រោម

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$		+ 0 +	
$g(x)$		1	

តាមតារាងខាងលើ យើងទាញបាន៖

- បើ $x \geq 1$ នោះ $g(x) \geq 1 \implies x^2 + \ln x \geq 1$

- បើ $0 < x \leq 1$ នោះ $g(x) \leq 1 \implies x^2 + \ln x \leq 1$

ដូចនេះ: បើ $x \geq 1$ នោះ $x^2 + \ln x \geq 1$ និង បើ $0 < x \leq 1$ នោះ $x^2 + \ln x \leq 1$

b: កំណត់សញ្ញានៃកន្សោម $x^2 + \ln x - 1$ ពេល $x \in (0, +\infty)$

តាមដំណោះស្រាយខាងលើគឺ៖

- បើ $x \geq 1$ នោះ $x^2 + \ln x \geq 1 \implies x^2 + \ln x - 1 \geq 0$

- បើ $0 < x \leq 1$ នោះ $x^2 + \ln x \leq 1 \implies x^2 + \ln x - 1 \leq 0$

ដូចនេះ: $\boxed{\text{បើ } x \geq 1 \text{ នោះ } x^2 + \ln x - 1 \geq 0 \text{ និង បើ } 0 < x \leq 1 \text{ នោះ } x^2 + \ln x - 1 \leq 0}$

B: អនុគមន៍ f កំណត់លើ $(0, +\infty)$ ដោយ $f(x) = x + 1 - \frac{\ln x}{x}$ និងមានក្រាប (C) របស់វាក្នុងតម្រុយអរតូណមេ $(O, \vec{i}, \vec{j})$

១ សិក្សាលីមីតនៃអនុគមន៍ f ត្រង់ 0 និង $+\infty$ (បើ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x + 1 - \frac{\ln x}{x} \right) \\ &= 0 + 1 - (-\infty) \quad \left[\because \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty \right] \\ &= +\infty \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x + 1 - \frac{\ln x}{x} \right) \\ &= +\infty + 1 - 0 \quad \left[\because \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \right] \\ &= +\infty \end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\boxed{\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty \text{ និង } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty}$

២ បង្ហាញថាដេរីវេនៃ f គឺ $f'(x) = \frac{x^2 + \ln x - 1}{x^2}$

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } f'(x) &= \left(x + 1 - \frac{\ln x}{x} \right)' \\ &= 1 - \frac{(\ln x)'x - (x)' \ln x}{x^2} \\ &= 1 - \frac{1 - \ln x}{x^2} \\ &= \frac{x^2 - 1 + \ln x}{x^2} \\ &= \frac{x^2 + \ln x - 1}{x^2} \end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\boxed{f'(x) = \frac{x^2 + \ln x - 1}{x^2}}$

៣ ប្រើលទ្ធផលសំណួរ A សិក្សាសញ្ញានៃ $f'(x)$ រួចសង់តារាងអថេរភាព f លើ $(0, +\infty)$

ដោយ $f'(x) = \frac{x^2 + \ln x - 1}{x^2}$ នោះ $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $x^2 + \ln x - 1$ ចំពោះ $x \in (0, +\infty)$

តាមលទ្ធផលសំណួរ A គឺ

- បើ $x \geq 1$ នោះ $x^2 + \ln x - 1 \geq 0 \implies f'(x) \geq 0$

- បើ $0 < x \leq 1$ នោះ $x^2 + \ln x - 1 \leq 0 \implies f'(x) \leq 0$

ដូចនេះ: $\boxed{\text{បើ } x \geq 1 \text{ នោះ } f'(x) \geq 0 \text{ បើ } 0 < x \leq 1 \text{ នោះ } f'(x) \leq 0}$

$$\text{ហើយ } f(1) = 1 + 1 - \frac{\ln 1}{1} = 2 - 0 = 2$$

យើងបានតារាងអថេរភាព f ដូចខាងក្រោម

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$		$+\infty$	$+\infty$

៤ a: បង្ហាញថាបន្ទាត់ Δ មានសមីការ $y = x + 1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C) ត្រង់ $+\infty$

$$\begin{aligned} \text{ពិនិត្យ } \lim_{x \rightarrow +\infty} (y_c - y_\Delta) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x + 1 - \frac{\ln x}{x} - (x + 1) \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{\ln x}{x} \right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

នាំឱ្យបន្ទាត់ (Δ) : $y = x + 1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C) ត្រង់ $+\infty$

ដូចនេះ: បន្ទាត់ (Δ) : $y = x + 1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C) ត្រង់ $+\infty$

b: សិក្សាទីតាំង (C) ធៀបនឹង Δ រួចបញ្ជាក់កូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ I រវាង (C) និង Δ រួចសង់ Δ និង (C)

យើងមាន $y_c - y_\Delta = -\frac{\ln x}{x}$ ចំពោះ $x \in (0, +\infty)$ នោះ $y_c - y_\Delta$ មានសញ្ញាដូច $-\ln x$

- បើ $x = 1$ នោះ $-\ln x = 0$
- បើ $x > 1$ នោះ $\ln x > 0 \Rightarrow -\ln x < 0$
- បើ $0 < x < 1$ នោះ $\ln x < 0 \Rightarrow -\ln x > 0$

ដូចនេះ: (C) ប្រសព្វ (Δ) ត្រង់ $x = 1$, (C) នៅក្រោម (Δ) ពេល $x > 1$ និង (C) នៅលើ (Δ) ពេល $0 < x < 1$

បន្ទាត់ (Δ) : $y = x + 1$

