

គ្រឿងប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង៖

វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យា (វិទ្យាសាស្ត្រពិត)

រយៈពេល ១៥០នាទី

ពិន្ទុសរុប ១២៥ពិន្ទុ

មណ្ឌលប្រឡង

លេខបន្ទប់ លេខតុ

ឈ្មោះបេក្ខជន

ហត្ថលេខា

វិញ្ញាសា ០២

- I** គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = \frac{2\left(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12}\right)^2}{1 + i\sqrt{3}}$ និង $z_2 = (1 - i)x + (1 - y)(1 + i)$ ។
- ក សរសេរ z_1 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ រួចជាទម្រង់ពីជគណិត។
- ខ កំណត់ចំនួនពិត x, y ដើម្បីបាន $2\bar{z}_1 - (z_2 + y - 1) = 0$ ។
- II** គណនាលីមីតខាងក្រោម
- ក $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{1+x}{\sqrt{x^2+3}-2}$ ខ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2-x+2}{(e^x+2)(e^x-1)}$ គ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x-1}{x+3}\right)^{x+2}$
- III** ក ដោះស្រាយសមីការ (E) : $y'' + 5y' + 6y = 0$ ។
- ខ កំណត់ចម្លើយមួយនៃ (E) បើគេដឹងថាបន្ទាត់ (D) : $y = x - 1$ ប៉ះក្រាបនៃចម្លើយត្រង់ $x = 0$ ។
- IV** ប្រធានវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យានៃការប្រឡងមួយមានលំហាត់ពីជគណិត 6 និងធរណីមាត្រ 4 ។ បេក្ខជនម្នាក់ត្រូវធ្វើពីរលំហាត់ក្នុងចំណោមលំហាត់ទាំងអស់ទៅតាមជម្រើសរបស់ខ្លួន។
- ១ រកចំនួនករណីអាច។
- ២ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖
- ក A: សិស្សជ្រើសរើសបានលំហាត់ពីជគណិតទាំងពីរ។
- ខ B: សិស្សជ្រើសរើសបានលំហាត់ធរណីមាត្រទាំងពីរ។
- គ C: សិស្សជ្រើសរើសបានលំហាត់ប្រភេទខុសគ្នា។
- V** រកសមីការស្តង់ដារអេលីបដែលមានកំណុំ $F_1(0, 1)$; $F_2(4, 1)$ និងប្រវែងអ័ក្សធំស្មើ 10 ឯកតា។ សង់អេលីបនេះ។
- VI** ក្នុងតម្រុយមានទិសដៅវិជ្ជមាន $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេឱ្យចំណុច $A(0, 2, 2)$ និងបន្ទាត់ (D) ដែលមានសមីការ $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - t \\ z = 2 - t \end{cases}$
- ដែល $t \in \mathbb{R}$ ។
- ក បង្ហាញថាប្លង់ (P) : $x - y - z + 4 = 0$ កាត់តាម A ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ (D) ។
- ខ ប្លង់ (P) កាត់អ័ក្ស (ox), (oy) និង (oz) រៀងគ្នាត្រង់ M, N និង P ។ រកកូអរដោនេចំណុច M, N និង P ។ រួចសង់ចំណុចទាំងបីនេះក្នុងតម្រុយ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ។
- គ បង្ហាញថា MNP ជាត្រីកោណសម័ង្ស។
- ឃ គណនា $\overrightarrow{MP} \times \overrightarrow{MN}$ រួចទាញរកក្រឡាផ្ទៃនៃត្រីកោណ MNP ។
- VII** f ជាអនុគមន៍កំណត់ចំពោះ $x > 0$ ដោយ $f(x) = 2\left(1 - \frac{\ln x}{x}\right)$ ហើយមានក្រាប (C) ។
- ក គណនា $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ និង $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ។ ទាញរកអាស៊ីមតូតនៃ (C) ។
- ខ គណនា $f'(x)$ និងសិក្សាសញ្ញារបស់វា។ កំណត់តម្លៃបរិមាណនៃ f សង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។

- គ) កំណត់កូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ M រវាងក្រាប (C) និងអាស៊ីមតូតដេករបស់វា។ កំណត់សមីការបន្ទាត់ (L) ប៉ះនឹងក្រាប (C) ត្រង់ M ។
- ឃ) សង់ (C) និង (L) ក្នុងតម្រុយតែមួយ។ (យក $e = 2.7$; $\frac{2}{e} = 0.7$)
- ង) គណនាក្រឡាផ្ទៃប្លង់ខណ្ឌដោយក្រាប (C) និងអ័ក្ស (ox) លើចន្លោះ $[1, e]$ ។

ដំណោះស្រាយ

I ក) សរសេរ z_1 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ រួចជាទម្រង់ពីជគណិត

$$\text{យើងមាន } z_1 = \frac{2 \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12} \right)^2}{1 + i\sqrt{3}}$$

$$\text{យើងបាន } z_1 = \frac{2 \left(\cos \frac{2\pi}{12} + i \sin \frac{2\pi}{12} \right)}{2 \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right)}$$

$$[\because (\cos \alpha + i \sin \alpha)^n = \cos(n\alpha) + i \sin(n\alpha)]$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}}{\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}} \\ &= \cos \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{3} \right) \\ &= \cos \left(-\frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{6} \right) \end{aligned}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{z_1 = \cos \left(-\frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{6} \right)}$$

$$\text{ហើយ } z_1 = \cos \frac{\pi}{6} - i \sin \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$$

$$[\because \cos(-x) = \cos x ; \sin(-x) = -\sin x]$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{z_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i}$$

ខ) កំណត់ចំនួនពិត x, y ដើម្បីបាន $2\bar{z}_1 - (z_2 + y - 1) = 0$

$$\text{យើងមាន } z_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \implies \bar{z}_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \text{ និង } z_2 = (1-i)x + (1-y)(1+i)$$

$$[\because \overline{a \pm bi} = a \mp bi]$$

$$\text{យើងបាន } 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right) - [(1-i)x + (1-y)(1+i) + y - 1] = 0$$

$$\sqrt{3} + i - (x - xi + 1 + i - y - yi + y - 1) = 0$$

$$\sqrt{3} + i - (x - xi + i - yi) = 0$$

$$\sqrt{3} + i - x + xi - i + yi = 0$$

$$(\sqrt{3} - x) + (x + y)i = 0$$

$$\text{នាំឱ្យ } \begin{cases} \sqrt{3} - x = 0 \\ x + y = 0 \end{cases}$$

$$\left[\because a + bi = 0 \implies \begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \end{cases} \right]$$

$$\text{នាំឱ្យ } \begin{cases} x = \sqrt{3} \\ y = -\sqrt{3} \end{cases}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{x = \sqrt{3} \text{ និង } y = -\sqrt{3}}$$

II គណនាលីមីតខាងក្រោម

ក) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{1+x}{\sqrt{x^2+3}-2} \quad \left(\text{រាងមិនកំណត់} \frac{0}{0} \right)$

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow -1} \frac{1+x}{\sqrt{x^2+3}-2} &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(1+x)(\sqrt{x^2+3}+2)}{(\sqrt{x^2+3}-2)(\sqrt{x^2+3}+2)} \\
&= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(1+x)(\sqrt{x^2+3}+2)}{x^2+3-4} \\
&= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(1+x)(\sqrt{x^2+3}+2)}{x^2-1} \\
&= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\cancel{(x+1)}(\sqrt{x^2+3}+2)}{\cancel{(x+1)}(x-1)} \\
&= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x^2+3}+2}{x-1} \\
&= \frac{\sqrt{(-1)^2+3}+2}{-1-1} \\
&= \frac{4}{-2} \\
&= -2
\end{aligned}$$

[∴ គុណកន្សោមផ្លាស់]

$$[\because (a-b)(a+b) = a^2 - b^2]$$

ដូចនេះ: $\boxed{\lim_{x \rightarrow -1} \frac{1+x}{\sqrt{x^2+3}-2} = -2}$

ខ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2-x+2}{(e^x+2)(e^x-1)} \quad \left(\text{រាងមិនកំណត់} \frac{\infty}{\infty} \right)$

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2-x+2}{(e^x+2)(e^x-1)} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \left(1 - \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} \right)}{e^x \left(1 + \frac{2}{e^x} \right) e^x \left(1 - \frac{1}{e^x} \right)} \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2}{e^{2x}} \right) \cdot \frac{1 - \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}}{\left(1 + \frac{2}{e^x} \right) \left(1 - \frac{1}{e^x} \right)} \\
&= 0 \cdot \frac{1-0+0}{(1+0)(1-0)} \left[\because \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^{nx}} = 0 ; \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a}{e^{nx}} = 0 ; \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a}{x^n} = 0 \text{ ដែល } a \in \mathbb{R} ; n \in \mathbb{N} \right] \\
&= 0
\end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2-x+2}{(e^x+2)(e^x-1)} = 0}$

គ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x-1}{x+3} \right)^{x+2} \quad \left(\text{រាងមិនកំណត់} 1^\infty \right)$

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x-1}{x+3} \right)^{x+2} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{(x+3)-4}{x+3} \right]^{x+2} \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{-4}{x+3} \right)^{x+2} \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{x+3}{-4}} \right)^{x+2} \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{x+3}{-4}} \right)^{\frac{x+3}{-4} \cdot \frac{-4}{x+3}} \right]^{x+2} \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{x+3}{-4}} \right)^{\frac{-4(x+2)}{x+3}} \right]
\end{aligned}$$

$$\left[\because \frac{a}{b} = \frac{1}{\frac{b}{a}} \right]$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{-4(x+2)}{x+3}} \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{-4x(1+\frac{2}{x})}{x(1+\frac{3}{x})}} \\
&= e^{-4} \\
&= \frac{1}{e^4}
\end{aligned}$$

$$\left[\because \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[1 + \frac{1}{u(x)} \right]^{u(x)} = e \text{ បើ } \lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = +\infty \right]$$

ដូចនេះ: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x-1}{x+3} \right)^{x+2} = \frac{1}{e^4}$

III ក) ដោះស្រាយសមីការ (E) : $y'' + 5y' + 6y = 0$

សមីការសម្គាល់ $\lambda^2 + 5\lambda + 6 = 0$

$$(\lambda + 2)(\lambda + 3) = 0$$

$$\lambda + 2 = 0 \text{ ឬ } \lambda + 3 = 0$$

នាំឱ្យ $\lambda = -2$ ឬ $\lambda = -3$

យើងបានចម្លើយនៃ (E) គឺ $y = Ae^{-2x} + Be^{-3x}$ ដែល $A, B \in \mathbb{R}$

ដូចនេះ: ចម្លើយនៃសមីការ (E) គឺ $y = Ae^{-2x} + Be^{-3x}$ ដែល $A, B \in \mathbb{R}$

ខ) កំណត់ចម្លើយមួយនៃ (E)

ដោយយើងដឹងថាបន្ទាត់ (D) : $y = x - 1$ ប៉ះក្រាបនៃចម្លើយត្រង់ $x = 0$ យើងទាញបាន ដេរីវេទីមួយនៃចម្លើយរបស់ (E)

ជាមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ (D) នាំឱ្យ $y'_E(0) = 1$

ដោយ $y'_E = (Ae^{-2x} + Be^{-3x})' = -2Ae^{-2x} - 3Be^{-3x}$ [$\because (e^{nx})' = ne^{nx}$]

នាំឱ្យ $y'_E(0) = -2Ae^0 - 3Be^0 \Rightarrow -2A - 3B = 1$ (1)

មួយវិញទៀត $y_E(0) = y_D(0)$ នាំឱ្យ $Ae^0 + Be^0 = 0 - 1 \Rightarrow A + B = -1 \Rightarrow B = -A - 1$ (2)

យក (2) ជំនួសក្នុង (1) យើងបាន $-2A - 3(-A - 1) = 1$

$$-2A + 3A + 3 = 1$$

$$A = -2$$

តាម (2) $\Rightarrow B = -(-2) - 1 = 1$

$$\Rightarrow y = -2e^{-2x} + e^{-3x}$$

ដូចនេះ: ចម្លើយមួយនៃ (E) គឺ $y = -2e^{-2x} + e^{-3x}$

IV ៩) រកចំនួនករណីអាច

ដោយបេក្ខជនត្រូវធ្វើពីរលំហាត់ក្នុងចំណោមលំហាត់ទាំង 10

យើងបានចំនួនករណីអាច $n(S) = C(10, 2) = \frac{10!}{(10-2)! \times 2!} = \frac{10!}{8! \times 2!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times \dots \times 2 \times 1}{8 \times 7 \times \dots \times 2 \times 1 \times 2 \times 1} = \frac{10 \times 9}{2} = 45$

ដូចនេះ: ចំនួនករណីអាច $n(S) = 45$

២) រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍:

ក) A: សិស្សជ្រើសរើសបានលំហាត់ពីជគណិតទាំងពីរ

សិស្សត្រូវជ្រើសរើសលំហាត់ពីជគណិត 2 ចេញពីលំហាត់ពីជគណិតសរុបទាំង 6 លំហាត់

យើងបាន $n(A) = C(6, 2) = \frac{6!}{(6-2)! \times 2!} = \frac{6!}{4! \times 2!} = \frac{6 \times 5}{2} = 15$

នាំឱ្យ $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{15}{45} = \frac{1}{3}$

ដូចនេះ: $P(A) = \frac{1}{3}$

- ② B: សិស្សជ្រើសរើសបានលំហាត់ធរណីមាត្រទាំងពីរ
សិស្សត្រូវជ្រើសរើសលំហាត់ធរណីមាត្រ 2 ចេញពីលំហាត់ធរណីមាត្រសរុបទាំង 4 លំហាត់

$$\text{យើងបាន } n(B) = C(4, 2) = \frac{4!}{(4-2)! \times 2!} = \frac{4!}{2! \times 2!} = \frac{4 \times 3}{2} = 6$$

$$\text{នាំឱ្យ } P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{6}{45} = \frac{2}{15}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{P(B) = \frac{2}{15}}$$

- គ C: សិស្សជ្រើសរើសបានលំហាត់ប្រភេទខុសគ្នា
ដើម្បីជ្រើសរើសបានលំហាត់ប្រភេទខុសគ្នា សិស្សត្រូវ៖

ចាប់យកលំហាត់ពីជគណិត 1 ចេញពីលំហាត់ពីជគណិតសរុប 6 លំហាត់

ចាប់យកលំហាត់ធរណីមាត្រ 1 ចេញពីលំហាត់ធរណីមាត្រសរុប 4 លំហាត់

$$\text{យើងបាន } n(C) = C(6, 1) \times C(4, 1) = 6 \times 4 = 24$$

$$[\because C(n, 1) = n]$$

$$\text{នាំឱ្យ } P(C) = \frac{n(C)}{n(S)} = \frac{24}{45} = \frac{8}{15}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{P(C) = \frac{8}{15}}$$

V រកសមីការស្តង់ដា និងសង់អេលីបនេះ

ដោយអេលីបមានកំណុំ $F_1(0, 1)$; $F_2(4, 1)$ និងប្រវែងអ័ក្សធំស្មើ 10 ឯកតា នោះអេលីបនេះមានអ័ក្សធំជាអ័ក្សឈរ

យើងបានសមីការស្តង់ដាអេលីប $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$ ដែល $a > b > 0$

$$\text{ហើយ } \begin{cases} F_1(h-c, k) = (0, 1) \\ F_2(h+c, k) = (4, 1) \\ 2a = 10 \end{cases} \quad \text{នាំឱ្យ } \begin{cases} a = 5 \\ k = 1 \\ h-c = 0 \\ h+c = 4 \end{cases} \quad \text{នាំឱ្យ } \begin{cases} a = 5 \\ k = 1 \\ h = 2 \\ c = 2 \end{cases}$$

$$\text{មួយវិញទៀត } a^2 = b^2 + c^2 \text{ នាំឱ្យ } b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{25 - 4} = \sqrt{21}$$


$$\text{យើងបានសមីការស្តង់ដាអេលីប } \frac{(x-2)^2}{5^2} + \frac{(y-1)^2}{(\sqrt{21})^2} = 1$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{\text{សមីការស្តង់ដាអេលីប } \frac{(x-2)^2}{5^2} + \frac{(y-1)^2}{(\sqrt{21})^2} = 1}$$

តាមរយៈដំណោះស្រាយខាងលើយើងទាញបាន

ជួរត $(h, k) = (2, 1)$ កំពូលអ័ក្សធំ $(h \pm a, k) = (-3, 1); (7, 1)$ និងប្រវែងអ័ក្សតូច $2b = 2\sqrt{21}$

យើងបានសំណង់អេលីបដូចខាងក្រោម



- VI ក បង្ហាញថាប្លង់ (P) : $x - y - z + 4 = 0$ កាត់តាម A ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ (D)
 ប្លង់ (P) : $x - y - z + 4 = 0$ កាត់តាម A(0, 2, 2) កាលណា $x_A - y_A - z_A + 4 = 0$ យើងបាន៖
 $0 - 2 - 2 + 4 = 0$
 $0 = 0$ (ពិត)

នាំឱ្យប្លង់ (P) កាត់តាមចំណុច A

មួយវិញទៀតប្លង់ (P) : $x - y - z + 4 = 0$ មានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n} = (1, -1, -1)$ ឯបន្ទាត់ (D) : $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - t \\ z = 2 - t \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$

មានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{n} = (1, -1, -1)$ យើងសង្កេតឃើញថា $\vec{n} = \vec{n}$ នាំឱ្យ $\vec{n} \parallel \vec{n}$ ដោយ $\begin{cases} (P) \perp \vec{n} \\ (D) \parallel \vec{n} \end{cases} \Rightarrow (P) \perp (D)$


ដូចនេះ ប្លង់ (P) កាត់តាមចំណុច A ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ (D)

- ខ រកកូអរដោនេចំណុច M, N និង P រួចសង់ចំណុចទាំងបីនេះក្នុងតម្រុយ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

ប្លង់ (P) កាត់អ័ក្ស (ox), (oy) និង (oz) រៀងគ្នាត្រង់ M, N និង P

- ប្លង់ (P) កាត់ (ox) ត្រង់ M នោះ $M(x_M, 0, 0)$ ហើយ $x_M - y_M - z_M + 4 = 0 \Rightarrow x_M = -4$ [$\because M \in (P)$]
- ប្លង់ (P) កាត់ (oy) ត្រង់ N នោះ $N(0, y_N, 0)$ ហើយ $x_N - y_N - z_N + 4 = 0 \Rightarrow y_N = 4$ [$\because N \in (P)$]
- ប្លង់ (P) កាត់ (oz) ត្រង់ P នោះ $P(0, 0, z_P)$ ហើយ $x_P - y_P - z_P + 4 = 0 \Rightarrow z_P = 4$ [$\because P \in (P)$]

ដូចនេះ $M(-4, 0, 0)$; $N(0, 4, 0)$ និង $P(0, 0, 4)$



- គ) បង្ហាញថា MNP ជាត្រីកោណសម័ង្ស
យើងមាន $M(-4, 0, 0)$; $N(0, 4, 0)$ និង $P(0, 0, 4)$

$$\text{យើងបាន } \begin{cases} \overrightarrow{MN} = (4, 4, 0) \\ \overrightarrow{MP} = (4, 0, 4) \\ \overrightarrow{NP} = (0, -4, 4) \end{cases} \quad \text{នាំឱ្យ } \begin{cases} MN = \sqrt{4^2 + 4^2 + 0^2} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2} \\ MP = \sqrt{4^2 + 0^2 + 4^2} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2} \\ NP = \sqrt{0^2 + (-4)^2 + 4^2} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2} \end{cases} \implies MN = MP = NP = 4\sqrt{2}$$

ដូចនេះ: $\triangle MNP$ ជាត្រីកោណសម័ង្ស

- ឃ) គណនា $\overrightarrow{MP} \times \overrightarrow{MN}$ រួចទាញរកក្រឡាផ្ទៃនៃត្រីកោណ MNP

$$\text{យើងបាន } \overrightarrow{MP} \times \overrightarrow{MN} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 4 & 0 & 4 \\ 4 & 4 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} \vec{k} = -16\vec{i} + 16\vec{j} + 16\vec{k}$$

$$\begin{aligned} \text{តាមរូបមន្ត } S_{MNP} &= \frac{1}{2} |\overrightarrow{MP} \times \overrightarrow{MN}| \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{(-16)^2 + 16^2 + 16^2} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{16^2 + 16^2 + 16^2} = \frac{1}{2} \sqrt{3 \times 16^2} \\ &= \frac{1}{2} \times 16\sqrt{3} \\ &= 8\sqrt{3} \end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\overrightarrow{MP} \times \overrightarrow{MN} = -16\vec{i} + 16\vec{j} + 16\vec{k}$ និង $S_{MNP} = 8\sqrt{3}$ ឯកតាផ្ទៃ

- VII ក) គណនា $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ និង $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ រួចទាញរកអាស៊ីមតូតនៃ (C)

យើងមាន $f(x) = 2 \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right)$ ចំពោះគ្រប់ $x > 0$

$$\text{យើងបាន } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 2 \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right) = 2[1 - (-\infty)] = +\infty \quad \left[\because \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty \right]$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right) = 2(1 - 0) = 2 \quad \left[\because \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \right]$$

ដូចនេះ: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ និង $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$

ដោយ $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ និង $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$

ដូចនេះ: បន្ទាត់ $x = 0$ និង $y = 2$ ជាអាស៊ីមតូតឈរ និងអាស៊ីមតូតដេករៀងគ្នានៃក្រាប (C) តំណាង f

- ខ) គណនា $f'(x)$ និងសិក្សាសញ្ញារបស់វា កំណត់តម្លៃបរិមាណនៃ f និង សង់តារាងអថេរភាពនៃ f

$$\text{យើងបាន } f'(x) = \left[2 \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right) \right]' = 2 \left[0 - \frac{(\ln x)'x - (x)' \ln x}{x^2} \right] \quad \left[\because \left(\frac{u}{v} \right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \right]$$

$$= 2 \left[-\frac{\left(\frac{1}{x}\right)x - \ln x}{x^2} \right] = -2 \cdot \frac{1 - \ln x}{x^2} = \frac{2(\ln x - 1)}{x^2}$$

ដូចនេះ: $f'(x) = \frac{2(\ln x - 1)}{x^2}; \forall x > 0$

ចំពោះគ្រប់ $x > 0$ នាំឱ្យ $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $\ln x - 1$

- $\ln x - 1 = 0 \Rightarrow \ln x = 1 \Rightarrow x = e$
- $\ln x - 1 > 0 \Rightarrow \ln x > 1 \Rightarrow x > e$
- $\ln x - 1 < 0 \Rightarrow \ln x < 1 \Rightarrow x < e$

យើងបានតារាងសញ្ញានៃ $f'(x)$ ដូចខាងក្រោម

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		-	+

ដោយ $f'(x)$ ប្តូរសញ្ញាពី - ទៅ + ត្រង់ $x = e$ នោះ f មានតម្លៃអប្បបរមាត្រង់ $x = e$ គឺ $f(e)$

យើងបាន $f(e) = 2 \left(1 - \frac{\ln e}{e} \right) = 2 \left(1 - \frac{1}{e} \right) = 2 - \frac{2}{e} = 2 - 0.7 = 1.3$

ដូចនេះ: តម្លៃបរមានៃ f គឺ $f(e) = 1.3$

តារាងអថេរភាពនៃ f

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		-	+
$f(x)$	$+\infty$	1.3	2

គ) កំណត់កូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ M រវាងក្រាប (C) និងអាស៊ីមតូតដេករបស់វា

តាង $M(x_M, y_M) \in (C)$ នាំឱ្យ $y_M = 2 \left(1 - \frac{\ln x_M}{x_M} \right)$ (*)

ហើយ M ក៏ជាចំណុចនៅលើអាស៊ីមតូតដេកនៃ (C) គឺ $y = 2$ នាំឱ្យ $y_M = 2$ យកជំនួសចូល (*) យើងបាន

$$\begin{aligned} 2 \left(1 - \frac{\ln x_M}{x_M} \right) &= 2 \\ 1 - \frac{\ln x_M}{x_M} &= 1 \\ -\frac{\ln x_M}{x_M} &= 0 \\ \frac{\ln x_M}{x_M} &= 0 \\ \text{នាំឱ្យ } \ln x_M &= 0 \quad [\because x_M > 0] \\ x_M &= 1 \end{aligned}$$

ដូចនេះ: កូអរដោនេចំណុច M គឺ $(1, 2)$

សមីការបន្ទាត់ (L) ប៉ះនឹងក្រាប (C) ត្រង់ $M(1, 2)$ កំណត់ដោយ $y = f'(1)(x - 1) + 2$

ដោយ $f'(x) = \frac{2(\ln x - 1)}{x^2}$ នាំឱ្យ $f'(1) = \frac{2(\ln 1 - 1)}{1^2} = -2$


យើងបាន $y = -2(x-1) + 2 = -2x + 4$

ដូចនេះ: សមីការបន្ទាត់ប៉ះក្រាប (C) ត្រង់ M គឺ (L) : $y = -2x + 4$

ឃ) សង់ (C) និង (L) ក្នុងតម្រុយតែមួយ (យក $e = 2.7, \frac{2}{e} = 0.7$)

បន្ទាត់ (L) : $y = -2x + 4$

x	0	2
y	4	0



ង) គណនាក្រឡាផ្ទៃប្លង់ខណ្ឌដោយក្រាប (C) និងអ័ក្ស (ox) លើចន្លោះ: $[1, e]$

$$\begin{aligned} \text{តាមរូបមន្ត} \quad S &= \int_1^e f(x) dx \\ &= \int_1^e 2 \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right) dx \\ &= 2 \int_1^e dx - 2 \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx \\ &= 2 [x]_1^e - 2 \int_1^e \ln x d(\ln x) \\ &= 2(e-1) - 2 \left[\frac{\ln^2 x}{2} \right]_1^e \\ &= 2(e-1) - (\ln^2 e - \ln^2 1) \\ &= 2e - 2 - (1 - 0) \\ &= 2e - 3 \\ &= (2 \times 2.7) - 3 \\ &= 2.4 \end{aligned}$$

$$\left[\begin{aligned} \because \int_a^b dx &= [x]_a^b ; d(\ln x) = \frac{1}{x} dx \\ \because \int u du &= \frac{u^2}{2} \end{aligned} \right]$$

$$[\because \ln e = 1 ; \ln 1 = 0]$$

ដូចនេះ: ក្រឡាផ្ទៃប្លង់ខណ្ឌដោយក្រាប (C) និងអ័ក្ស (ox) លើចន្លោះ: $[1, e]$ គឺ $S = 2.4$ ឯកតាផ្ទៃ

