

រៀបចំប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង៖

វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យា (វិទ្យាសាស្ត្រពិត)

រយៈពេល ១៥០នាទី

ពិន្ទុសរុប ១២៥ពិន្ទុ

មណ្ឌលប្រឡង

លេខបន្ទប់ លេខតុ

ឈ្មោះបេក្ខជន

ហត្ថលេខា

វិញ្ញាសា ០៤

I គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = \frac{\sqrt{2} + i\sqrt{6}}{2}$ និង $z_2 = 1 + i$ ។

- ក សរសេរ $Z = \frac{z_1}{z_2}$ ជាទម្រង់ $a + bi$ ។
- ខ ចូរសរសេរ z_1, z_2 និង Z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។
- គ រកតម្លៃប្រាកដនៃ $\cos \frac{\pi}{12}$ និង $\sin \frac{\pi}{12}$ ។

II ១ គណនាលីមីតខាងក្រោម

ក $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x} - \sqrt[3]{1-x}}{x}$

ខ $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{3}{1-x^3} - \frac{1}{1-x} \right)$

គ $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin x - \sqrt{3} \cos x}{\sin 3x}$

២ គេឱ្យអាំងតេក្រាល $I_\alpha = \int_0^{\sqrt{\alpha}} x^2 e^{-x^3} dx$; $\alpha > 0$ ។ គណនា I_α ជាអនុគមន៍នៃ α រួចគណនា $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} I_\alpha$ ។

III គេបោះគ្រាប់ឡកឡាក់ពីរគ្រាប់ដូចគ្នាព្រមគ្នាចំនួនម្តង។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

- ក A: បោះបានលេខគូទាំងពីរ
- ខ B: បោះបានលេខគូមួយ និងសេសមួយ
- គ C: បោះបានលេខមានផលបូកស្មើ 7
- ឃ D: បោះបានលេខមានផលបូកជាពហុគុណនៃ 3

IV គេឱ្យសមីការ (E) : $y'' + y' - 2y = 7 \cos x + \sin x$ ។

- ក ដោះស្រាយសមីការ (F) : $y'' + y' - 2y = 0$ ។
- ខ កំណត់ a, b ដើម្បីឱ្យ $g(x) = a \cos x + b \sin x$ ជាចម្លើយមួយនៃសមីការ (E) ។
- គ ទាញរកចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E) ។

V ១ រកសមីការអេលីបដែលមានផ្ចិត $(0, 0)$ និងអ័ក្សធំជាអ័ក្សដេក ហើយចំណុច $(3, 1)$ និង $(4, 0)$ បិតនៅលើអេលីបនេះ។

២ រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះអេលីប $4x^2 + y^2 = 0$ និងកាត់តាមចំណុច $(3, 0)$ ។

VI ក្នុងតម្រុយមានទិសដៅវិជ្ជមាន $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេឱ្យចំណុច $A(2, 2, 1)$; $B(3, 1, 1)$; $C(-2, 4, 5)$ និង $D(1, -1, 0)$ ។

- ក គណនា $\vec{BA} \times \vec{BC}$ រួចទាញថាចំណុច A, B, C រត់មិនត្រង់គ្នា ហើយគណនាក្រឡាផ្ទៃនៃត្រីកោណ ABC ។
- ខ កំណត់សមីការប្លង់ (ABC) ។
- គ គណនា $(\vec{BA} \times \vec{BC}) \cdot \vec{BD}$ រួចទាញរកមាឌតេត្រាអែត ABCD ។
- ឃ ទាញរកចម្ងាយពីចំណុច D ទៅប្លង់ (ABC) ។

VII ១ អនុគមន៍ f កំណត់ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ ដោយ $f(x) = (1-x)e^x - 1$ ។ គណនា $f'(x)$ រួចសង់តារាងអថេរភាព f ។ (មិនបាច់គណនាលីមីតចុងដែនកំណត់)

២ g ជាអនុគមន៍កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $g(x) = (2-x)e^x + 2 - x$ ។

ក គណនា $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x)$ ។ គណនា $g'(x)$ ។ ប្រើលទ្ធផលនៅសំណួរ ១ ចូរសង់តារាងអថេរភាព g ។

- ខ) បង្ហាញថាបន្ទាត់ (D) : $y = 2 - x$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) តាងអនុគមន៍ g ផ្នែក $-\infty$ ។
- គ) រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះក្រាប (C) ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ (D) ។
- ឃ) រកកូអរដោនេចំណុចរបស់នៃ (C) ។ សង់ក្រាប (C) ។

ដំណោះស្រាយ

I ក) សរសេរ $Z = \frac{z_1}{z_2}$ ជាទម្រង់ $a + bi$

យើងមាន $z_1 = \frac{\sqrt{2} + i\sqrt{6}}{2}$ និង $z_2 = 1 + i$

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } Z &= \frac{\frac{\sqrt{2} + i\sqrt{6}}{2}}{1 + i} \\ &= \frac{\sqrt{2} + i\sqrt{6}}{2(1 + i)} \\ &= \frac{(\sqrt{2} + i\sqrt{6})(1 - i)}{2(1 + i)(1 - i)} \\ &= \frac{\sqrt{2} - i\sqrt{2} + i\sqrt{6} - i^2\sqrt{6}}{2(1^2 - i^2)} \\ &= \frac{(\sqrt{6} + \sqrt{2}) + (\sqrt{6} - \sqrt{2})i}{4} \\ &= \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}i \end{aligned}$$

ដូចនេះ: $Z = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}i$

ខ) សរសេរ z_1, z_2 និង Z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } z_1 &= \frac{\sqrt{2} + i\sqrt{6}}{2} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{6}}{2} \\ &= \sqrt{2} \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) && [\because \text{ទាញ } \sqrt{2} \text{ ជាកត្តារួម}] \\ &= \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z_2 &= 1 + i \\ &= \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2} \right) && [\because |z_2| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}] \\ &= \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{និង } Z &= \frac{z_1}{z_2} \\ &= \frac{\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)}{\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)} \\ &= \cos \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right) \\ &= \cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12} \end{aligned}$$

ដូចនេះ: $z_1 = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$; $z_2 = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$ និង $Z = \cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12}$

គ) រកតម្លៃប្រាកដនៃ $\cos \frac{\pi}{12}$ និង $\sin \frac{\pi}{12}$

យើងមាន $Z = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} + i \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$ និង $Z = \cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12}$

យើងបាន $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} + i \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} = \cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12}$ នាំឱ្យ $\begin{cases} \cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \\ \sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \end{cases}$

ដូចនេះ $\cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$ និង $\sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$

II ១ គណនាលីមីតខាងក្រោម

ក $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x} - \sqrt[3]{1-x}}{x} \quad \left(\text{រាងមិនកំណត់} \frac{0}{0} \right)$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x} - \sqrt[3]{1-x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x} - 1 + 1 - \sqrt[3]{1-x}}{x}$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sqrt{1-x} - 1}{x} + \frac{1 - \sqrt[3]{1-x}}{x} \right)$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{(\sqrt{1-x} - 1)(\sqrt{1-x} + 1)}{x(\sqrt{1-x} + 1)} + \frac{(1 - \sqrt[3]{1-x}) [1 + \sqrt[3]{1-x} + (\sqrt[3]{1-x})^2]}{x [1 + \sqrt[3]{1-x} + (\sqrt[3]{1-x})^2]} \right]$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{(1-x) - 1}{x(\sqrt{1-x} + 1)} + \frac{1 - (1-x)}{x [1 + \sqrt[3]{1-x} + (\sqrt[3]{1-x})^2]} \right]$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{-x}{x(\sqrt{1-x} + 1)} + \frac{x}{x [1 + \sqrt[3]{1-x} + (\sqrt[3]{1-x})^2]} \right]$

$= \frac{-1}{\sqrt{1-0} + 1} + \frac{1}{1 + \sqrt[3]{1-0} + (\sqrt[3]{1-0})^2}$

$= -\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$

$= -\frac{1}{6}$

គុណកន្សោមផ្លាស់ និងកន្សោមបំពេញ

ដូចនេះ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x} - \sqrt[3]{1-x}}{x} = -\frac{1}{6}$

ខ $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{3}{1-x^3} - \frac{1}{1-x} \right) \quad \left(\text{រាងមិនកំណត់} \infty - \infty \right)$

$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{3}{1-x^3} - \frac{1}{1-x} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{3}{(1-x)(1+x+x^2)} - \frac{1}{1-x} \right]$

$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3 - (1+x+x^2)}{(1-x)(1+x+x^2)}$

$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3 - 1 - x - x^2}{(1-x)(1+x+x^2)}$

$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-x^2 - x + 2}{(1-x)(1+x+x^2)}$

$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(-x-2)}{(x-1)(1+x+x^2)}$

$= \frac{-1-2}{-(1+1+1)}$

$= \frac{-3}{-3}$

$= 1$

$[\because a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)]$

$[\because -x^2 - x + 2 = (x-1)(-x-2)]$

ដូចនេះ $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{3}{1-x^3} - \frac{1}{1-x} \right) = 1$

គ) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin x - \sqrt{3} \cos x}{\sin 3x} \quad \left(\text{រាងមិនកំណត់} \frac{0}{0} \right)$

ទាញ 2 ជាកត្តារួម

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin x - \sqrt{3} \cos x}{\sin 3x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{2 \left(\frac{1}{2} \sin x - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x \right)}{\sin(\pi - 3x)}$$

$$[\because \sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha]$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{2 \left(\cos \frac{\pi}{3} \sin x - \sin \frac{\pi}{3} \cos x \right)}{\sin 3 \left(\frac{\pi}{3} - x \right)}$$

$$\left[\because \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} ; \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{2 \sin \left(x - \frac{\pi}{3} \right)}{\sin 3 \left(\frac{\pi}{3} - x \right)}$$

$$[\because \sin a \cos b - \sin b \cos a = \sin(a - b)]$$

$$= 2 \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \underbrace{\frac{\sin \left(x - \frac{\pi}{3} \right)}{x - \frac{\pi}{3}}}_1 \times \underbrace{\frac{3 \left(\frac{\pi}{3} - x \right)}{\sin 3 \left(\frac{\pi}{3} - x \right)}}_1 \times \frac{x - \frac{\pi}{3}}{3 \left(\frac{\pi}{3} - x \right)}$$

$$= 2 \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{x - \frac{\pi}{3}}{-3 \left(x - \frac{\pi}{3} \right)}$$

$$= -\frac{2}{3}$$

ដូចនេះ

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin x - \sqrt{3} \cos x}{\sin 3x} = -\frac{2}{3}$$

២) គណនា I_α ជាអនុគមន៍នៃ α រួចគណនា $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} I_\alpha$

គេឱ្យអាំងតេក្រាល $I_\alpha = \int_0^{\sqrt{\alpha}} x^2 e^{-x^3} dx ; \alpha > 0$

យើងបាន $I_\alpha = \int_0^{\sqrt{\alpha}} \left(-\frac{1}{3} \right) (-3x^2 e^{-x^3} dx)$

$$= -\frac{1}{3} \int_0^{\sqrt{\alpha}} e^{-x^3} (-3x^2 dx)$$

$$= -\frac{1}{3} \int_0^{\sqrt{\alpha}} e^{-x^3} d(-x^3)$$

$$[\because d(-x^3) = (-x^3)' dx = -3x^2 dx]$$

$$= -\frac{1}{3} \left[e^{-x^3} \right]_0^{\sqrt{\alpha}}$$

$$\left[\because \int e^u du = e^u \right]$$

$$= -\frac{1}{3} \left(e^{-\sqrt{\alpha}^3} - e^{-0^3} \right)$$

$$= -\frac{1}{3} \left(e^{-\sqrt{\alpha^3}} - 1 \right)$$

$$= \frac{1}{3} \left(1 - e^{-\sqrt{\alpha^3}} \right)$$

ដូចនេះ

$$I_\alpha = \frac{1}{3} \left(1 - e^{-\sqrt{\alpha^3}} \right)$$

ហើយ $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} I_\alpha = \lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \frac{1}{3} \left(1 - e^{-\sqrt{\alpha^3}} \right)$


$$= \frac{1}{3} (1 - 0)$$

$$= \frac{1}{3}$$

$$\left[\because \lim_{\alpha \rightarrow +\infty} e^{-\sqrt{\alpha^3}} = e^{-\infty} = 0 \right]$$

ដូចនេះ: $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} I_\alpha = \frac{1}{3}$

- III តាង S ជាលំហសំណាកនៃពិសោធន៍ចៃដន្យនេះ
ដោយគេបោះគ្រាប់ឡកឡាក់ពីរគ្រាប់ដូចគ្នាព្រមគ្នាចំនួនម្តង នោះលទ្ធផលមិនគិតលំដាប់នោះទេ



យើងបាន $S = \{(1, 1); (1, 2); (1, 3); (1, 4); (1, 5); (1, 6); (2, 2); (2, 3); (2, 4); (2, 5); (2, 6); (3, 3); (3, 4); (3, 5); (3, 6); (4, 4); (4, 5); (4, 6); (5, 5); (5, 6); (6, 6)\}$

នាំឱ្យ $n(S) = 21$

រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

- ក A: បោះបានលេខគូទាំងពីរ

យើងបាន $A = \{(2, 2); (2, 4); (2, 6); (4, 4); (4, 6); (6, 6)\} \implies n(A) = 6$

នាំឱ្យ $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{6}{21} = \frac{2}{7}$

ដូចនេះ: $P(A) = \frac{2}{7}$

- ខ B: បោះបានលេខគូមួយ និងសេសមួយ

យើងបាន $B = \{(1, 2); (1, 4); (1, 6); (2, 3); (2, 5); (3, 4); (3, 6); (4, 5); (5, 6)\} \implies n(B) = 9$

នាំឱ្យ $P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{9}{21} = \frac{3}{7}$

ដូចនេះ: $P(B) = \frac{3}{7}$

- គ C: បោះបានលេខមានផលបូកស្មើ 7

យើងបាន $C = \{(1, 6); (2, 5); (3, 4)\} \implies n(C) = 3$

នាំឱ្យ $P(C) = \frac{n(C)}{n(S)} = \frac{3}{21} = \frac{1}{7}$

ដូចនេះ: $P(C) = \frac{1}{7}$

- ឃ D: បោះបានលេខមានផលបូកជាពហុគុណនៃ 3

យើងបាន $D = \{(1, 2); (1, 5); (2, 4); (3, 3); (3, 6); (4, 5); (6, 6)\} \implies n(D) = 7$

នាំឱ្យ $P(D) = \frac{7}{21} = \frac{1}{3}$

ដូចនេះ: $P(D) = \frac{1}{3}$

- IV ក ដោះស្រាយសមីការ (F) : $y'' + y' - 2y = 0$

សមីការសម្គាល់ $\lambda^2 + \lambda - 2 = 0 \implies \lambda_1 = 1; \lambda_2 = -2$

យើងបាន $y = Ae^x + Be^{-2x}$ ដែល $A, B \in \mathbb{R}$

ដូចនេះ: ចម្លើយនៃសមីការ (F) គឺ $y = Ae^x + Be^{-2x}$ ដែល $A, B \in \mathbb{R}$

[$\because$ មេគុណ $a + b + c = 0$]

- ខ កំណត់ a, b ដើម្បីឱ្យ $g(x) = a \cos x + b \sin x$ ជាចម្លើយមួយនៃសមីការ (E)

យើងមានសមីការ (E) : $y'' + y' - 2y = 7 \cos x + \sin x$

$g(x)$ ជាចម្លើយមួយនៃ (E) កាលណា $g''(x) + g'(x) - 2g(x) = 7 \cos x + \sin x$ (1)

យើងមាន $g'(x) = (a \cos x + b \sin x)'$

$$= -a \sin x + b \cos x \quad [\because (\cos x)' = -\sin x ; (\sin x)' = \cos x]$$

និង $g''(x) = (-a \sin x + b \cos x)'$

$$= -a \cos x - b \sin x$$

យក $g(x)$; $g'(x)$ និង $g''(x)$ ជំនួសចូល (1) យើងបាន

$$(-a \cos x - b \sin x) + (-a \sin x + b \cos x) - 2(a \cos x + b \sin x) = 7 \cos x + \sin x$$

$$-a \cos x - b \sin x - a \sin x + b \cos x - 2a \cos x - 2b \sin x = 7 \cos x + \sin x$$

$$(-3a + b) \cos x + (-a - 3b) \sin x = 7 \cos x + \sin x$$

$$\text{នាំឱ្យ} \begin{cases} -3a + b = 7 & (1) \\ -a - 3b = 1 & (2) \end{cases} \quad [\because \text{ផ្ទឹមមេគុណ } \cos x ; \sin x]$$

$$\text{នាំឱ្យ} \begin{cases} -9a + 3b = 21 & (3) \\ -a - 3b = 1 & (4) \end{cases} \quad [\because \text{គុណ (1) នឹង 3}]$$

យក (3) + (4) យើងបាន $-10a = 22$

$$a = -\frac{22}{10} = -\frac{11}{5}$$

$$\text{តាម (1)} \implies b = 7 + 3a$$

$$= 7 + 3 \left(-\frac{11}{5} \right)$$

$$= 7 - \frac{33}{5}$$

$$= \frac{2}{5}$$

ដូចនេះ: $a = -\frac{11}{5}$ និង $b = \frac{2}{5}$

គ) ទាញរកចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E)

ដោយ $y = Ae^x + Be^{-2x}$ ជាចម្លើយនៃសមីការអូម៉ូសែន (F) និង $g(x)$ ជាចម្លើយមួយនៃសមីការ (E)

នោះចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E) គឺ $y = Ae^x + Be^{-2x} + g(x)$

យើងបាន $y = Ae^x + Be^{-2x} - \frac{11}{5} \cos x + \frac{2}{5} \sin x$ ដែល $A, B \in \mathbb{R}$

ដូចនេះ: $\text{ចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E) គឺ } y = Ae^x + Be^{-2x} - \frac{11}{5} \cos x + \frac{2}{5} \sin x \text{ ដែល } A, B \in \mathbb{R}$

V ៩) រកសមីការអេលីប

ដោយដឹងថាអេលីបមានផ្ចិត (0,0) និងអ័ក្សធំជាអ័ក្សដេក

នោះសមីការស្តង់ដារនៃអេលីបគឺ $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ដែល $a > b > 0$

ហើយចំណុច (3,1) និង (4,0) បិតនៅលើអេលីបនេះ យើងបាន៖

$$\begin{cases} \frac{3^2}{a^2} + \frac{1^2}{b^2} = 1 \\ \frac{4^2}{a^2} + \frac{0^2}{b^2} = 1 \end{cases} \quad \text{នាំឱ្យ} \begin{cases} \frac{1}{b^2} = 1 - \frac{9}{a^2} \\ \frac{16}{a^2} = 1 \end{cases} \quad \text{នាំឱ្យ} \begin{cases} \frac{1}{b^2} = 1 - \frac{9}{a^2} \\ a^2 = 16 \end{cases} \quad \text{នាំឱ្យ} \begin{cases} a^2 = 16 \\ \frac{1}{b^2} = 1 - \frac{9}{16} = \frac{7}{16} \end{cases} \quad \text{នាំឱ្យ} \begin{cases} a^2 = 16 \\ b^2 = \frac{16}{7} \end{cases}$$

យើងបានសមីការអេលីប (E) : $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{\frac{16}{7}} = 1$

ដូចនេះ: $\text{សមីការអេលីប (E) : } \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{\frac{16}{7}} = 1$

- ២) រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះអេលីប $4x^2 + y^2 = 4$ និងកាត់តាមចំណុច $(3, 0)$
 តាង $y = ax + b$ ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងអេលីប $4x^2 + y^2 = 4$
 ដោយបន្ទាត់ $y = ax + b$ កាត់តាមចំណុច $(3, 0)$ នាំឱ្យ $0 = 3a + b \Rightarrow b = -3a \Rightarrow y = ax - 3a$
 យើងបានសមីការអាប៉ូស៊ីសរវាងអេលីប $4x^2 + y^2 = 4$ និងបន្ទាត់ប៉ះ $y = ax - 3a$ ដូចខាងក្រោម

$$\begin{aligned} 4x^2 + (ax - 3a)^2 &= 4 \\ 4x^2 + a^2x^2 - 6a^2x + 9a^2 - 4 &= 0 \\ (4 + a^2)x^2 - 6a^2x + 9a^2 - 4 &= 0 \end{aligned}$$

យើងបាន $\Delta' = (-3a^2)^2 - (4 + a^2)(9a^2 - 4) = 9a^4 - (9a^4 + 32a^2 - 16) = -32a^2 + 16$

ដោយបន្ទាត់ប៉ះអេលីបនោះ $\Delta' = 0$ ព្រោះថាបន្ទាត់និងអេលីបប្រសព្វគ្នាត្រង់មួយចំណុច

យើងបាន $-32a^2 + 16 = 0 \Rightarrow a^2 = \frac{1}{2} \Rightarrow a = \pm\sqrt{\frac{1}{2}} = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$

- ករណី $a = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ នោះ $b = \frac{3\sqrt{2}}{2}$ នាំឱ្យ $y = -\frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{3\sqrt{2}}{2}$
- ករណី $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$ នោះ $b = -\frac{3\sqrt{2}}{2}$ នាំឱ្យ $y = \frac{\sqrt{2}}{2}x - \frac{3\sqrt{2}}{2}$

ដូចនេះ: $\text{សមីការបន្ទាត់ប៉ះអេលីបគឺ } y = -\frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{3\sqrt{2}}{2} \text{ និង } y = \frac{\sqrt{2}}{2}x - \frac{3\sqrt{2}}{2}$

- VI ក) គណនា $\vec{BA} \times \vec{BC}$ រួចទាញថាចំណុច A, B, C រត់មិនត្រង់គ្នា និងគណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC

យើងមានចំណុច $A(2, 2, 1)$; $B(3, 1, 1)$; $C(-2, 4, 5)$ និង $D(1, -1, 0)$

នាំឱ្យ $\vec{BA} = (-1, 1, 0)$ និង $\vec{BC} = (-5, 3, 4)$

យើងបាន $\vec{BA} \times \vec{BC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 1 & 0 \\ -5 & 3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -5 & 4 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -5 & 3 \end{vmatrix} \vec{k} = 4\vec{i} + 4\vec{j} + 2\vec{k} = (4, 4, 2)$

ដូចនេះ: $\vec{BA} \times \vec{BC} = (4, 4, 2)$

ដោយ $\vec{BA} \times \vec{BC} = (4, 4, 2) \neq \vec{0}$ នោះវ៉ិចទ័រ $\vec{BA}$ និង $\vec{BC}$ មិនកូលីនេអ៊ែរគ្នា បានន័យថាចំណុច A, B, C រត់មិនត្រង់គ្នា

ដូចនេះ: $\text{ចំណុច } A, B \text{ និង } C \text{ រត់មិនត្រង់គ្នា}$

មួយវិញទៀត $S_{ABC} = \frac{1}{2} |\vec{BA} \times \vec{BC}| = \frac{1}{2} \sqrt{4^2 + 4^2 + 2^2} = \frac{1}{2} \sqrt{16 + 16 + 4} = \frac{1}{2} \sqrt{36} = 3$

ដូចនេះ: $\text{ក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ } ABC \text{ គឺ } S_{ABC} = 3 \text{ ឯកតាផ្ទៃ}$

- ខ) កំណត់សមីការប្លង់ (ABC)

ប្លង់ (ABC) កាត់តាមចំណុច $A(2, 2, 1)$ និងមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n} = \vec{BA} \times \vec{BC} = (4, 4, 2)$ មានសមីការកំណត់ដោយ៖

$$4(x - 2) + 4(y - 2) + 2(z - 1) = 0$$

$$4x - 8 + 4y - 8 + 2z - 2 = 0$$

$$4x + 4y + 2z - 18 = 0$$

$$2x + 2y + z - 9 = 0 \quad \left[\because \text{ចែកអង្គទាំងពីរនឹង } 2 \right]$$

ដូចនេះ: $\text{សមីការប្លង់ } (ABC) : 2x + y + z - 9 = 0$

- គ) គណនា $(\vec{BA} \times \vec{BC}) \cdot \vec{BD}$ រួចទាញរកមាឌតេត្រាអែត $ABCD$

យើងមាន $\vec{BA} \times \vec{BC} = (4, 4, 2)$ និង $\vec{BD} = (-2, -2, -1)$

យើងបាន $(\vec{BA} \times \vec{BC}) \cdot \vec{BD} = (4)(-2) + (4)(-2) + (2)(-1) = -8 - 8 - 2 = -18$

ដូចនេះ: $(\vec{BA} \times \vec{BC}) \cdot \vec{BD} = -18$

$$\text{មួយវិញទៀត មាឌតេត្រាអែត ABCD គឺ } V_{ABCD} = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{BA} \times \overrightarrow{BC}) \cdot \overrightarrow{BD}| = \frac{1}{6} \cdot |-18| = 3$$


$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{V_{ABCD} = 3 \text{ ឯកតាមាឌ}}$$

- ឃ ទាញរកចម្ងាយពីចំណុច D ទៅប្លង់ (ABC)
ចម្ងាយពីចំណុច D ទៅប្លង់ (ABC) គឺជាកម្ពស់
h នៃតេត្រាអែត ABCD

$$\text{តាមរូបមន្ត } V_{ABCD} = \frac{1}{3} S_{ABC} \cdot h$$

$$\text{នាំឱ្យ } h = \frac{3V_{ABCD}}{S_{ABC}} = \frac{3 \times 3}{3} = 3$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{\text{ចម្ងាយពី D ទៅប្លង់ (ABC) គឺ } h = 3 \text{ ឯកតាប្រវែង}}$$



- VII ៩ គណនា $f'(x)$ រួចសង់តារាងអថេរភាព f (មិនបាច់គណនាលីមីតចុងដែនកំណត់)

យើងមានអនុគមន៍ f កំណត់ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ ដោយ $f(x) = (1-x)e^x - 1$

យើងបាន $f'(x) = [(1-x)e^x - 1]'$

$$= (1-x)'e^x + (1-x)(e^x)' - 0 \quad [\because (uv)' = u'v + v'u]$$

$$= -e^x + (1-x)e^x$$

$$= e^x(-1 + 1 - x)$$

$$= -xe^x$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{f'(x) = -xe^x; \forall x \in \mathbb{R}}$$

ដោយ $f'(x) = -xe^x$ ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$; $e^x > 0$ នាំឱ្យ $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $-x$

- បើ $x = 0$ នោះ $-x = 0 \implies f'(x) = 0$
- បើ $x > 0$ នោះ $-x < 0 \implies f'(x) < 0$
- បើ $x < 0$ នោះ $-x > 0 \implies f'(x) > 0$

$$\text{ហើយ } f(0) = (1-0)e^0 - 1 = 1 - 1 = 0$$

យើងបានតារាងអថេរភាព f ដូចខាងក្រោម

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$\swarrow \quad \quad \quad \searrow$ 0		

តាមតារាងអថេរភាព f យើងឃើញថា $f(x)$ មានតម្លៃអតិបរមាស្មើ 0 គឺ $f(x) \leq 0$ ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ ។

- ២ ក គណនា $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x)$ គណនា $g'(x)$ ប្រើលទ្ធផលនៅសំណួរ ១ ចូរសង់តារាងអថេរភាព g
យើងមាន $g(x) = (2-x)e^x + 2 - x$ ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$

$$\text{យើងបាន } \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} [(2-x)e^x + 2 - x]$$

$$= 0 + 2 - (-\infty)$$

$$= +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [(2-x)e^x + 2 - x]$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x \left(2 - x + \frac{2}{e^x} - \frac{x}{e^x} \right)$$

$$= +\infty [2 - (+\infty) + 0 - 0]$$

$$\left[\because \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \right]$$

$$[\because \text{ទាញ } e^x \text{ ជាកត្តារួម}]$$

$$\left[\because \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{e^x} = 0; \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0 \right]$$

$$= +\infty(-\infty)$$

$$= -\infty$$

ដូចនេះ: $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$ និង $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$

ហើយ $g'(x) = [(2-x)e^x + 2-x]'$

$$= (2-x)'e^x + (2-x)(e^x)' + 0 - 1 \quad [\because (2)' = 0; (x)' = 1; (uv)' = u'v + v'u]$$

$$= -e^x + (2-x)e^x - 1$$

$$= (-1 + 2-x)e^x - 1$$

$$= (1-x)e^x - 1$$

ដូចនេះ: $g'(x) = (1-x)e^x - 1; \forall x \in \mathbb{R}$

យើងឃើញថា $g'(x) = (1-x)e^x - 1 = f(x)$ នោះ $g'(x)$ មានសញ្ញាដូច $f(x)$ គឺ $g'(x) \leq 0; \forall x \in \mathbb{R}$

ហើយ $g(0) = (2-0)e^0 + 2-0 = 2+2 = 4$

យើងបានតារាងអថេរភាព g ដូចខាងក្រោម

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$-$
$g(x)$	$+\infty$	4	$-\infty$

ខ) បង្ហាញថាបន្ទាត់ (D) : $y = 2-x$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) តាងអនុគមន៍ g ផ្នែក $-\infty$

ពិនិត្យ $\lim_{x \rightarrow -\infty} (y_C - y_D) = \lim_{x \rightarrow -\infty} [(2-x)e^x + 2-x - (2-x)]$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} (2-x)e^x$$

$$= 0$$

នាំឱ្យ បន្ទាត់ (D) : $y = 2-x$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) តាងអនុគមន៍ g ផ្នែក $-\infty$

ដូចនេះ: បន្ទាត់ (D) : $y = 2-x$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) តាងអនុគមន៍ g ផ្នែក $-\infty$

គ) រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះក្រាប (C) ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ (D)

សមីការបន្ទាត់ប៉ះក្រាប (C) ត្រង់ចំណុច (x_0, y_0) មានរាង $y = g'(x_0)(x - x_0) + y_0$

ដោយបន្ទាត់ប៉ះនេះស្របទៅនឹងបន្ទាត់ (D) : $y = 2-x$ យើងបាន៖

$$g'(x_0) = -1$$

$$(1-x_0)e^{x_0} - 1 = -1$$

$$(1-x_0)e^{x_0} = 0$$

នាំឱ្យ $1-x_0 = 0 \quad [\because e^x > 0]$

នាំឱ្យ $x_0 = 1$

ហើយ $g(x_0) = g(1) = (2-1)e^1 + 2-1 = e+1$

នោះសមីការបន្ទាត់ប៉ះគឺ $y = -1(x-1) + e+1 = -x + e+2$

ដូចនេះ: សមីការបន្ទាត់ប៉ះក្រាប (C) គឺ $y = -x + e+2$

ឃ) រកកូអរដោនេចំណុចរបស់ នៃ (C) រួចសង់ក្រាប (C)

ដើម្បីរកកូអរដោនេចំណុចរបស់នៃក្រាប (C) យើងត្រូវរក $g''(x)$ ជាមុនសិន

$$\begin{aligned}
\text{យើងបាន } g''(x) &= [(1-x)e^x - 1]' \\
&= (1-x)'e^x + (1-x)(e^x)' \\
&= -e^x + (1-x)e^x \\
&= -e^x + e^x - xe^x \\
&= -xe^x
\end{aligned}$$

- បើ $g''(x) = 0 \implies -xe^x = 0 \implies x = 0$
- បើ $g''(x) > 0 \implies -xe^x > 0 \implies x < 0$
- បើ $g''(x) < 0 \implies -xe^x < 0 \implies x > 0$

យើងបានតារាងសញ្ញានៃ $g''(x)$ ដូចខាងក្រោម

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g''(x)$	$+$	0	$-$

តាមតារាងសញ្ញាខាងលើឃើញថា $g''(x)$ ប្តូរសញ្ញាពី $+$ ទៅ $-$ ត្រង់ $x = 0$ និង $g(0) = 4$
នោះ $(0, 4)$ ជាចំណុចរបត់នៃក្រាប (C)

ដូចនេះ ចំណុចរបត់នៃក្រាប (C) គឺ $(0, 4)$

សំណង់ក្រាប (C)

- អាស៊ីមតូតទ្រីត (D) : $y = x - 2$ $\frac{x}{y} \left| \begin{array}{cc} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{array} \right.$

- បន្ទាត់ប៉ះ $y = -x + e + 2$ $\frac{x}{y} \left| \begin{array}{cc} 2 & e \\ e & 2 \end{array} \right.$

- ចំណុចប្រសព្វរវាងក្រាបនឹងអ័ក្ស (ox)

ដោយអនុគមន៍ $g(x)$ ចុះជានិច្ចលើ $\mathbb{R}$ នោះក្រាប (C) ត្រូវកាត់អ័ក្ស (ox) ត្រង់ចំណុចមួយ

យើងយក $g(x) = 0$ នោះ $(2-x)e^x + 2 - x = 0$

$$(2-x)(e^x + 1) = 0 \quad [\because \text{ទាញ } 2-x \text{ ជាកត្តារួម}]$$

$$\text{នាំឱ្យ } 2-x = 0 \quad [\because e^x + 1 > 0]$$

$$x = 2 \quad \text{មានន័យថាក្រាបកាត់អ័ក្ស(ox) ត្រង់ } (2, 0)$$

