

រៀបចំប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង៖

វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យា (វិទ្យាសាស្ត្រពិត)

រយៈពេល ១៥០នាទី

ពិន្ទុសរុប ១២៥ពិន្ទុ

មណ្ឌលប្រឡង

លេខបន្ទប់ លេខតុ

ឈ្មោះបេក្ខជន

ហត្ថលេខា

វិញ្ញាសា ០៥

I គណនាលីមីតខាងក្រោម

ក $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{2-x} - \sqrt[3]{x}}{1-x}$

ខ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x^2 - \cos 4x}{3x^2}$

គ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} + e^{5x} - 2}{4x}$

II គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z = \sqrt{2+\sqrt{2}} + i\sqrt{2-\sqrt{2}}$ ។

ក ចូរសរសេរ z^2 ជាទម្រង់ពីជគណិត។

ខ ចូរសរសេរ z^2 និង z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

គ ទាញរកតម្លៃប្រាកដនៃ $\cos \frac{\pi}{8}$ និង $\sin \frac{\pi}{8}$ ។

III ១ គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = \frac{1}{x^2-1}$ ចំពោះគ្រប់ $x \neq \pm 1$ ។

ក កំណត់ A, B ដើម្បីឱ្យ $f(x) = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1}$ ។

ខ គណនា $I = \int_2^5 f(x) dx$ ។

២ គេឱ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) : $2y'' - 3y' + y = 8$ ។

ក កំណត់ចំនួនពិត k ដើម្បីឱ្យ $y_1 = k$ ជាចម្លើយនៃ (E) ។

ខ ដោះស្រាយរក y_2 ដែលជាចម្លើយនៃ (F) : $2y'' - 3y' + y = 0$ ។

គ ទាញរកចម្លើយទូទៅនៃ (E) ។

IV ប្តីប្រពន្ធមួយគូមានបំណងចង់បានកូនពីរនាក់។ ដោយសន្មតថាលទ្ធភាពដែលអាចមានកូនប្រុស ឬកូនស្រីមានប្រូបាបស្មើគ្នា។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

ក A: បានកូនប្រុសទាំងពីរនាក់

ខ B: បានកូនស្រីនៅលើកទីមួយ

គ C: បានកូនទាំងពីរមានភេទខុសគ្នា

V គេឱ្យសមីការអេលីប (E) : $16x^2 + 25y^2 - 32x - 50y - 359 = 0$ ។

ក រកសមីការស្តង់ដារអេលីប រួចទាញរកកូអរដោនេផ្ចិត កំពូល និងកំណុំរបស់វា។

ខ ផ្ទៀងផ្ទាត់ថា $\forall \theta \in \mathbb{R}$ ចំណុច $M(1 + 5 \cos \theta, 1 + 4 \sin \theta)$ ប៊ិចលើអេលីប (E) ។

គ ចូរស្រាយថាបន្ទាត់ប៉ះ (E) ត្រង់ M មានមេគុណប្រាប់ទិស $k = -\frac{4}{5} \cot \theta$ ។

VI ក្នុងតម្រុយមានទិសដៅវិជ្ជមាន $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេឱ្យសមីការប្លង់ (P) : $x + 2y + 2z - 4 = 0$ និងចំណុច $I(1, 2, 4)$ ។

ក កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់ (L) ដែលកាត់តាម I ហើយកែងនឹង (P) ត្រង់ J ។ រកកូអរដោនេនៃ J ។

ខ កំណត់សមីការស្វ៊ែរ (S) ដែលមានផ្ចិត I ហើយប៉ះទៅនឹងប្លង់ (P) ។

គ ប្លង់ (P) កាត់អ័ក្ស (ox), (oy) និង (oz) រៀងគ្នាត្រង់ A, B និង C ។ រកកូអរដោនេនៃចំណុច A, B, C និង $\vec{H} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ ។

ឃ គណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC និងមាឌធាតុមុខ IABC ។

VII f ជាអនុគមន៍កំណត់ដោយ $f(x) = \frac{x}{2} - \ln\left(\frac{x-1}{x}\right)$ និងមានក្រាប (C) ។

- ក) រកដែនកំណត់នៃ f ។ គណនាលីមីតចុងដែនកំណត់នៃ f រួចទាញរកអាស៊ីមតូតនៃ (C) ។
- ខ) បង្ហាញថាបន្ទាត់ (d) : $y = \frac{x}{2}$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ។
- គ) គណនា $f'(x)$ ។ សង់តារាងអថេរភាព f ។
- ឃ) សង់ក្រាប (C) និងអាស៊ីមតូតរបស់វាក្នុងតម្រុយតែមួយ។ (គេឱ្យ $\ln 2 = 0.7$)

ដំណោះស្រាយ

I គណនាលីមីតខាងក្រោម

ក) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{2-x} - \sqrt[3]{x}}{1-x} \quad \left(\text{រាងមិនកំណត់ } \frac{0}{0} \right)$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{2-x} - \sqrt[3]{x}}{1-x} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt[3]{2-x} - \sqrt[3]{x}) [(\sqrt[3]{2-x})^2 + \sqrt[3]{2-x} \cdot \sqrt[3]{x} + (\sqrt[3]{x})^2]}{(1-x) [(\sqrt[3]{2-x})^2 + \sqrt[3]{2-x} \cdot \sqrt[3]{x} + (\sqrt[3]{x})^2]} && [\because \text{គុណកន្សោមបំពេញ}] \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt[3]{2-x})^3 - (\sqrt[3]{x})^3}{(1-x) [(\sqrt[3]{2-x})^2 + \sqrt[3]{2-x} \cdot \sqrt[3]{x} + (\sqrt[3]{x})^2]} && [\because (a-b)(a^2+ab+b^2) = a^3-b^3] \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2-x-x}{(1-x) [(\sqrt[3]{2-x})^2 + \sqrt[3]{2-x} \cdot \sqrt[3]{x} + (\sqrt[3]{x})^2]} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(1-x)}{(1-x) [(\sqrt[3]{2-x})^2 + \sqrt[3]{2-x} \cdot \sqrt[3]{x} + (\sqrt[3]{x})^2]} \\ &= \frac{2}{1+1+1} \\ &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\boxed{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{2-x} - \sqrt[3]{x}}{1-x} = \frac{2}{3}}$

ខ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x^2 - \cos 4x}{3x^2} \quad \left(\text{រាងមិនកំណត់ } \frac{0}{0} \right)$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x^2 - \cos 4x}{3x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^2}{3x^2} + \frac{1 - \cos 4x}{3x^2} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{3} + \frac{2 \sin^2 2x}{3x^2} \right) && [\because \cos 4x = 1 - 2\sin^2 2x \implies 1 - \cos 4x = 2 \sin^2 2x] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{3} + \left(\frac{\sin 2x}{2x} \right)^2 \times \frac{8}{3} \right] \\ &= \frac{1}{3} + (1)^2 \times \frac{8}{3} \\ &= \frac{9}{3} \\ &= 3 \end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x^2 - 4 \cos x}{3x^2} = 3}$

គ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} + e^{5x} - 2}{4x} \quad \left(\text{រាងមិនកំណត់ } \frac{0}{0} \right)$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} + e^{5x} - 2}{4x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{3x} - 1) + (e^{5x} - 1)}{4x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^{3x} - 1}{4x} + \frac{e^{5x} - 1}{4x} \right) \\ &= \frac{3}{4} + \frac{5}{4} && [\because \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - 1}{bx} = \frac{a}{b}] \end{aligned}$$

$$= \frac{8}{4}$$

$$= 2$$

ដូចនេះ: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} + e^{5x} - 2}{4x} = 2$

II ក សរសេរ z^2 ជាទម្រង់ពីជគណិត

យើងមានចំនួនកុំផ្លិច $z = \sqrt{2 + \sqrt{2}} + i\sqrt{2 - \sqrt{2}}$

យើងបាន $z^2 = \left(\sqrt{2 + \sqrt{2}} + i\sqrt{2 - \sqrt{2}} \right)^2$

$$= \left(\sqrt{2 + \sqrt{2}} \right)^2 + 2i\sqrt{2 + \sqrt{2}} \cdot \sqrt{2 - \sqrt{2}} + \left(i\sqrt{2 - \sqrt{2}} \right)^2 \quad [\because (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2]$$

$$= 2 + \sqrt{2} + 2i\sqrt{(2 + \sqrt{2}) \cdot (2 - \sqrt{2})} - (2 - \sqrt{2}) \quad [\because i^2 = -1]$$

$$= 2 + \sqrt{2} + 2i\sqrt{2^2 - (\sqrt{2})^2} - 2 + \sqrt{2} \quad [\because (a+b)(a-b) = a^2 - b^2]$$

$$= 2\sqrt{2} + 2i\sqrt{2}$$

ដូចនេះ: $z^2 = 2\sqrt{2} + 2i\sqrt{2}$

ខ ចូរសរសេរ z^2 និង z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

យើងមាន $z^2 = 2\sqrt{2} + 2i\sqrt{2}$

យើងបាន $z^2 = 4 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2} \right)$

$$= 4 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

ហើយ $\sqrt{z^2} = \sqrt{4} \left(\cos \frac{\frac{\pi}{4} + 2k\pi}{2} + i \sin \frac{\frac{\pi}{4} + 2k\pi}{2} \right)$

នាំឱ្យ $z_k = 2 \left(\cos \frac{\pi + 8k\pi}{8} + i \sin \frac{\pi + 8k\pi}{8} \right)$ ដែល $k = 0, 1$

- ករណី $k = 0$ នោះ $z_0 = 2 \left(\cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8} \right)$

- ករណី $k = 1$ នោះ $z_1 = 2 \left(\cos \frac{9\pi}{8} + i \sin \frac{9\pi}{8} \right)$ (មិនយក)

ព្រោះ $\operatorname{Re}(z_1) = 2 \cos \frac{9\pi}{8} < 0$ តែ $\operatorname{Re}(z) = \sqrt{2 + \sqrt{2}} > 0$

ដូចនេះ: $z^2 = 4 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$ និង $z = 2 \left(\cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8} \right)$

គ ទាញរកតម្លៃប្រាកដនៃ $\cos \frac{\pi}{8}$ និង $\sin \frac{\pi}{8}$

យើងមាន $z = \sqrt{2 + \sqrt{2}} + i\sqrt{2 - \sqrt{2}}$ និង $z = 2 \left(\cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8} \right)$

យើងបាន $2 \left(\cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8} \right) = \sqrt{2 + \sqrt{2}} + i\sqrt{2 - \sqrt{2}}$

$$2 \cos \frac{\pi}{8} + 2i \sin \frac{\pi}{8} = \sqrt{2 + \sqrt{2}} + i\sqrt{2 - \sqrt{2}}$$

នាំឱ្យ $\begin{cases} 2 \cos \frac{\pi}{8} = \sqrt{2 + \sqrt{2}} \\ 2 \sin \frac{\pi}{8} = \sqrt{2 - \sqrt{2}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \cos \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2} \\ \sin \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2} \end{cases}$

ដូចនេះ: $\cos \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}$ និង $\sin \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2}$

III ១ ក) កំណត់ A, B ដើម្បីឱ្យ $f(x) = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1}$

យើងមានអនុគមន៍ $f(x) = \frac{1}{x^2-1}$ ចំពោះគ្រប់ $x \neq \pm 1$

យើងបាន $\frac{1}{x^2-1} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1}$
 $\frac{1}{(x-1)(x+1)} = \frac{A(x+1) + B(x-1)}{(x-1)(x+1)}$

$$1 = A(x+1) + B(x-1) \quad [\because \text{លុបភាគបែងចោល}]$$

$$1 = Ax + A + Bx - B$$

$$0x + 1 = (A+B)x + (A-B) \quad [\because \text{ផ្គុំតួដែលមានដឺក្រេដូចគ្នា}]$$

$$\text{នាំឱ្យ} \begin{cases} A+B=0 & (1) \\ A-B=1 & (2) \end{cases} \quad [\because \text{ផ្ទឹមមេគុណនៃតួដែលមានដឺក្រេដូចគ្នា}]$$

យក (1) + (2) យើងបាន $2A = 1$

$$\Rightarrow A = \frac{1}{2}$$

តាម (1) $\Rightarrow B = -A$

$$= -\frac{1}{2}$$

ដូចនេះ: $A = \frac{1}{2}$ និង $B = -\frac{1}{2}$

ខ) គណនា $I = \int_2^5 f(x) dx$

យើងបាន $I = \int_2^5 \left(\frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} \right) dx$
 $= \int_2^5 \left(\frac{\frac{1}{2}}{x-1} + \frac{-\frac{1}{2}}{x+1} \right) dx$
 $= \frac{1}{2} \int_2^5 \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right) dx$
 $= \frac{1}{2} [\ln|x-1| - \ln|x+1|]_2^5$
 $= \frac{1}{2} \left[\ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| \right]_2^5$
 $= \frac{1}{2} \left(\ln \frac{4}{6} - \ln \frac{1}{3} \right)$
 $= \frac{1}{2} \left(\ln \frac{2}{3} + \ln 3 \right)$
 $= \frac{1}{2} \ln \left(\frac{2}{3} \times 3 \right)$
 $= \frac{1}{2} \ln 2$

$$[\because \text{ទាញ } \frac{1}{2} \text{ ជាកត្តារួម}]$$

$$[\because \int \frac{dx}{x \pm a} = \ln|x \pm a|]$$

$$[\because \ln a - \ln b = \ln \frac{a}{b}]$$

$$[\because \ln \frac{1}{3} = \ln 3^{-1} = -\ln 3]$$

$$[\because \ln a + \ln b = \ln ab]$$

ដូចនេះ: $I = \frac{1}{2} \ln 2$

២ ក) កំណត់ចំនួនពិត k ដើម្បីឱ្យ $y_1 = k$ ជាចម្លើយនៃ (E)

យើងមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) : $2y'' - 3y' + y = 8$

$y_1 = k$ ជាចម្លើយនៃ (E) កាលណា $2y_1'' - 3y_1' + y_1 = 8$ (*)

ដោយ $y_1 = k$ នោះ $y_1' = 0$ ហើយ $y_1'' = 0$ យកជំនួសចូល (*) យើងបាន

$$2(0) - 3(0) + k = 8$$

$$k = 8$$

ដូចនេះ: $k = 8$

ខ) ដោះស្រាយរក y_2 ដែលជាចម្លើយនៃ (F) : $2y'' - 3y' + y = 0$

សមីការសម្គាល់ $2\lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0$ នាំឱ្យ $\lambda_1 = 1$; $\lambda_2 = \frac{1}{2}$

[$\because$ មេគុណ $a + b + c = 0$]

យើងបានចម្លើយនៃ (F) គឺ $y = Ae^x + Be^{\frac{1}{2}x}$ ដែល $A, B \in \mathbb{R}$

ដូចនេះ: ចម្លើយនៃ (F) គឺ $y = Ae^x + Be^{\frac{1}{2}x}$ ដែល $A, B \in \mathbb{R}$

គ) ទាញរកចម្លើយទូទៅនៃ (E)

ដោយ $y_1 = k = 8$ ជាចម្លើយមួយនៃសមីការ (E)

ហើយ $y = Ae^x + Be^{\frac{1}{2}x}$ ជាចម្លើយនៃសមីការអូម៉ូសែន (F)

នោះចម្លើយទូទៅនៃ (E) គឺ $y = Ae^x + Be^{\frac{1}{2}x} + 8$ ដែល $A, B \in \mathbb{R}$

ដូចនេះ: ចម្លើយទូទៅនៃ (E) គឺ $y = Ae^x + Be^{\frac{1}{2}x} + 8$ ដែល $A, B \in \mathbb{R}$

IV តាង B ជាកូនប្រុស និង G ជាកូនស្រី

យើងបាន $S = \{(BB), (BG), (GB), (GG)\} \implies n(S) = 4$

ក) A: បានកូនប្រុសទាំងពីរនាក់

យើងបាន $A = \{(BB)\} \implies n(A) = 1$

$$\text{នាំឱ្យ } P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{1}{4}$$

ដូចនេះ: $P(A) = \frac{1}{4}$

ខ) B: បានកូនស្រីនៅលើកទីមួយ

យើងបាន $B = \{(GB), (GG)\} \implies n(B) = 2$

$$\text{នាំឱ្យ } P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

ដូចនេះ: $P(B) = \frac{1}{2}$

គ) C: បានកូនទាំងពីរមានភេទខុសគ្នា

យើងបាន $C = \{(BG), (GB)\} \implies n(C) = 2$

$$\text{នាំឱ្យ } P(C) = \frac{n(C)}{n(S)} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

ដូចនេះ: $P(C) = \frac{1}{2}$

V ក) រកសមីការស្តង់ដារអេលីប៊ូចទាញរកកូអរដោនេផ្ចិត កំពូល និងកំណុំរបស់វា

យើងបានសមីការអេលីប៊ូ (E) : $16x^2 + 25y^2 - 32x - 50y - 359 = 0$ យើងបាន

$$(16x^2 - 32x) + (25y^2 - 50y) = 359$$

$$16(x^2 - 2x) + 25(y^2 - 2y) = 359$$

$$16[(x^2 - 2x + 1) - 1] + 25[(y^2 - 2y + 1) - 1] = 359$$

$$16(x - 1)^2 - 16 + 25(y - 1)^2 - 25 = 359$$

$$16(x - 1)^2 + 25(y - 1)^2 = 359 + 16 + 25$$

$$16(x - 1)^2 + 25(y - 1)^2 = 400$$

$$\frac{16(x-1)^2}{400} + \frac{25(y-1)^2}{400} = 1$$

[$\because$ ចែកអង្គទាំងពីរនឹង 400]

$$\frac{(x-1)^2}{25} + \frac{(y-1)^2}{16} = 1$$

$$\frac{(x-1)^2}{5^2} + \frac{(y-1)^2}{4^2} = 1$$

ជាសមីការស្តង់ដារអេលីប្រាប $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$ ដែល $a > b > 0$

យើងទាញបាន $\begin{cases} a = 5 ; b = 4 \\ h = 1 ; k = 1 \end{cases}$ ហើយ $a^2 = b^2 + c^2 \implies c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{25 - 16} = \sqrt{9} = 3$

នាំឱ្យ $\begin{cases} \text{ផ្ចិត} & I(h, k) = (1, 1) \\ \text{កំណុំ} & F_{1,2}(h \pm c, k) = (-2, 1); (4, 1) \\ \text{កំពូល} & V_{1,2}(h \pm a, k) = (-4, 1); (6, 1) \end{cases}$

ដូចនេះ: ផ្ចិត $I(1, 1)$ កំណុំ $F_{1,2} = (-2, 1); (4, 1)$ និងកំពូល $V_{1,2} = (-4, 1); (6, 1)$

ខ) ផ្ទៀងផ្ទាត់ថា $\forall \theta \in \mathbb{R}$ ចំណុច $M(1 + 5 \cos \theta, 1 + 4 \sin \theta)$ បិតលើអេលីប្រាប (E)

ចំណុច M បិតនៅលើអេលីប្រាប (E) : $\frac{(x-1)^2}{25} + \frac{(y-1)^2}{16} = 1$ កាលណា

$$\begin{aligned} \frac{(x_M - 1)^2}{25} + \frac{(y_M - 1)^2}{16} &= 1 \\ \frac{(1 + 5 \cos \theta - 1)^2}{25} + \frac{(1 + 4 \sin \theta - 1)^2}{16} &= 1 \\ \frac{(5 \cos \theta)^2}{25} + \frac{(4 \sin \theta)^2}{16} &= 1 \\ \frac{25 \cos^2 \theta}{25} + \frac{16 \sin^2 \theta}{16} &= 1 \\ \cos^2 \theta + \sin^2 \theta &= 1 \quad (\text{ពិត}) \end{aligned}$$

ដូចនេះ: ចំណុច $M(1 + 5 \cos \theta, 1 + 4 \sin \theta)$ បិតនៅលើអេលីប្រាប (E)

គ) ស្រាយថាបន្ទាត់ប៉ះ (E) ត្រង់ M មានមេគុណប្រាប់ទិស $k = -\frac{4}{5} \cot \theta$
មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះអេលីប្រាប (E) ត្រង់ M គឺ $k = y'(x_M)$
[$\because$ ដូចគ្នានឹងមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោងទូទៅដែរ]

យើងបាន $16x^2 + 25y^2 - 32x - 50y - 359 = 0$

សមមូល $25y^2 - 50y = -16x^2 + 32x + 359$

$$(25y^2 - 50y)' = (-16x^2 + 32x + 359)'$$

$$25(y^2)' - 50y' = -32x + 32$$

$$50y'y - 50y' = 32 - 32x$$

$$50(y-1)y' = 32(1-x)$$

$$\text{នាំឱ្យ } y' = \frac{32(1-x)}{50(y-1)}$$

$$= \frac{16(1-x)}{25(y-1)}$$

$$\text{នាំឱ្យ } y'(x_M) = \frac{16(1-x_M)}{25(y_M-1)}$$

$$= \frac{16[1 - (1 + 5 \cos \theta)]}{25[(1 + 4 \sin \theta) - 1]}$$

$$= \frac{-16(5 \cos \theta)}{25(4 \sin \theta)}$$

[$\because$ ធ្វើដេរីវេលើអង្គទាំងពីរធៀប x]

$$[\because (y^n)' = ny'y^{n-1}]$$

$$= -\frac{80}{100} \cdot \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

$$= -\frac{4}{5} \cot \theta$$

ដូចនេះ: បន្ទាត់ប៉ះ (E) ត្រង់ M មានមេគុណប្រាប់ទិស $k = -\frac{4}{5} \cot \theta$

VI

- ក កំណត់សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់ (L) រួចរកកូអរដោនេនៃ J
 យើងមានសមីការប្លង់ (P) : $x + 2y + 2z - 4 = 0$ នោះវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃ (P) គឺ $\vec{c} = (1, 2, 2)$
 ដោយ $(L) \perp (P)$ នោះ $(L) \parallel \vec{c}$ នាំឱ្យ $\vec{c} = (1, 2, 2)$ ជាវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ (L)
 ហើយ (L) កាត់តាមចំណុច I(1, 2, 4) នោះសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃ (L) គឺ:

$$\begin{cases} x = t + 1 \\ y = 2t + 2 \\ z = 2t + 4 \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$$

ដូចនេះ: សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រ (L) : $\begin{cases} x = t + 1 \\ y = 2t + 2 \\ z = 2t + 4 \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$

មួយវិញទៀតចំណុច $J \in (P)$ នោះ $x_J + 2y_J + 2z_J - 4 = 0$ (1) ហើយ $J \in (L)$ នោះ $\begin{cases} x_J = t + 1 \\ y_J = 2t + 2 \\ z_J = 2t + 4 \end{cases}$ (2)

យក (2) ជំនួសចូល (1) យើងបាន $(t + 1) + 2(2t + 2) + 2(2t + 4) - 4 = 0$
 $t + 1 + 4t + 4 + 4t + 8 - 4 = 0$
 $9t + 9 = 0$
 $t = -1$

តាម (2) យើងបាន $\begin{cases} x_J = -1 + 1 = 0 \\ y_J = 2(-1) + 2 = 0 \\ z_J = 2(-1) + 4 = 2 \end{cases}$ នាំឱ្យ $J(0, 0, 2)$

ដូចនេះ: កូអរដោនេចំណុច J គឺ (0, 0, 2)


- ខ កំណត់សមីការស្វ៊ែរ (S)
 ដោយស្វ៊ែរ (S) មានផ្ចិត I ហើយប៉ះទៅនឹងប្លង់ (P) ហើយបន្ទាត់ (L) កាត់តាមចំណុច I កែងនឹងប្លង់ (P)
 នោះយើងទាញបានស្វ៊ែរ (S) ប៉ះនឹងប្លង់ (P) ត្រង់ J នាំឱ្យ IJ ជាកាំនៃស្វ៊ែរ (S)

យើងមាន $\vec{IJ} = (-1, -2, -2)$
 នាំឱ្យ $IJ = \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2 + (-2)^2} = 3$
 ស្វ៊ែរ (S) មានផ្ចិត I(1, 2, 4) កាំ $R = IJ = 3$ មានសមីការ

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 4)^2 = 3^2 = 9$$

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 4)^2 = 9$$

ដូចនេះ: សមីការស្វ៊ែរ (S) : $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 4)^2 = 9$



- គ រកកូអរដោនេនៃចំណុច A, B, C និង $\vec{n} = \vec{AB} \times \vec{AC}$

- ប្លង់ (P) កាត់ (ox) ត្រង់ A នោះ $y_A = 0 ; z_A = 0$
 យើងបាន $x_A + 2(0) + 2(0) - 4 = 0 \implies x_A = 4 \implies A(4, 0, 0)$
- ប្លង់ (P) កាត់ (oy) ត្រង់ B នោះ $x_B = 0 ; z_B = 0$
 យើងបាន $0 + 2y_B + 2(0) - 4 = 0 \implies y_B = 2 \implies B(0, 2, 0)$

- ប្លង់ (P) កាត់ (oz) ត្រង់ C នោះ $x_C = 0$; $y_C = 0$
យើងបាន $0 + 2(0) + 2z_C - 4 = 0 \Rightarrow z_C = 2 \Rightarrow C(0, 0, 2)$

ដូចនេះ: $A(4, 0, 0)$; $B(0, 2, 0)$ និង $C(0, 0, 2)$

ហើយ $\overrightarrow{AB} = (-4, 2, 0)$ និង $\overrightarrow{AC} = (-4, 0, 2)$

យើងបាន $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -4 & 2 & 0 \\ -4 & 0 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} -4 & 0 \\ -4 & 2 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} -4 & 2 \\ -4 & 0 \end{vmatrix} \vec{k} = 4\vec{i} + 8\vec{j} + 8\vec{k}$

ដូចនេះ: $\vec{n} = 4\vec{i} + 8\vec{j} + 8\vec{k}$

២) គណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC និងមាឌចតុមុខ IABC

តាមរូបមន្ត $S_{ABC} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \frac{1}{2} \sqrt{4^2 + 8^2 + 8^2} = \frac{1}{2} \sqrt{144} = \frac{1}{2} \times 12 = 6$

ដូចនេះ: $S_{ABC} = 6$ ឯកតាផ្ទៃ

ហើយ $V_{IABC} = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AI}|$

ដោយ $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (4, 8, 8)$ និង $\overrightarrow{AI} = (-1, 2, 4)$

នោះ $(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AI} = (4)(-1) + (8)(2) + (8)(4) = -4 + 16 + 32 = 44$

នាំឱ្យ $V_{IABC} = \frac{1}{6} \times 44 = \frac{22}{3}$

ដូចនេះ: $V_{IABC} = \frac{22}{3}$ ឯកតាមាឌ

VII ក) រកដែនកំណត់នៃ f គណនាលីមីតចុងដែនកំណត់នៃ f រួចទាញរកអាស៊ីមតូតនៃ (C)

យើងមាន $f(x) = \frac{x}{2} - \ln\left(\frac{x-1}{x}\right)$ យើងឃើញថា f មានន័យកាលណា $\frac{x-1}{x} > 0$

ពិនិត្យមើលតារាងសញ្ញាខាងក្រោម

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$x - 1$	-	-	0	+
$\frac{x - 1}{x}$	+	-	0	+

តាមតារាងសញ្ញាខាងលើឃើញថា $\frac{x-1}{x} > 0$ កាលណា $x \in (-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$

ដូចនេះ: ដែនកំណត់នៃ f គឺ $\mathbb{D}_f = (-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$

ហើយ $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[\frac{x}{2} - \ln\left(\frac{x-1}{x}\right) \right]$
 $= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[\frac{x}{2} - \ln\left(1 - \frac{1}{x}\right) \right]$
 $= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[\frac{x}{2} - \ln\left(1 - \frac{1}{x}\right) \right]$
 $= \pm\infty$

$\left[\because \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \ln\left(1 - \frac{1}{x}\right) = \ln 1 = 0 \right]$

$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left[\frac{x}{2} - \ln\left(\frac{x-1}{x}\right) \right]$

$$= 0 - (+\infty)$$

$$= -\infty$$

$$\text{និង } \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left[\frac{x}{2} - \ln \left(\frac{x-1}{x} \right) \right]$$

$$= 0 - (-\infty)$$

$$= +\infty$$

$$\left[\because \lim_{x \rightarrow 0^-} \ln \left(\frac{x-1}{x} \right) = \ln \frac{-1}{0^-} = \ln(+\infty) = +\infty \right]$$

$$\left[\because \lim_{x \rightarrow 1^+} \ln \left(\frac{x-1}{x} \right) = \ln \frac{1^+ - 1}{1} = \ln 0^+ = -\infty \right]$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty; \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty \text{ និង } \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty}$$

តាមការគណនាខាងលើគឺ $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$ និង $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$

នោះយើងទាញបានថាបន្ទាត់ឈរ $x = 0$ និង $x = 1$ ជាអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C)

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{\text{បន្ទាត់ } x = 0 \text{ និង } x = 1 \text{ ជាអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C)}}$$

ខ) បង្ហាញថាបន្ទាត់ (d) : $y = \frac{x}{2}$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C)

$$\text{ពិនិត្យ } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (y_C - y_d) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[\frac{x}{2} - \ln \left(\frac{x-1}{x} \right) - \frac{x}{2} \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[-\ln \left(\frac{x-1}{x} \right) \right]$$

$$= 0$$

$[\because \text{គណនាដូចខាងលើ}]$

នាំឱ្យបន្ទាត់ (d) : $y = \frac{x}{2}$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C)

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{\text{បន្ទាត់ (d) : } y = \frac{x}{2} \text{ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C)}}$$

គ) គណនា $f'(x)$ និងសង់តារាងអថេរភាព f

$$\text{យើងបាន } f'(x) = \left[\frac{x}{2} - \ln \left(\frac{x-1}{x} \right) \right]'$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{\left(\frac{x-1}{x} \right)'}{\frac{x-1}{x}}$$

$$\left[\because (\ln u)' = \frac{u'}{u} \right]$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{x}{x-1} \cdot \frac{(x-1)'x - (x)'(x-1)}{x^2}$$

$$\left[\because \left(\frac{u}{v} \right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2} \right]$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{x}{x-1} \cdot \frac{x - (x-1)}{x^2}$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{x}{x-1} \cdot \frac{1}{x^2}$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{x(x-1)}$$

$$= \frac{x(x-1) - 2}{2x(x-1)}$$

$$= \frac{x^2 - x - 2}{2x(x-1)}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{f'(x) = \frac{x^2 - x - 2}{2x(x-1)}}$$

ដោយ $x(x-1) > 0$ ចំពោះគ្រប់ $x \in D_f$ នោះ $f'(x)$ មានសញ្ញាដូចភាគយក $x^2 - x - 2$

យក $f'(x) = 0 \implies x^2 - x - 2 = 0 \implies x_1 = -1; x_2 = 2$

$[\because \text{មេគុណ } a - b + c = 0]$

យើងបានតារាងរាងសញ្ញា $f'(x)$ ដូចខាងក្រោម

x	$-\infty$	-1		2	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	+

ដោយ $f'(x)$ ប្តូរសញ្ញាត្រង់ $x = -1$ និង $x = 2$ យើងបានតម្លៃបរិមាធៀបនៃ f ដូចខាងក្រោម

$$f(-1) = -\frac{1}{2} - \ln\left(\frac{-1-1}{-1}\right) = -\frac{1}{2} - \ln 2 = -0.5 - 0.7 = -1.2$$

$$[\because \ln 2 = 0.7]$$

$$f(2) = 1 - \ln\left(\frac{2-1}{2}\right) = 1 - \ln \frac{1}{2} = 1 + \ln 2 = 1 + 0.7 = 1.7$$

$$\left[\because \ln \frac{1}{2} = -\ln 2\right]$$

តារាងអថេរភាព f

x	$-\infty$	-1	0	1	2	$+\infty$	
f'(x)	+	0	-		-	0	+
f(x)	$-\infty$	$\nearrow$	-1.2	$\searrow$	$-\infty$		
						$+\infty$	$\nearrow$
						1.7	$\searrow$
							$+\infty$

ឃ) សង់ក្រាប (C) និងអាស៊ីមតូតរបស់វាក្នុងតម្រុយតែមួយ

បន្ទាត់ (d) : $y = \frac{x}{2}$ $\begin{array}{c|cc} x & 0 & 2 \\ \hline y & 0 & 1 \end{array}$

