

គ្រឿងប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង៖

វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យា (វិទ្យាសាស្ត្រពិត)

រយៈពេល ១៥០នាទី

ពិន្ទុសរុប ១២៥ពិន្ទុ

មណ្ឌលប្រឡង

លេខបន្ទប់ លេខតុ

ឈ្មោះបេក្ខជន

ហត្ថលេខា

វិញ្ញាសា ០៦

I គេឱ្យសមីការ (E) : $z^2 + iaz + a + ib = 0$ ដែល $a, b \in \mathbb{R}$ ។

- ក កំណត់ a, b ដើម្បីឱ្យ $z_1 = -1 + i\sqrt{3}$ ជាឫសមួយនៃសមីការ (E) រួចទាញរកឫសមួយទៀត។
- ខ សរសេរ z_1, z_2 និង $\frac{z_1}{z_2}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។
- គ ទាញរកតម្លៃប្រាកដនៃ $\cos \frac{5\pi}{12}$ និង $\sin \frac{5\pi}{12}$ ។

II គណនាលីមីតខាងក្រោម

- ក $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{1 - \sqrt{x}} - \frac{2}{1 - x} \right)$
- ខ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\ln(1 + x)}$
- គ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin [\sin(\sin x)]}{x}$

III ក្នុងថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្សសរុប៣៥នាក់ ដែលក្នុងនោះសិស្សប្រុសមាន ពីរភាគបីនៃសិស្សស្រី។ គេជ្រើសរើសសិស្សបីនាក់ដោយចៃដន្យដើម្បីចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាមួយស្តីពីបរិស្ថាន។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

- ក ជ្រើសរើសបានសិស្សស្រីទាំងបីនាក់។
- ខ ជ្រើសរើសបានសិស្សប្រុសពីរនាក់ និងសិស្សស្រីម្នាក់។
- គ ជ្រើសរើសបានយ៉ាងតិចសិស្សប្រុសម្នាក់។

IV ១ គណនាអាំងតេក្រាលខាងក្រោម

- ក $I = \int_1^2 \frac{2x + 3}{x^2 + 3x + 1} dx$
- ខ $J = \int_e^{e^2} \frac{dx}{x \ln x}$

២ រកចម្លើយមួយនៃសមីការ (E) : $y'' - 2y' + 2y = 0$ ដោយដឹងថា $y'(0) = 2$ និង $y(0) = 1$ ។

V ១ គេឱ្យសមីការអ៊ីពែបូល $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$ ។ រកកូអរដោនេផ្ចិត កំពូល កំណុំ សមីការអាស៊ីមតូត រួចសង់អ៊ីពែបូលនេះ។

- ២ ក្នុងតម្រុយមានទិសដៅវិជ្ជមាន $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេមានបួនចំណុច $A(0, 2, 1)$; $B(2, 0, 2)$; $C(1, 4, 3)$ និង $D(-1, 2, 0)$ ។
 - ក បង្ហាញថា ABC ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A ។
 - ខ គណនា $\vec{AB} \times \vec{AC}$ និងក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC ។ តើបួនចំណុច A, B, C, D អាចបង្កើតបានចតុមុខមួយឬទេ?
 - គ គណនា $\vec{AD} \cdot \vec{BC}$ រួចបង្ហាញថា (AD) ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ $\angle BAC$ ។
 - ឃ រកកូអរដោនេចំណុច E ដោយដឹងថា $\vec{AE} = \frac{1}{3} (\vec{AB} \times \vec{AC})$ ។ គណនាមាឌតេត្រាអែត $EABC$ ។

VI ១ ផ្នែក A: គេមានអនុគមន៍ $f(x) = x - 1 + \ln x$ ចំពោះគ្រប់ $x > 0$ ។

- ក បង្ហាញថា $f'(x) > 0$ ។
- ខ គណនា $f(1)$ រួចសិក្សាសញ្ញានៃ $f(x)$ (មិនបាច់រកលីមីតចុងដែនកំណត់)។

២ ផ្នែក B: គេឱ្យអនុគមន៍ $g(x) = 1 - \ln x + \frac{\ln x}{x}$ ចំពោះគ្រប់ $x > 0$ ។

- ក គណនាលីមីតចុងដែនកំណត់នៃ g រួចទាញរកអាស៊ីមតូតនៃក្រាប (C) តាងអនុគមន៍ g ។
- ខ បង្ហាញថា $g'(x) = -\frac{f(x)}{x^2}$ ។ ទាញរកសញ្ញានៃ $g'(x)$ ។ គូសតារាងអថេរភាព g ។
- គ គណនា $g(1/e)$; $g(3)$ និង $g(4)$ ។ ទាញបញ្ជាក់ថាក្រាប (C) កាត់អ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រង់ α និង β ដែល

$$\frac{1}{e} < \alpha < 1; 3 < \beta < 4$$

ឃ្លា សង់ក្រាប (C) ។

ដំណោះស្រាយ

- I ក) កំណត់ a, b រួចទាញរកឫសមួយទៀតនៃ (E)
ដើម្បីឱ្យ $z_1 = -1 + i\sqrt{3}$ ជាឫសមួយនៃសមីការ (E) : $z^2 + iaz + a + ib = 0$ កាលណា៖

$$\begin{aligned} (-1 + i\sqrt{3})^2 + ia(-1 + i\sqrt{3}) + a + ib &= 0 \\ 1 - 2i\sqrt{3} - 3 - ai - a\sqrt{3} + a + bi &= 0 \\ (-2 - a\sqrt{3} + a) + (-2\sqrt{3} - a + b)i &= 0 \end{aligned}$$

$$\text{នាំឱ្យ} \begin{cases} -2 - a\sqrt{3} + a = 0 \\ -2\sqrt{3} - a + b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a(1 - \sqrt{3}) = 2 \\ b = a + 2\sqrt{3} \end{cases}$$

$$\text{នាំឱ្យ} \begin{cases} a = \frac{2}{1 - \sqrt{3}} = \frac{2(1 + \sqrt{3})}{(1 - \sqrt{3})(1 + \sqrt{3})} = \frac{2(1 + \sqrt{3})}{-2} = -1 - \sqrt{3} \\ b = -1 - \sqrt{3} + 2\sqrt{3} = -1 + \sqrt{3} \end{cases}$$

ដូចនេះ: $\boxed{a = -1 - \sqrt{3} \text{ និង } b = -1 + \sqrt{3}}$

តាមរយៈតម្លៃនៃ a, b យើងបានសមីការ (E) : $z^2 + i(-1 - \sqrt{3})z - 1 - \sqrt{3} + i(-1 + \sqrt{3}) = 0$

តាមទ្រឹស្តីបទផ្សេង ផលបូកឫស $z_1 + z_2 = -\frac{i(-1 - \sqrt{3})}{1} \quad \left[\because ax^2 + bx + c = 0 \text{ មានផលបូកឫស } x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \right]$

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= i + i\sqrt{3} \\ z_2 &= i + i\sqrt{3} - z_1 \\ &= i + i\sqrt{3} - (-1 + i\sqrt{3}) \\ &= 1 + i \end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\boxed{\text{ឫសមួយទៀតនៃសមីការ (E) គឺ } z_2 = 1 + i}$

- ខ) សរសេរ z_1, z_2 និង $\frac{z_1}{z_2}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

យើងបាន $z_1 = -1 + i\sqrt{3}$

$$\begin{aligned} &= 2 \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ &= 2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right) \end{aligned}$$

$$z_2 = 1 + i$$

$$\begin{aligned} &= \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \\ &= \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{និង } \frac{z_1}{z_2} &= \frac{2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right)}{\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)} \\ &= \sqrt{2} \left[\cos \left(\frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right) \right] \\ &= \sqrt{2} \left(\cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12} \right) \end{aligned}$$

$$\text{ដូចនេះ: } z_1 = 2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right) ; z_2 = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) \text{ និង } \frac{z_1}{z_2} = \sqrt{2} \left(\cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12} \right)$$

គ) ទាញរកតម្លៃប្រាកដនៃ $\cos \frac{5\pi}{12}$ និង $\sin \frac{5\pi}{12}$

$$\text{យើងមាន } \frac{z_1}{z_2} = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{1 + i} = \frac{(-1 + i\sqrt{3})(1 - i)}{(1 + i)(1 - i)} = \frac{-1 + i + i\sqrt{3} + \sqrt{3}}{2} = \frac{-1 + \sqrt{3}}{2} + \frac{1 + \sqrt{3}}{2}i$$

$$\text{ហើយ } \frac{z_1}{z_2} = \sqrt{2} \left(\cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12} \right)$$

$$\text{យើងបាន } \sqrt{2} \left(\cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12} \right) = \frac{-1 + \sqrt{3}}{2} + \frac{1 + \sqrt{3}}{2}i$$

$$\sqrt{2} \cos \frac{5\pi}{12} + i\sqrt{2} \sin \frac{5\pi}{12} = \frac{-1 + \sqrt{3}}{2} + \frac{1 + \sqrt{3}}{2}i$$

$$\text{នាំឱ្យ } \begin{cases} \sqrt{2} \cos \frac{5\pi}{12} = \frac{-1 + \sqrt{3}}{2} \\ \sqrt{2} \sin \frac{5\pi}{12} = \frac{1 + \sqrt{3}}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \cos \frac{5\pi}{12} = \frac{-1 + \sqrt{3}}{2\sqrt{2}} \\ \sin \frac{5\pi}{12} = \frac{1 + \sqrt{3}}{2\sqrt{2}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \cos \frac{5\pi}{12} = \frac{-\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4} \\ \sin \frac{5\pi}{12} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4} \end{cases}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \cos \frac{5\pi}{12} = \frac{-\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4} \text{ និង } \sin \frac{5\pi}{12} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$$

II គណនាលីមីតខាងក្រោម

ក) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{1 - \sqrt{x}} - \frac{2}{1 - x} \right)$ (រាងមិនកំណត់ $\infty - \infty$)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{1 - \sqrt{x}} - \frac{2}{1 - x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{1}{1 - \sqrt{x}} - \frac{2}{1 - (\sqrt{x})^2} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{1}{1 - \sqrt{x}} - \frac{2}{(1 - \sqrt{x})(1 + \sqrt{x})} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 + \sqrt{x} - 2}{(1 - \sqrt{x})(1 + \sqrt{x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{(1 - \sqrt{x})(1 + \sqrt{x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\cancel{(1 - \sqrt{x})}}{\cancel{(1 - \sqrt{x})}(1 + \sqrt{x})} \\ &= \frac{-1}{1 + \sqrt{1}} \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$[\because a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)]$$

$$\text{ដូចនេះ: } \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{1 - \sqrt{x}} - \frac{2}{1 - x} \right) = -\frac{1}{2}$$

ខ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\ln(1 + x)}$ (រាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\ln(1 + x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x}(e^{2x} - 1)}{\ln(1 + x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} e^{-x} \cdot \left(\frac{e^{2x} - 1}{2x} \right) \cdot \left[\frac{x}{\ln(1 + x)} \right] \cdot 2 \\ &= e^0 \cdot (1) \cdot (1) \cdot 2 \\ &= 2 \end{aligned}$$

[$\because$ ទាញ e^{-x} ជាកត្តារួមនៅភាគយក]

$$\left[\because \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{2x} = 1 ; \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\ln(1 + x)} = 1 \right]$$

ដូចនេះ: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\ln(1+x)} = 2$

ក) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin[\sin(\sin x)]}{x} \left(\text{រាងមិនកំណត់} \frac{0}{0} \right)$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin[\sin(\sin x)]}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin[\sin(\sin x)]}{\sin(\sin x)} \cdot \frac{\sin(\sin x)}{\sin x} \cdot \frac{\sin x}{x}$$

$$= (1) \cdot (1) \cdot (1)$$

$$= 1$$

$$\left[\because \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin u(x)}{u(x)} = 1 \text{ បើ } \lim_{x \rightarrow a} u(x) = 0 \right]$$

ដូចនេះ: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin[\sin(\sin x)]}{x} = 1$

III តាង S លំហសំណាកនៃពិសោធន៍ចៃដន្យនេះ
ដោយក្នុងថ្នាក់រៀននោះមានសិស្សសរុប ៣៥ នាក់ ដែលក្នុងនោះសិស្សប្រុសមាន ពីរភាគបីនៃសិស្សស្រី
យើងបាន សិស្សស្រី + $\frac{2}{3}$ សិស្សស្រី = 35
 $\frac{5}{3}$ សិស្សស្រី = 35
សិស្សស្រី = 21

នាំឱ្យ សិស្សប្រុស = $\frac{2}{3} \times 21 = 14$

មួយវិញទៀតគេជ្រើសរើសសិស្សបីនាក់ចេញពីសិស្សសរុប 35 នាក់ យើងបាន

$$n(S) = C(35, 3) = \frac{35!}{(35-3)! \times 3!} = \frac{35!}{32! \times 3!} = \frac{35 \times 34 \times 33}{3 \times 2} = 35 \times 17 \times 11$$

ក) តាង A : ជាព្រឹត្តិការណ៍ជ្រើសរើសបានសិស្សស្រីទាំងបីនាក់
គេត្រូវជ្រើសរើសសិស្សស្រីបីនាក់ ចេញពីសិស្សស្រីសរុប 21 នាក់

យើងបាន $n(A) = C(21, 3) = \frac{21!}{(21-3)! \times 3!} = \frac{21!}{18! \times 3!} = \frac{21 \times 20 \times 19}{3 \times 2} = 7 \times 10 \times 19$

នាំឱ្យ $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{7 \times 10 \times 19}{35 \times 17 \times 11} = \frac{38}{187}$

ដូចនេះ: $P(A) = \frac{38}{187}$

ខ) តាង B : ជាព្រឹត្តិការណ៍ជ្រើសរើសបានសិស្សប្រុសពីរនាក់ និងសិស្សស្រីម្នាក់
គេត្រូវជ្រើសរើសសិស្សប្រុសពីរនាក់ចេញពីសិស្សប្រុសទាំង 14 នាក់ និងសិស្សស្រីម្នាក់ចេញពីសិស្សស្រីទាំង 21 នាក់

យើងបាន $n(B) = C(14, 2) \times C(21, 1) = \frac{14!}{(14-2)! \times 2!} \times 21 = \frac{14!}{12! \times 2!} \times 21 = \frac{14 \times 13}{2} \times 21 = 7 \times 13 \times 21$

នាំឱ្យ $P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{7 \times 13 \times 21}{35 \times 17 \times 11} = \frac{273}{935}$

ដូចនេះ: $P(B) = \frac{273}{935}$

គ) តាង C : ជាព្រឹត្តិការណ៍ជ្រើសរើសបានយ៉ាងតិចសិស្សប្រុសម្នាក់
នោះ A និង C ជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុយគ្នា

នាំឱ្យ $P(C) = 1 - P(A) = 1 - \frac{38}{187} = \frac{149}{187}$

ដូចនេះ: $P(C) = \frac{149}{187}$

IV ១ គណនាអាំងតេក្រាលខាងក្រោម

ក) $I = \int_1^2 \frac{2x+3}{x^2+3x+1} dx$ ពិនិត្យ $d(x^2+3x+1) = (x^2+3x+1)'dx = (2x+3)dx$

$$\begin{aligned}
 \text{យើងបាន } I &= \int_1^2 \frac{d(x^2 + 3x + 1)}{x^2 + 3x + 1} \\
 &= \left[\ln |x^2 + 3x + 1| \right]_1^2 \\
 &= \ln |2^2 + 3(2) + 1| - \ln |1^2 + 3(1) + 1| \\
 &= \ln 11 - \ln 5 \\
 &= \ln \frac{11}{5}
 \end{aligned}$$

$$\left[\cdot \int \frac{du}{u} = \ln |u| \right]$$

$$\left[\cdot \ln a - \ln b = \ln \frac{a}{b} \right]$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{I = \int_1^2 \frac{2x + 3}{x^2 + 3x + 1} dx = \ln \frac{11}{5}}$$

$$\textcircled{ខ} \quad J = \int_e^{e^2} \frac{dx}{x \ln x} \quad \text{ពិនិត្យ } d(\ln x) = (\ln x)' dx = \frac{1}{x} dx$$

$$\begin{aligned}
 \text{យើងបាន } J &= \int_e^{e^2} \frac{d(\ln x)}{\ln x} \\
 &= \left[\ln |\ln x| \right]_e^{e^2} \\
 &= \ln |\ln e^2| - \ln |\ln e| \\
 &= \ln 2 - \ln 1 \\
 &= \ln 2 - 0 \\
 &= \ln 2
 \end{aligned}$$

$$[\because \ln e^2 = 2 \ln e = 2 ; \ln e = 1]$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{J = \int_e^{e^2} \frac{dx}{x \ln x} = \ln 2}$$

V ១ រកកូអរដោនេផ្ចិត កំពូល កំណុំ សមីការអាស៊ីមតូត រួចសង់អ៊ីពែបូលនេះ


$$\text{យើងមានសមីការអ៊ីពែបូល } \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1 \iff \frac{x^2}{3^2} - \frac{y^2}{2^2} = 1$$

$$\text{ជាសមីការស្តង់ដារអ៊ីពែបូលដែលមានផ្ចិតនៅគល់តម្រុយ និងអ័ក្សទទឹងដេក៖ } \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$\text{យើងទាញបាន } \begin{cases} h = 0 ; k = 0 \\ a = 3 ; b = 2 \end{cases} \quad \text{ហើយ } c^2 = a^2 + b^2 \implies c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}$$

$$\text{នាំឱ្យ } \begin{cases} \text{ផ្ចិត} & I(0, 0) \\ \text{កំពូល} & V_{1,2} = (\pm h, 0) = (-3, 0); (3, 0) \\ \text{កំណុំ} & F_{1,2} = (\pm c, 0) = (-\sqrt{13}, 0); (\sqrt{13}, 0) \\ \text{អាស៊ីមតូត} & y_{1,2} = \pm \frac{b}{a}x = \pm \frac{2}{3}x \end{cases}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{\text{ផ្ចិត } I(0, 0) \text{ កំពូល } V_{1,2} = (-3, 0); (3, 0) \text{ កំណុំ } F_{1,2} = (-\sqrt{13}, 0); (\sqrt{13}, 0) \text{ និងអាស៊ីមតូត } y_{1,2} = \pm \frac{2}{3}x}$$



- ២ ក) បង្ហាញថា ABC ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A
 យើងមានបួនចំណុច $A(0, 2, 1)$; $B(2, 0, 2)$; $C(1, 4, 3)$ និង $D(-1, 2, 0)$
 យើងបាន $\overrightarrow{AB} = (2, -2, 1) \Rightarrow AB = \sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2} = \sqrt{9} = 3$
 និង $\overrightarrow{AC} = (1, 2, 2) \Rightarrow AC = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{9} = 3$
 នោះ: $AB = AC = 3$ នាំឱ្យ ABC ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A

ដូចនេះ: $\triangle ABC$ ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A

- ខ) គណនា $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ និងក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC

យើងបាន $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \vec{k} = -6\vec{i} - 3\vec{j} + 6\vec{k} = (-6, -3, 6)$

ដូចនេះ: $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (-6, -3, 6)$

តាមរូបមន្ត $S_{ABC} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \frac{1}{2} \sqrt{(-6)^2 + (-3)^2 + 6^2} = \frac{1}{2} \sqrt{36 + 9 + 36} = \frac{1}{2} \sqrt{81} = \frac{9}{2}$

ដូចនេះ: ក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC គឺ $S_{ABC} = \frac{9}{2}$ ឯកតាផ្ទៃ

តើបួនចំណុច A, B, C, D អាចបង្កើតបានចតុមុខមួយឬទេ?

ឧបមាថាបួនចំណុច A, B, C, D អាចបង្កើតបានចតុមុខមួយដែលមានមាឌ $V(V > 0)$

តាមរូបមន្ត $V = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD}|$

ដោយ $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (-6, -3, 6)$ និង $\overrightarrow{AD} = (-1, 0, -1)$

នោះ: $(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} = (-6)(-1) + (-3)(0) + (6)(-1) = 6 + 0 - 6 = 0$

នាំឱ្យ $V = \frac{1}{6} \times 0 = 0$ (ការឧបមាមិនពិត) មានន័យថាបួនចំណុច A, B, C, D មិនអាចបង្កើតបានចតុមុខមួយទេ

ដូចនេះ: $\boxed{\text{បួនចំណុច } A, B, C, D \text{ មិនអាចបង្កើតបានចតុមុខមួយទេ}}$

- គ) គណនា $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC}$ រួចបង្ហាញថា (AD) ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ $\angle BAC$
 យើងមាន $\overrightarrow{AD} = (-1, 0, -1)$ និង $\overrightarrow{BC} = (-1, 4, 1)$
 នាំឱ្យ $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = (-1)(-1) + (0)(4) + (-1)(1) = 1 + 0 - 1 = 0$

ដូចនេះ: $\boxed{\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = 0}$

ដោយ $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$ នោះ $AD \perp BC$ នាំឱ្យ AD ជាកម្ពស់នៃត្រីកោណ ABC
 ម្យ៉ាងទៀត ABC ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A នាំឱ្យ (AD) ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ $\angle BAC$

ដូចនេះ: $\boxed{(AD) \text{ ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ } \angle BAC}$

- ឃ) រកកូអរដោនេចំណុច E រួចគណនាមាឌតេត្រាអែត EABC

តាង $E(a, b, c)$ នាំឱ្យ $\overrightarrow{AE} = (a, b - 2, c - 1)$

ដោយដឹងថា $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3} (\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC})$ និង $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (-6, -3, 6)$ នោះយើងបាន

$$(a, b - 2, c - 1) = \frac{1}{3} \cdot (-6, -3, 6)$$

$$(a, b - 2, c - 1) = (-2, -1, 2)$$

$$\text{នាំឱ្យ } \begin{cases} a = -2 \\ b - 2 = -1 \\ c - 1 = 2 \end{cases}$$

$$\text{នាំឱ្យ } \begin{cases} a = -2 \\ b = 1 \\ c = 3 \end{cases}$$

$$\text{នាំឱ្យ } E(-2, 1, 3)$$

ដូចនេះ: $\boxed{\text{កូអរដោនេចំណុច } E(-2, 1, 3)}$

$$\text{ម្យ៉ាងទៀត } V_{EABC} = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AE}|$$

ដោយ $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (-6, -3, 6)$ និង $\overrightarrow{AE} = (-2, -1, 2)$

$$\text{នាំឱ្យ } (\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AE} = (-6)(-2) + (-3)(-1) + (6)(2) = 12 + 3 + 12 = 27$$

$$\text{យើងបាន } V_{EABC} = \frac{1}{6} \times 27 = \frac{9}{2}$$

ដូចនេះ: $\boxed{\text{មាឌតេត្រាអែត EABC គឺ } V_{EABC} = \frac{9}{2} \text{ ឯកតាមាឌ}}$

VI ១ ផ្នែក A:

- ក) បង្ហាញថា $f'(x) > 0$

យើងមានអនុគមន៍ $f(x) = x - 1 + \ln x$ ចំពោះគ្រប់ $x > 0$

យើងបាន $f'(x) = (x - 1 + \ln x)'$

$$= 1 + \frac{1}{x} \quad \left[\because (1)' = 0 ; (x)' = 1 ; (\ln x)' = \frac{1}{x} \right]$$

$$= \frac{x+1}{x} > 0 \text{ ចំពោះគ្រប់ } x > 0$$

ដូចនេះ: $\boxed{f'(x) > 0}$

- ខ) គណនា $f(1)$ រួចសិក្សាសញ្ញានៃ $f(x)$ (មិនបាច់រកលីមីតចុងដែនកំណត់)

យើងបាន $f(1) = 1 - 1 + \ln 1 = 0$

តារាងអថេរភាព f

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	0
$f(x)$			0

តាមតារាងអថេរភាព f ឃើញថា៖

- $f(x) < 0$ ពេល $x \in (0, 1)$
- $f(x) > 0$ ពេល $x \in (1, +\infty)$

២ ផ្នែក B:

ក គណនាលីមីតចុងដែនកំណត់នៃ g រួចទាញរកអាស៊ីមតូតនៃក្រាប (C) តាងអនុគមន៍ g

យើងមានអនុគមន៍ $g(x) = 1 - \ln x + \frac{\ln x}{x}$ ចំពោះគ្រប់ $x > 0$

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 - \ln x + \frac{\ln x}{x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[1 - \left(1 - \frac{1}{x} \right) \ln x \right] \\ &= 1 - [1 - (+\infty)](-\infty) \quad \left[\because \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty ; \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \right] \\ &= -\infty \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{និង } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \ln x + \frac{\ln x}{x} \right) \\ &= 1 - (+\infty) + 0 \quad \left[\because \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty ; \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \right] \\ &= -\infty \end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty$ និង $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$

ដោយ $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty$ នោះបន្ទាត់ $x = 0$ ជាអាស៊ីតតូតលរនៃក្រាប (C) ផ្នែក $-\infty$

ដូចនេះ: បន្ទាត់ $x = 0$ ជាអាស៊ីតតូតលរនៃក្រាប (C) ផ្នែក $-\infty$

ខ បង្ហាញថា $g'(x) = -\frac{f(x)}{x^2}$ រួចទាញរកសញ្ញានៃ $g'(x)$ និង គូសតារាងអថេរភាព g

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } g'(x) &= \left(1 - \ln x + \frac{\ln x}{x} \right)' \\ &= -\frac{1}{x} + \frac{(\ln x)'x - (x') \ln x}{x^2} \quad \left[\because \left(\frac{u}{v} \right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2} \right] \\ &= -\frac{1}{x} + \frac{\left(\frac{1}{x} \right) \cdot x - \ln x}{x^2} \\ &= -\frac{1}{x} + \frac{1 - \ln x}{x^2} \\ &= \frac{-x + 1 - \ln x}{x^2} \\ &= -\frac{x - 1 + \ln x}{x^2} \\ &= -\frac{f(x)}{x^2} \quad \left[\because f(x) = x - 1 + \ln x \right] \end{aligned}$$

ដូចនេះ: $g'(x) = -\frac{f(x)}{x^2}$

តាមការគណនាខាងលើ យើងទាញបាន $g'(x)$ មានសញ្ញាដូច $-f(x)$

- ពេល $x = 1$ គឺ $f(x) = 0 \Rightarrow -f(x) = 0 \Rightarrow g(x)' = 0$
- ពេល $x \in (0, 1)$ គឺ $f(x) < 0 \Rightarrow -f(x) > 0 \Rightarrow g(x)' > 0$
- ពេល $x \in (1, +\infty)$ គឺ $f(x) > 0 \Rightarrow -f(x) < 0 \Rightarrow g(x)' < 0$

ដូចនេះ $g(x)' = 0$ ពេល $x = 1$; $g(x)' > 0$ ពេល $x \in (0, 1)$ និង $g(x)' < 0$ ពេល $x \in (1, +\infty)$

ហើយ $g(1) = 1 - \ln 1 + \frac{\ln 1}{1} = 1$

តារាងអថេរភាព g

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$		+	0
$g(x)$		$-\infty$	$-\infty$

- គ) គណនា $g(1/e)$; $g(3)$ និង $g(4)$ រួចទាញបញ្ជាក់ថាប្រាប (C) កាត់អ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រង់ α និង β ដែល $\frac{1}{e} < \alpha < 1$; $3 < \beta < 4$

យើងបាន $g(1/e) = 1 - \ln \frac{1}{e} + \frac{\ln \frac{1}{e}}{\frac{1}{e}} = 1 + 1 - e = 2 - e = 2 - 2.7 = -0.7$ $[\because e = 2.7 ; \ln \frac{1}{e} = -1]$

$g(3) = 1 + \ln 3 + \frac{\ln 3}{3} = 1 - 1.1 + \frac{1.1}{3} = -0.1 + 0.36 = 0.26$ $[\because \ln 3 = 1.1]$

និង $g(4) = 1 - \ln 4 + \frac{\ln 4}{4} = 1 - 2 \ln 2 + \frac{2 \ln 2}{4} = 1 - 2(0.7) + \frac{0.7}{2}$
 $= 1 - 1.4 + 0.35 = -0.05$ $[\because \ln 4 = 2 \ln 2 ; \ln 2 = 0.7]$

ដូចនេះ $g(1/e) = -0.7$; $g(3) = 0.26$ និង $g(4) = -0.05$

ម្យ៉ាងទៀត ដោយ $g(1/e) = -0.7 < 0$ និង $g(1) = 1$ នោះ $g(1/e) \cdot g(1) < 0$

នាំឱ្យប្រាប (C) កាត់អ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រង់ α ដែល $\frac{1}{e} < \alpha < 1$

ហើយ $g(3) = 0.26 > 0$ និង $g(4) = -0.05 < 0$ នោះ $g(3) \cdot g(4) < 0$

នាំឱ្យប្រាប (C) កាត់អ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រង់ β ដែល $3 < \beta < 4$

ដូចនេះ ប្រាប (C) កាត់អ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រង់ α និង β ដែល $\frac{1}{e} < \alpha < 1$; $3 < \beta < 4$

- ឃ) សង់ប្រាប (C)

