

ពិន្ទុសរុប ១២៥ពិន្ទុ

ហត្ថលេខា

ដំណោះស្រាយ

I ក) គណនា $z = a + b$; $w = a - b$ និង $\frac{z}{w}$ ជាទម្រង់ពីជគណិត

យើងមានចំនួនកុំផ្លិច $a = 1 + \frac{\sqrt{3}+1}{2}i$ និង $b = \frac{\sqrt{3}-1}{2}i$

យើងបាន $z = 1 + \frac{\sqrt{3}+1}{2}i + \frac{\sqrt{3}-1}{2}i = 1 + \frac{\sqrt{3}+1+\sqrt{3}-1}{2}i = 1 + i\sqrt{3}$

$w = 1 + \frac{\sqrt{3}+1}{2}i - \frac{\sqrt{3}-1}{2}i = 1 + \frac{\sqrt{3}+1-\sqrt{3}+1}{2}i = 1 + i$

និង $\frac{z}{w} = \frac{1+i\sqrt{3}}{1+i} = \frac{(1+i\sqrt{3})(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{1-i+i\sqrt{3}-i^2\sqrt{3}}{1^2-i^2}$
 $= \frac{(\sqrt{3}+1) + (\sqrt{3}-1)i}{2} = \frac{\sqrt{3}+1}{2} + \frac{\sqrt{3}-1}{2}i$

ដូចនេះ: $z = 1 + i\sqrt{3}$; $w = 1 + i$ និង $\frac{z}{w} = \frac{\sqrt{3}+1}{2} + \frac{\sqrt{3}-1}{2}i$

ខ) សរសេរ z ; w និង $\frac{z}{w}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

យើងបាន $z = 1 + i\sqrt{3}$

$$= 2 \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right)$$

$$= 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$$

$w = 1 + i$

$$= \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$= \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

និង $\frac{z}{w} = \frac{2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)}{\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)}$

$$= \sqrt{2} \left[\cos \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right) \right]$$

$$= \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12} \right)$$

ដូចនេះ: $\frac{z}{w} = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12} \right)$

គ) រកតម្លៃប្រាកដនៃ $\cos \frac{\pi}{12}$ និង $\sin \frac{\pi}{12}$

យើងមាន $\frac{z}{w} = \frac{\sqrt{3}+1}{2} + \frac{\sqrt{3}-1}{2}i$ និង $\frac{z}{w} = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12} \right)$

យើងបាន $\frac{\sqrt{3}+1}{2} + \frac{\sqrt{3}-1}{2}i = \sqrt{2} \cos \frac{\pi}{12} + i\sqrt{2} \sin \frac{\pi}{12}$

$$\text{នាំឱ្យ} \begin{cases} \sqrt{2} \cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{3}+1}{2} \\ \sqrt{2} \sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{3}-1}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} \\ \sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4} \end{cases}$$

ដូចនេះ: $\cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ និង $\sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$

II គណនាលីមីតខាងក្រោម

ក) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-x} \right)^{\frac{1}{x}}$ (រាងមិនកំណត់ 1^∞)

$$\begin{aligned}
\text{យើងបាន } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-x} \right)^{\frac{1}{x}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1-x+2x}{1-x} \right)^{\frac{1}{x}} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{2x}{1-x} \right)^{\frac{1}{x}} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{\frac{1-x}{2x}} \right)^{\frac{1-x}{2x} \cdot \frac{2}{1-x}} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{1-x}{2x}} \right)^{\frac{1-x}{2x}} \right]^{\frac{2}{1-x}} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{2}{1-x}} \\
&= e^{\frac{2}{1-0}} \\
&= e^2
\end{aligned}$$

$$[\because a^{mn} = (a^m)^n]$$

$$\left[\because \lim_{x \rightarrow a} \left(1 + \frac{1}{u} \right)^u = e \text{ បើ } \lim_{x \rightarrow a} u = \infty \right]$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-x} \right)^{\frac{1}{x}} = e^2}$$

$$\textcircled{ខ} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^x + 4^x}{2^x + 4^x} \quad \left(\text{រាងមិនកំណត់ } \frac{\infty}{\infty} \right)$$

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^x + 4^x}{2^x + 4^x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4^x \left(\frac{3^x}{4^x} + 1 \right)}{4^x \left(\frac{2^x}{4^x} + 1 \right)} \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\frac{3}{4} \right)^x + 1}{\left(\frac{2}{4} \right)^x + 1} \\
&= \frac{0 + 1}{0 + 1}
\end{aligned}$$

$$[\because \text{ទាញ } 4^x \text{ ជាកត្តារួម}]$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^x + 4^x}{2^x + 4^x} = 1}$$

$$\textcircled{គ} \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{\sqrt{2} - \sqrt{2 - \cos^2 x}} \quad \left(\text{រាងមិនកំណត់ } \frac{0}{0} \right)$$

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{\sqrt{2} - \sqrt{2 - \cos^2 x}} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(1 - \sin x)(\sqrt{2} + \sqrt{2 - \cos^2 x})}{(\sqrt{2} - \sqrt{2 - \cos^2 x})(\sqrt{2} + \sqrt{2 - \cos^2 x})} \\
&= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(1 - \sin x)(\sqrt{2} + \sqrt{2 - \cos^2 x})}{2 - (2 - \cos^2 x)} \\
&= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(1 - \sin x)(\sqrt{2} + \sqrt{2 - \cos^2 x})}{\cos^2 x} \\
&= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(1 - \sin x)(\sqrt{2} + \sqrt{2 - \cos^2 x})}{1 - \sin^2 x} \\
&= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cancel{(1 - \sin x)}(\sqrt{2} + \sqrt{2 - \cos^2 x})}{\cancel{(1 - \sin x)}(1 + \sin x)} \\
&= \frac{\sqrt{2} + \sqrt{2 + 0}}{1 + 1} \\
&= \sqrt{2}
\end{aligned}$$

$$[\because \text{គុណកន្សោមឆ្លាស់}]$$

$$[\because \sin^2 x + \cos^2 x = 1 \implies \cos^2 x = 1 - \sin^2 x]$$

$$[\because a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)]$$

ដូចនេះ:
$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{\sqrt{2} - \sqrt{2 - \cos^2 x}} = \sqrt{2}$$

III តាង S ជាលំហសំណាកនៃពិសោធន៍ចៃដន្យនេះ

ដោយគេចាប់យកបិទ 4 ដើមចេញពីបិទសរុបទាំង 12 ដើម

យើងបាន $n(S) = C(12, 4) = \frac{12!}{(12-4)! \times 4!} = \frac{12!}{8! \times 4!} = \frac{12 \times 11 \times 10 \times 9}{4 \times 3 \times 2} = 11 \times 9 \times 5$

A : ចាប់បានបិទខ្មៅទាំង 4 ដើម

គេត្រូវចាប់បិទខ្មៅ 4 ដើមចេញពីបិទខ្មៅសរុប 5 ដើម

យើងបាន $n(A) = C(5, 4) = 5$

នាំឱ្យ $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{5}{11 \times 9 \times 5} = \frac{1}{99}$

ដូចនេះ:
$$P(A) = \frac{1}{99}$$

B : ចាប់បានបិទទាំង 4 ដើមពណ៌ខ្ពស់ៗគ្នា

ដោយបិទដែលត្រូវចាប់មានតែបីពណ៌ប៉ុណ្ណោះ នោះព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនអាចកើតឡើងនោះទេ

នាំឱ្យ $P(B) = 0$

ដូចនេះ:
$$P(B) = 0$$

C : ចាប់បានបិទពណ៌ខៀវនិងក្រហម

ដោយបិទពណ៌ខៀវមាន 3 ដើម និងបិទពណ៌ក្រហមមាន 4 ដើម នោះមានបីករណីដូចខាងក្រោម៖

- ចាប់បានបិទខៀវ 1 និងក្រហម 3
ចំនួនរបៀប = $C(3, 1) \times C(4, 3) = 3 \times 4 = 12$
- ចាប់បានបិទខៀវ 2 និងក្រហម 2
ចំនួនរបៀប = $C(3, 2) \times C(4, 2) = 3 \times 6 = 18$
- ចាប់បានបិទខៀវ 3 និងក្រហម 1
ចំនួនរបៀប = $C(3, 3) \times C(4, 1) = 1 \times 4 = 4$

យើងបាន $n(C) = 12 + 18 + 4 = 34$

នាំឱ្យ $P(C) = \frac{34}{11 \times 9 \times 5} = \frac{34}{495}$

ដូចនេះ:
$$P(C) = \frac{34}{495}$$

IV ១ គេឱ្យ $I(t) = \int_0^t \frac{3dx}{4x^2 + 5x + 1}$ ដែល $t > 0$

ក កំណត់ a និង b ដើម្បីឱ្យ $\frac{3}{4x^2 + 5x + 1} = \frac{a}{x+1} + \frac{b}{4x+1}$

យើងបាន
$$\frac{3}{4x^2 + 5x + 1} = \frac{a(4x+1) + b(x+1)}{(x+1)(4x+1)}$$

$$\frac{3}{4x^2 + 5x + 1} = \frac{4ax + a + bx + b}{4x^2 + x + 4x + 1}$$

$$\frac{3}{4x^2 + 5x + 1} = \frac{(4a+b)x + (a+b)}{4x^2 + 5x + 1}$$

នាំឱ្យ $3 = (4a+b)x + (a+b)$

$0x + 3 = (4a+b)x + (a+b)$

នាំឱ្យ
$$\begin{cases} 4a+b=0 & (1) \\ a+b=3 & (2) \end{cases}$$

យក (1) - (2) នាំឱ្យ $3a = -3 \implies a = -1$

តាម (2) នាំឱ្យ $b = 3 - a = 3 - (-1) = 4$

ដូចនេះ: $\boxed{a = -1 \text{ និង } b = 4}$

ខ) គណនា $I(t)$ ជាអនុគមន៍នៃ t រួចទាញរក $\lim_{t \rightarrow +\infty} I(t)$

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } I(t) &= \int_0^t \left(\frac{-1}{x+1} + \frac{4}{4x+1} \right) dx \\ &= \left[-\ln|x+1| + 4 \times \frac{1}{4} \ln|4x+1| \right]_0^t \\ &= \left[\ln|4x+1| - \ln|x+1| \right]_0^t \\ &= \left[\ln \left| \frac{4x+1}{x+1} \right| \right]_0^t \\ &= \ln \frac{4t+1}{t+1} - \ln \frac{0+1}{0+1} \\ &= \ln \frac{4t+1}{t+1} - \ln 1 \\ &= \ln \frac{4t+1}{t+1} \end{aligned} \quad \left[\because \int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a} \ln|ax+b| \right]$$

$$\left[\because \ln a - \ln b = \ln \frac{a}{b} \right]$$

ដូចនេះ: $\boxed{I(t) = \ln \frac{4t+1}{t+1} ; \forall t > 0}$

មួយវិញទៀត $\lim_{t \rightarrow +\infty} I(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \ln \frac{4t+1}{t+1} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \ln \frac{t \left(4 + \frac{1}{t} \right)}{t \left(1 + \frac{1}{t} \right)} = \ln 4 = \ln 2^2 = 2 \ln 2$

ដូចនេះ: $\boxed{\lim_{t \rightarrow +\infty} I(t) = 2 \ln 2}$

២) ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) : $y'' - 2y' + 5y = 0$

សមីការសម្គាល់ $\lambda^2 - 2\lambda + 5 = 0$ មាន $\Delta' = (b')^2 - ac = (-1)^2 - (1) \cdot (5) = -4$ នាំឱ្យ $\sqrt{\Delta'} = \sqrt{-4} = 2i$

នាំឱ្យ $x = \frac{-b' \pm \sqrt{\Delta'}}{a} = 1 \pm 2i$ (រាង $\alpha \pm \beta i$)

នោះចម្លើយនៃសមីការ (E) គឺ $y = e^{\alpha x} (A \cos \beta x + B \sin \beta x) = e^x (A \cos 2x + B \sin 2x)$ ដែល $A, B \in \mathbb{R}$

គេដឹងថា $y(0) = 1 \implies e^0 (A \cos 0 + B \sin 0) = 1 \implies A = 1$

និង $y' = [e^x (A \cos 2x + B \sin 2x)]'$

$$= (e^x)' (A \cos 2x + B \sin 2x) + e^x (A \cos 2x + B \sin 2x)' \quad [\because (uv)' = u'v + uv']$$

$$= e^x (A \cos 2x + B \sin 2x) + e^x (-2A \sin 2x + 2B \cos 2x) \quad [\because (\cos ax)' = -a \sin ax ; (\sin ax)' = a \cos ax]$$

$$= e^x (A \cos 2x + B \sin 2x - 2A \sin 2x + 2B \cos 2x) \quad [\because \text{ទាញ } e^x \text{ ជាកត្តារួម}]$$

$$= e^x [(A + 2B) \cos 2x + (B - 2A) \sin 2x]$$

ហើយ $y'(0) = 5 \implies e^0 [(A + 2B) \cos 0 + (B - 2A) \sin 0] = 5$

$$A + 2B = 5$$

$$2B = 5 - A$$

$$2B = 5 - 1$$

$$B = 2$$

នាំឱ្យ $y = e^x (\cos 2x + 2 \sin 2x)$

ដូចនេះ: $\boxed{\text{ចម្លើយនៃសមីការ (E) គឺ } y = e^x (\cos 2x + 2 \sin 2x)}$

V ក) គណនា $\vec{BA} \times \vec{BC}$ រួចទាញថាបីចំណុច A, B, C មិនប្រសព្វលើបន្ទាត់តែមួយ

យើងមានចំណុច A(0, -1, 6) ; B(2, 0, 4) ; C(8, 1, 0) និង D(0, -4, 0)

យើងបាន $\vec{BA} = (0 - 2, -1 - 0, 6 - 4) = (-2, -1, 2)$

និង $\vec{BC} = (8 - 2, 1 - 0, 0 - 4) = (6, 1, -4)$

$$\text{នាំឱ្យ } \vec{BA} \times \vec{BC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -2 & -1 & 2 \\ 6 & 1 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 6 & -4 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ 6 & 1 \end{vmatrix} \vec{k} = 2\vec{i} + 4\vec{j} + 4\vec{k} \neq \vec{0}$$

នាំឱ្យ $\vec{BA}$ និង $\vec{BC}$ មិនកូលីនេអ៊ែរគ្នា មានន័យថាបីចំណុច A, B, C មិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ

$$\text{ដូចនេះ: } \vec{BA} \times \vec{BC} = (2, 4, 4) \text{ និងបីចំណុច A, B, C មិនស្ថិតលើបន្ទាត់តែមួយ}$$

- ខ) ផ្ទៀងផ្ទាត់ថា $\vec{DB} = \vec{BA} \times \vec{BC}$ និងសរសេរសមីការប្លង់ (ABC) ទាញរកក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC យើងបាន $\vec{DB} = (2 - 0, 0 - (-4), 4 - 0) = (2, 4, 4) = \vec{BA} \times \vec{BC}$

$$\text{ដូចនេះ: } \vec{DB} = \vec{BA} \times \vec{BC}$$

ដោយ $\vec{DB} = \vec{BA} \times \vec{BC}$ នោះ $\vec{DB}$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ (ABC)

សមីការប្លង់ (ABC) កាត់តាមចំណុច A(0, -1, 6) និងមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{DB} = (2, 4, 4)$ កំណត់ដោយ៖

$$2(x - 0) + 4[y - (-1)] + 4(z - 6) = 0$$

$$2x + 4y + 4 + 4z - 24 = 0$$

$$2x + 4y + 4z - 20 = 0$$

$$x + 2y + 2z - 10 = 0$$

$$\text{ដូចនេះ: } \text{សមីការប្លង់ (ABC): } x + 2y + 2z - 10 = 0$$

$$\text{តាមរូបមន្ត } S_{ABC} = \frac{1}{2} |\vec{BA} \times \vec{BC}| = \frac{1}{2} \sqrt{2^2 + 4^2 + 4^2} = \frac{1}{2} \sqrt{36} = 3$$

$$\text{ដូចនេះ: } \text{ក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC គឺ } S_{ABC} = 3 \text{ ឯកតាផ្ទៃ}$$

- គ) គណនាកូអរដោនេចំណុច E

$$\text{តាង } E(a, b, c) \text{ នោះ } \vec{BE} = (a - 2, b, c - 4)$$

ដោយ E ជាចំណុចឆ្លុះនៃ D ធៀបនឹងប្លង់ (ABC)


នោះចំណុច D, B, E ត្រូវគ្នា និង DB = BE

មានន័យថា $\vec{DB} = \vec{BE}$

$$\text{នាំឱ្យ } (2, 4, 4) = (a - 2, b, c - 4)$$

$$\text{នាំឱ្យ } \begin{cases} 2 = a - 2 \\ 4 = b \\ 4 = c - 4 \end{cases} \quad [\because \text{ផ្ទឹមកូអរដោនេត្រូវគ្នា}]$$

$$\text{នាំឱ្យ } \begin{cases} a = 4 \\ b = 4 \\ c = 8 \end{cases} \Rightarrow E(4, 4, 8)$$



$$\text{ដូចនេះ: } \text{កូអរដោនេចំណុច E គឺ } E(4, 4, 8)$$

- ឃ) រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់ (AC)

$$\text{យើងមាន } \vec{AC} = (8 - 0, 1 - (-1), 0 - 6) = (8, 2, -6)$$

បន្ទាត់ (AC) កាត់តាមចំណុច A(0, -1, 6) និងមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{AC} = (8, 2, -6)$ មានសមីការ៖

$$\begin{cases} x = 8t \\ y = 2t - 1 \\ z = -6t + 6 \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \text{សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់ (AC): } \begin{cases} x = 8t \\ y = 2t - 1 \\ z = -6t + 6 \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$$

- ង ស្រាយបំភ្លឺថាគ្រប់ចំណុច F នៅលើ (AC) គេបាន DEF ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល F ដោយគ្រប់ចំណុច $F \in (AC)$ នោះ $F \in (ABC)$ ហើយ $DE \perp (ABC)$ នោះ $DE \perp BF$ មួយវិញទៀត B កណ្តាល DE នាំឱ្យ BF ជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ DE នាំឱ្យ $FD = FE$ បានន័យថា $\triangle DEF$ ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល F

[$\therefore$ ទ្រឹស្តីបទមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់]

ដូចនេះ $\triangle DEF$ ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល F

VI ១ ផ្នែក A: គេឱ្យអនុគមន៍ $g(x) = -x^2 + 1 - \ln x$; $\forall x > 0$

ក សិក្សាទិសដៅអថេរភាពនៃ g

- លីមីតចុងដែនកំណត់ (ដោយ $x > 0$ នោះមានន័យថា $x \in (0, +\infty)$)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x^2 + 1 - \ln x) \\ &= -0 + 1 - (-\infty) \quad \left[\because \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \right] \\ &= +\infty \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (-x^2 + 1 - \ln x) \\ &= -(+\infty) + 1 - (+\infty) \quad \left[\because \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty \right] \\ &= -\infty \end{aligned}$$

- គណនា $g'(x)$ និងរកសញ្ញា $g'(x)$

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } g'(x) &= (-x^2 + 1 - \ln x)' \\ &= -2x - \frac{1}{x} \\ &= \frac{-2x^2 - 1}{x} \\ &= -\frac{2x^2 + 1}{x} \end{aligned}$$

$$\text{ចំពោះគ្រប់ } x > 0 \text{ នោះ } -\frac{2x^2 + 1}{x} < 0 \implies g'(x) < 0$$

ខ គណនា $g(1)$ រួចទាញរកសញ្ញានៃ $g(x)$

$$\text{យើងបាន } g(1) = -1^2 + 1 - \ln 1 = -1 + 1 - 0 = 0$$

តារាងអថេរភាព g

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$		0	
$g(x)$	$+\infty$	0	$-\infty$

តាមតារាងអថេរភាពខាងលើ យើងទាញបាន៖

- $g(x) > 0$ ពេល $x \in (0, 1)$
- $g(x) < 0$ ពេល $x \in (1, +\infty)$

ដូចនេះ $g(x) > 0$ ពេល $x \in (0, 1)$ និង $g(x) < 0$ ពេល $x \in (1, +\infty)$

២ ផ្នែក B: គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = -\frac{1}{2}x + 1 + \frac{\ln x}{2x}$ មានក្រាប (C)

ក គណនា $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ និង $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ រួចគូសតារាងអថេរភាព f

$$\text{យើងបាន } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-\frac{1}{2}x + 1 + \frac{\ln x}{2x} \right)$$

$$= -0 + 1 + (-\infty)$$

$$= -\infty$$

$$\text{និង } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{2}x + 1 + \frac{\ln x}{2x} \right)$$

$$= -(+\infty) + 1 + 0$$

$$= -\infty$$

$$\left[\because \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{2x} = -\infty \right]$$

$$\left[\because \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{2x} = 0 \right]$$

ដូចនេះ: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$ និង $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$

$$\begin{aligned} \text{ហើយ } f'(x) &= \left(-\frac{1}{2}x + 1 + \frac{\ln x}{2x} \right)' \\ &= -\frac{1}{2} + \frac{(\ln x)'(2x) - (2x)' \ln x}{(2x)^2} \\ &= -\frac{1}{2} + \frac{2 - 2 \ln x}{4x^2} \\ &= -\frac{1}{2} + \frac{1 - \ln x}{2x^2} \\ &= \frac{-x^2 + 1 - \ln x}{2x^2} \\ &= \frac{g(x)}{2x^2} \end{aligned}$$

ចំពោះគ្រប់ $x > 0$ នោះ $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $g(x)$ យើងទាញបាន៖

- $f'(x) = 0$ ពេល $x = 1$
- $f'(x) > 0$ ពេល $x \in (0, 1)$
- $f'(x) < 0$ ពេល $x \in (1, +\infty)$

$$\text{មួយវិញទៀត } f(1) = -\frac{1}{2}(1) + 1 + \frac{\ln 1}{2(1)} = -\frac{1}{2} + 1 + 0 = \frac{1}{2} = 0.5$$

យើងបានតារាងអថេរភាព f ដូចខាងក្រោម

x	0	1	$+\infty$	
f'(x)		+	0	-
f(x)			0.5	
			$-\infty$	$-\infty$

ខ) ស្រាយបន្ទាត់ (d) : $y = -\frac{1}{2}x + 1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ខាង $+\infty$ រួច សិក្សាទីតាំង (C) និង (d)

$$\begin{aligned} \text{ពិនិត្យ } \lim_{x \rightarrow +\infty} (y_C - y_d) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[-\frac{1}{2}x + 1 + \frac{\ln x}{2x} - \left(-\frac{1}{2}x + 1 \right) \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{2x} \\ &= 0 \end{aligned}$$

នាំឱ្យបន្ទាត់ (d) : $y = -\frac{1}{2}x + 1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ខាង $+\infty$

ដូចនេះ: បន្ទាត់ (d) : $y = -\frac{1}{2}x + 1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ខាង $+\infty$

ចំពោះគ្រប់ $x > 0$ នោះ $y_C - y_d$ មានសញ្ញាដូច $\ln x$


- ក្រាបប្រសព្វបន្ទាត់ពេល $\ln x = 0 \Rightarrow x = 1$

- ក្រាបនៅក្រោមបន្ទាត់ពេល $\ln x < 0 \Rightarrow 0 < x < 1$
- ក្រាបនៅលើបន្ទាត់ពេល $\ln x > 0 \Rightarrow x > 1$

ដូចនេះ: (C) ប្រសព្វ (d) ពេល $x = 1$; (C) នៅក្រោម (d) ពេល $x \in (0, 1)$; (C) នៅលើ (d) ពេល $x \in (1, +\infty)$

គ) សង់ (C) និង (d)

បន្ទាត់ (d): $y = -\frac{1}{2}x + 1$ $\begin{array}{c|cc} x & 0 & 2 \\ \hline y & 1 & 0 \end{array}$



ឃ) គណនាផ្ទៃនៃប្លង់ខណ្ឌដោយក្រាប (C) និង (d) នៅចន្លោះ: $[1, 2]$

$$\begin{aligned}
 \text{តាមរូបមន្ត} \quad S &= \int_1^2 (y_C - y_d) dx \\
 &= \int_1^2 \frac{\ln x}{2x} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int_1^2 \ln x d(\ln x) & \left[\because d(\ln x) = \frac{1}{x} dx \right] \\
 &= \frac{1}{2} \left[\frac{\ln^2 x}{2} \right]_1^2 & \left[\because \int u du = \frac{u^2}{2} \right] \\
 &= \frac{1}{4} [\ln^2 x]_1^2 \\
 &= \frac{1}{4} (\ln^2 2 - \ln^2 1) \\
 &= \frac{\ln^2 2}{4}
 \end{aligned}$$

ដូចនេះ: ក្រឡាផ្ទៃដែលខណ្ឌដោយក្រាប (C) និងបន្ទាត់ (d) នៅចន្លោះ: $[1, 2]$ គឺ $S = \frac{\ln^2 2}{4}$ ឯកតាផ្ទៃ

VII គណនាកូអរដោនេផ្ចិត កំពូល កំណុំ សមីការអាស៊ីមតូត រួចសង់អ៊ីពែបូលនេះ

យើងមានសមីការអ៊ីពែបូល $\frac{y^2}{25} - \frac{x^2}{9} = 1 \iff \frac{(y-0)^2}{5^2} - \frac{(x-0)^2}{3^2} = 1$

ជាសមីការស្តង់ដារអ៊ីពែបូលដែលមានរាង $\frac{(y-k)^2}{a^2} - \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1$

យើងទាញបាន $\begin{cases} h = 0 ; k = 0 \\ a = 5 ; b = 3 \end{cases}$

ហើយ $c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow c = \sqrt{25 + 9} = \sqrt{34}$

នាំឱ្យ $\begin{cases} \text{កូអរដោនេផ្ចិត} & I(h, k) = (0, 0) \\ \text{កូអរដោនេកំពូល} & V_{1,2}(h, k \pm a) = (0, \pm 5) \\ \text{កូអរដោនេកំណុំ} & F_{1,2}(h, k \pm c) = (0, \pm \sqrt{34}) \\ \text{បន្ទាត់ប្រាប់ទិស} & y = \pm \frac{b}{a}x = \pm \frac{5}{3}x \end{cases}$

ដូចនេះ: កូអរដោនេផ្ចិត $I(0, 0)$ កំពូល $V_{1,2}(0, \pm 5)$ កំណុំ $F_{1,2}(0, \pm \sqrt{34})$ និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស $y = \pm \frac{5}{3}x$

សំណង់អ៊ីពែបូល

