

រៀបចំប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង៖

វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យា (វិទ្យាសាស្ត្រពិត)

រយៈពេល ១៥០នាទី

ពិន្ទុសរុប ១២៥ពិន្ទុ

មណ្ឌលប្រឡង

លេខបន្ទប់ លេខតុ

ឈ្មោះបេក្ខជន

ហត្ថលេខា

វិញ្ញាសា ០១

I គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z = 1 + i$ និង $w = \sqrt{3} + i$ ។

- ក សរសេរ $\frac{z}{w}$ ជាទម្រង់ពីធាតុគណិត។
- ខ សរសេរ z , w និង $\frac{z}{w}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។
- គ ទាញរកតម្លៃប្រាកដនៃ $\cos \frac{\pi}{12}$ និង $\sin \frac{\pi}{12}$ ។

II គណនាលីមីតខាងក្រោម

- ក $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 1}{x^2 - 1}$
- ខ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \sin^2 x - \cos 2x}{x^2}$
- គ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2021x} - e^{2020x}}{x}$

III ក្នុងស្បែងមួយមានប៊ូលស 2 គ្រាប់ ប៊ូលខ្មៅ 3 គ្រាប់ និងប៊ូលខៀវ 5 គ្រាប់។ គេចាប់យកប៊ូលម្តងបីគ្រាប់ដោយចៃដន្យ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលគេចាប់បាន៖

- ក A: ប៊ូលទាំងបីមានពណ៌ខៀវ។
- ខ B: ប៊ូលទាំងបីមានពណ៌ខុសៗគ្នា។
- គ C: យ៉ាងតិចមានប៊ូលពណ៌ខៀវមួយ។

IV ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $y'' - 4y' + 4y = 0$ ដោយដឹងថា $y'(0) = 7$ និង $y(0) = 2$ ។

V គេឱ្យសមីការអេលីប (E) : $25x^2 + 16y^2 - 50x + 32y - 359 = 0$ ។

- ក កំណត់សមីការស្តង់ដារអេលីប។ ទាញរកកូអរដោនេផ្ចិត កំពូល កំណុំ ប្រវែងអ័ក្សតូច និងអ័ក្សធំ។
- ខ សង់អេលីប (E) ។

VI គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = -x^2 + 1 - \ln x$; $\forall x > 0$ ។

- ក គណនា $f'(x)$ ។ រក $f(1)$ រួចទាញរកសញ្ញានៃ $f(x)$ (មិនបាច់រកលីមីតចុងដែនកំណត់)។
- ខ គេតាង $g(x) = -x + 1 + \frac{\ln x}{x}$; $\forall x > 0$ និងមានក្រាបតំណាង (C) ។ រក $g'(x)$ រួចទាញថា $g'(x)$ មានសញ្ញាដូច $f(x)$ ។
- គ គណនាលីមីតចុងដែនកំណត់នៃ $g(x)$ ។ សង់តារាងអថេរភាពនៃ $g(x)$ ។
- ឃ បង្ហាញថាបន្ទាត់ (d) : $y = -x + 1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C) ។
- ង សង់ក្រាប (C) និងអាស៊ីមតូតទាំងអស់របស់វា។

VII ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេឱ្យចំណុច $A(-1, 2, 3)$; $B(0, -1, 1)$ និង $C(2, 3, 5)$ ។

- ក រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (L) ដែលកាត់តាមចំណុច B និង C ។
- ខ សរសេរសមីការប្លង់ (P) ដែលកាត់តាម A ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ (L) ។
- គ រកកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ H រវាង (L) និង (P) ។
- ឃ រកប្រភេទត្រីកោណ ABC ។ គណនា S_{ABC} ។

ដំណោះស្រាយ

- I ក សរសេរ $\frac{z}{w}$ ជាទម្រង់ពីជគណិត
យើងមាន $z = 1 + i$ និង $w = \sqrt{3} + i$

$$\begin{aligned}\text{យើងបាន } \frac{z}{w} &= \frac{1+i}{\sqrt{3}+i} \\ &= \frac{(1+i)(\sqrt{3}-i)}{(\sqrt{3}+i)(\sqrt{3}-i)} \\ &= \frac{\sqrt{3}-i+i\sqrt{3}-i^2}{(\sqrt{3})^2-i^2} \\ &= \frac{\sqrt{3}-i+i\sqrt{3}+1}{3+1} \\ &= \frac{(\sqrt{3}+1)+(\sqrt{3}-1)i}{4} \\ &= \frac{\sqrt{3}+1}{4} + \frac{\sqrt{3}-1}{4}i\end{aligned}$$

និមិត្តសញ្ញា $\therefore$ មានន័យថា ព្រោះ

$[\because \text{គុណភាគបែងនឹង } \sqrt{3}-i \text{ ដែលជាកន្សោមឆ្លាស់នៃ } \sqrt{3}+i]$

$[\because \text{គុណពន្លាតភាគយក រួចប្រើ } (a+b)(a-b) = a^2 - b^2 \text{ នៅភាគបែង}]$

$[\because i^2 = -1]$

$[\because \text{ផ្គុំផ្នែកពិតនិងផ្នែកពិត ផ្នែកនិមិត្តនិងផ្នែកនិមិត្តនៅភាគយក}]$

$[\because \text{ផ្តាច់ប្រភាគឱ្យចេញជាទម្រង់ពីជគណិត } a + bi]$

ដូចនេះ $\boxed{\frac{z}{w} = \frac{\sqrt{3}+1}{4} + \frac{\sqrt{3}-1}{4}i}$

- ខ សរសេរ z , w និង $\frac{z}{w}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

យើងបាន $z = 1 + i$

$$\begin{aligned}&= \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \\ &= \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)\end{aligned}$$

$$[\because |z| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}]$$

$w = \sqrt{3} + i$

$$\begin{aligned}&= 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{1}{2} \right) \\ &= 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)\end{aligned}$$

$$[\because |w| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = 2]$$

និង $\frac{z}{w} = \frac{\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)}{2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)}$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \left[\cos \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} \right) \right]$$

$$[\because \frac{r_1(\cos \alpha_1 + i \sin \alpha_1)}{r_2(\cos \alpha_2 + i \sin \alpha_2)} = \frac{r_1}{r_2} [\cos(\alpha_1 - \alpha_2) + i \sin(\alpha_1 - \alpha_2)]]$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12} \right)$$

ដូចនេះ $\boxed{z = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) ; w = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) \text{ និង } \frac{z}{w} = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12} \right)}$

- គ ទាញរកតម្លៃប្រាកដនៃ $\cos \frac{\pi}{12}$ និង $\sin \frac{\pi}{12}$

យើងមាន $\frac{z}{w} = \frac{\sqrt{3}+1}{4} + \frac{\sqrt{3}-1}{4}i$ និង $\frac{z}{w} = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12} \right)$

យើងបាន $\frac{\sqrt{2}}{2} \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12} \right) = \frac{\sqrt{3}+1}{4} + \frac{\sqrt{3}-1}{4}i$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \cos \frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{2}}{2} i \sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{3}+1}{4} + \frac{\sqrt{3}-1}{4}i$$

នាំឱ្យ $\begin{cases} \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{3}+1}{4} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{3}-1}{4} \end{cases}$ $[\because \text{ផ្ទឹមផ្នែកពិតជាមួយផ្នែកពិត ផ្នែកនិមិត្តជាមួយផ្នែកនិមិត្ត}]$

$$\text{នាំឱ្យ} \quad \begin{cases} \cos \frac{\pi}{12} = \frac{2(\sqrt{3}+1)}{4\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{3}+1)}{4} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} \\ \sin \frac{\pi}{12} = \frac{2(\sqrt{3}-1)}{4\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{3}-1)}{4} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4} \end{cases}$$

$$\text{ដូចនេះ:} \quad \boxed{\cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} \text{ និង } \sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}}$$

II គណនាលីមីតខាងក្រោម

$$\textcircled{ក} \quad \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 1}{x^2 - 1} \quad \left(\text{រាងមិនកំណត់ } \frac{0}{0} \right)$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 1}{x^2 - 1} &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(x^2 - x + 1)}{(x-1)(x+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - x + 1}{x - 1} \\ &= \frac{(-1)^2 - (-1) + 1}{-1 - 1} \\ &= -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$[\because a^2 - b^2 = (a-b)(a+b) ; a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)]$$

$$\text{ដូចនេះ:} \quad \boxed{\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 1}{x^2 - 1} = -\frac{3}{2}}$$

$$\textcircled{ខ} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \sin^2 x - \cos 2x}{x^2} \quad \left(\text{រាងមិនកំណត់ } \frac{0}{0} \right)$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \sin^2 x - \cos 2x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x + (1 - \cos 2x)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x + 2\sin^2 x}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\sin^2 x}{x^2} \\ &= 3 \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 \\ &= 3 \times (1)^2 \\ &= 3 \end{aligned}$$

$$[\because \cos 2x = 1 - 2\sin^2 x \implies 1 - \cos 2x = 2\sin^2 x]$$

$$\left[\because \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \right]$$

$$\text{ដូចនេះ:} \quad \boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \sin^2 x - \cos 2x}{x^2} = 3}$$

$$\textcircled{គ} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2021x} - e^{2020x}}{x} \quad \left(\text{រាងមិនកំណត់ } \frac{0}{0} \right)$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2021x} - e^{2020x}}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2020x}(e^x - 1)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} e^{2020x} \left(\frac{e^x - 1}{x} \right) \\ &= e^0 \times 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\left[\because \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \right]$$

$$\text{ដូចនេះ:} \quad \boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2021x} - e^{2020x}}{x} = 1}$$

III តាង S ជាលំហសំណាកនៃពិសោធន៍ចៃដន្យនេះ

ដោយគេចាប់យកប៊ូល 3 គ្រាប់ចេញពីប៊ូលសរុបចំនួន 10 គ្រាប់ នោះយើងបាន

$$n(S) = C(10, 3) = \frac{10!}{(10-3)! \times 3!} = \frac{10!}{7! \times 3!} = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = 120$$

រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលគេចាប់បាន៖

$$\left[\because C(n, p) = \frac{n!}{(n-p)! \times p!} \right]$$

ក A: ប៊ូលទាំងបីមានពណ៌ខៀវ

ដើម្បីបានប៊ូលទាំងបីមានពណ៌ខៀវ គេត្រូវចាប់ប៊ូលខៀវ 3 គ្រាប់ចេញពីប៊ូលខៀវសរុបទាំង 5 គ្រាប់

$$\text{យើងបាន } n(A) = C(5, 3) = \frac{5!}{(5-3)! \times 3!} = \frac{5!}{2! \times 3!} = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{(2 \times 1)(3 \times 2 \times 1)} = \frac{20}{2} = 10$$

$$\text{នាំឱ្យ } P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{10}{120} = \frac{1}{12}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{P(A) = \frac{1}{12}}$$

ខ B: ប៊ូលទាំងបីមានពណ៌ខុសៗគ្នា

ដើម្បីបានប៊ូលទាំងបីពណ៌ខុសៗគ្នា គេត្រូវចាប់យក

ប៊ូលពណ៌ស 1 ចេញពីប៊ូលសសរុបទាំង 2 គ្រាប់

ប៊ូលពណ៌ខៀវ 1 ចេញពីប៊ូលខៀវសរុបទាំង 3 គ្រាប់

ប៊ូលពណ៌ខៀវ 1 ចេញពីប៊ូលខៀវសរុបទាំង 5 គ្រាប់

$$\text{យើងបាន } n(B) = C(2, 1) \times C(3, 1) \times C(5, 1) = 2 \times 3 \times 5 = 30$$

$$[\because C(n, 1) = n]$$

$$\text{នាំឱ្យ } P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{30}{120} = \frac{1}{4}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{P(B) = \frac{1}{4}}$$

គ C: យ៉ាងតិចមានប៊ូលពណ៌ខៀវមួយ

តាង C' ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលចាប់មិនបានប៊ូលពណ៌ខៀវសោះ នោះ C និង C' ជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុយគ្នា

ដើម្បីឱ្យការចាប់នេះមិនទទួលបានប៊ូលពណ៌ខៀវ គេត្រូវចាប់យកប៊ូលទាំង 3 ចេញពីប៊ូល 5 នៃប៊ូលពណ៌ស និងពណ៌ខៀវ

$$\text{យើងបាន } n(C') = C(5, 3) = 10 \text{ នាំឱ្យ } P(C') = \frac{n(C')}{n(S)} = \frac{10}{120} = \frac{1}{12}$$

$$\text{តាមរូបមន្ត } P(C) + P(C') = 1 \implies P(C) = 1 - P(C') = 1 - \frac{1}{12} = \frac{11}{12}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{P(C) = \frac{11}{12}}$$

IV ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $y'' - 4y' + 4y = 0$

$$\text{សមីការសម្គាល់ } \lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0$$

$$\text{សមមូល } \lambda^2 - 2(\lambda)(2) + 2^2 = 0$$

$$(\lambda - 2)^2 = 0$$

$$\lambda - 2 = 0$$

$$\lambda = 2 \quad (\text{សមីការមានឫសឌុប})$$

$$[\because a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2]$$

យើងបានចម្លើយនៃសមីការគឺ $y = (Ax + B)e^{\lambda x} = (Ax + B)e^{2x}$ ដែល $A, B \in \mathbb{R}$

មួយវិញទៀត $y'(0) = 7$ និង $y(0) = 2$

$$\text{ដោយ } y = (Ax + B)e^{2x} \text{ នាំឱ្យ } y(0) = (A \times 0 + B)e^{2 \times 0} \implies B = 2$$

$$\text{ហើយ } y' = (Ax + B)'e^{2x} + (Ax + B)(e^{2x})' = Ae^{2x} + 2(Ax + B)e^{2x}$$

$$[\because (uv)' = u'v + v'u]$$

$$\text{នាំឱ្យ } y'(0) = Ae^0 + 2[A \cdot (0) + B]e^0 \text{ នាំឱ្យ } A + 2B = 7 \implies A + 2B = 7 \implies A = 7 - 2B = 7 - (2 \times 2) = 3$$

$$\text{យើងបាន } y = (3x + 2)e^{2x}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{\text{ចម្លើយនៃសមីការគឺ } y = (3x + 2)e^{2x}}$$

យើងមានសមីការអេលីប (E) : $25x^2 + 16y^2 - 50x + 32y - 359 = 0$

យើងបាន $(25x^2 - 50x) + (16y^2 + 32y) = 359$

$$25(x^2 - 2x) + 16(y^2 + 2y) = 359$$

$$25(x^2 - 2x + 1 - 1) + 16(y^2 + 2y + 1 - 1) = 359$$

$$25[(x-1)^2 - 1] + 16[(y+1)^2 - 1] = 359$$

$$[\because a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2]$$

$$25(x-1)^2 - 25 + 16(y+1)^2 - 16 = 359$$

$$25(x-1)^2 + 16(y+1)^2 = 359 + 25 + 16$$

$$25(x-1)^2 + 16(y+1)^2 = 400$$

$$\frac{25(x-1)^2}{400} + \frac{16(y+1)^2}{400} = 1$$

$$[\because \text{ចែកអង្គទាំងពីរនឹង 400}]$$

$$\frac{(x-1)^2}{16} + \frac{(y+1)^2}{25} = 1$$

$$\frac{(x-1)^2}{4^2} + \frac{(y+1)^2}{5^2} = 1$$

ដូចនេះ: សមីការស្តង់ដារអេលីបគឺ $\frac{(x-1)^2}{4^2} + \frac{(y+1)^2}{5^2} = 1$

តាមរយៈការដោះស្រាយខាងលើ អេលីបនេះមានសមីការស្តង់ដារ $\frac{(x-h)^2}{b^2} + \frac{(y-k)^2}{a^2} = 1$ ដែល $a > b > 0$

យើងទាញបាន $h = 1$, $k = -1$, $a = 5$ និង $b = 4$

ដោយ $a^2 = b^2 + c^2$ នាំឱ្យ $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{25 - 16} = \sqrt{9} = 3$

យើងទាញបាន

ផ្ចិត $I(h, k) = (1, -1)$

កំពូល $V_{1,2}(h, k \pm a) = (1, -1 \pm 5) = (1, -6); (1, 4)$


កំណុំ $F_{1,2} = (h, k \pm c) = (1, -1 \pm 3) = (1, -4); (1, 2)$

ប្រវែងអ័ក្សតូច $2b = 2 \times 4 = 8$

ប្រវែងអ័ក្សធំ $2a = 2 \times 5 = 10$

ដូចនេះ: ផ្ចិត $I(1, -1)$ កំពូល $V_1(1, -6); V_2(1, 4)$ កំណុំ $F_1(1, -4); F_2(1, 2)$ អ័ក្សតូច $2b = 8$ និងអ័ក្សធំ $2a = 10$

យើងបានសំណង់អេលីបដូចខាងក្រោម



VI

ក គណនា $f'(x)$ រក $f(1)$ រួចរកសញ្ញានៃ $f(x)$

យើងមានអនុគមន៍ $f(x) = -x^2 + 1 - \ln x$ កំណត់ចំពោះគ្រប់ $x > 0$

យើងបាន $f'(x) = (-x^2 + 1 - \ln x)' = -2x - \frac{1}{x} = \frac{-2x^2 - 1}{x}$

$$\left[\because (x^n)' = nx^{n-1}, (c)' = 0, (\ln x)' = \frac{1}{x} \right]$$

ដូចនេះ: $f'(x) = \frac{-2x^2 - 1}{x}; \forall x > 0$

ហើយ $f(1) = -(1)^2 + 1 - \ln 1 = -1 + 1 - 0 = 0$

ដូចនេះ: $f(1) = 0$

ដោយ $f'(x) = \frac{-2x^2 - 1}{x}; \forall x > 0$ នោះ $f'(x) < 0$

យើងបានតារាងអថេរភាព f ដូចខាងក្រោម

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		—	—
$f(x)$		0	

តាមតារាងអថេរភាព f ខាងលើ យើងទាញបាន $f(x) > 0; \forall x \in (0, 1)$ និង $f(x) < 0; \forall x \in (1, +\infty)$

ដូចនេះ: $f(x) > 0; \forall x \in (0, 1)$ និង $f(x) < 0; \forall x \in (1, +\infty)$

ខ គណនា $g'(x)$ រួចបង្ហាញថា $g'(x)$ មានសញ្ញាដូច $f(x)$

យើងមាន $g(x) = -x + 1 + \frac{\ln x}{x}$ កំណត់ចំពោះគ្រប់ $x > 0$

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } g'(x) &= \left(-x + 1 + \frac{\ln x}{x} \right)' \\ &= -1 + \frac{(\ln x)'x - (x)' \ln x}{x^2} \\ &= -1 + \frac{\left(\frac{1}{x} \right)x - \ln x}{x^2} \\ &= -1 + \frac{1 - \ln x}{x^2} \\ &= \frac{-x^2 + 1 - \ln x}{x^2} \end{aligned}$$

$$\left[\because \left(\frac{u}{v} \right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2} \right]$$

ដូចនេះ: $g'(x) = \frac{-x^2 + 1 - \ln x}{x^2}; \forall x > 0$

ចំពោះគ្រប់ $x > 0; x^2 > 0$ នាំឱ្យ $g'(x)$ មានសញ្ញាដូចភាគយក $-x^2 + 1 - \ln x = f(x)$

ដូចនេះ: $g'(x)$ មានសញ្ញាដូច $f(x)$

គ គណនាលីមីតនៃ $g(x)$ គ្រប់ 0 និង $+\infty$ រួចសង្កេតតារាងអថេរភាព g

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-x + 1 + \frac{\ln x}{x} \right) \\ &= -0 + 1 + (-\infty) \\ &= -\infty \end{aligned}$$

$$\left[\because \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty \right]$$

និង $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-x + 1 + \frac{\ln x}{x} \right)$

$$= -(+\infty) + 1 + 0$$

$$= -\infty$$

$$\left[\because \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \right]$$

ដូចនេះ: $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty$ និង $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$

ដោយដឹងថា $g'(x)$ មានសញ្ញាដូច $f(x)$ នាំឱ្យ $g'(x) > 0$; $\forall x \in (0, 1)$ និង $g'(x) < 0$; $\forall x \in (1, +\infty)$

$$\text{ហើយ } g(1) = -1 + 1 + \frac{\ln 1}{1} = 0$$

យើងបានតារាងអថេរភាព g ដូចខាងក្រោម

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$		0	
$g(x)$	$-\infty$	0	$-\infty$


ឃ) បង្ហាញថាបន្ទាត់ (d) : $y = -x + 1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C)

$$\text{យើងមាន } \lim_{x \rightarrow +\infty} [g(x) - y_d] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(-x + 1 + \frac{\ln x}{x} \right) - (-x + 1) \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

ដូចនេះ: បន្ទាត់ (d) : $y = -x + 1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C)

ង) សង់ក្រាប (C) និងអាស៊ីមតូតទាំងអស់របស់វា

$$\text{បន្ទាត់ (d) : } y = -x + 1 \quad \begin{array}{c|cc} x & 0 & 1 \\ \hline y & 1 & 0 \end{array}$$



VII ក) រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (L) ដែលកាត់តាម B និង C

យើងមាន $B(0, -1, 1)$ និង $C(2, 3, 5)$

យើងបាន $\overrightarrow{BC} = (x_C - x_B, y_C - y_B, z_C - z_B) = (2, 4, 4)$

បន្ទាត់ (L) កាត់តាមចំណុច $B(0, -1, 1)$ និងមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\overrightarrow{BC} = (2, 4, 4)$ មានសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រ

$$(L) : \begin{cases} x = 2t \\ y = 4t - 1 \\ z = 4t + 1 \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$$

ដូចនេះ: $\text{សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់ (L) : } \begin{cases} x = 2t \\ y = 4t - 1 \\ z = 4t + 1 \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$

ខ) សរសេរសមីការប្លង់ (P) កាត់តាម A ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ (L)

ដោយ $(P) \perp (L)$ នោះ $(P) \perp \overrightarrow{BC}$ នាំឱ្យ (P) មានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\overrightarrow{BC} = (2, 4, 4)$ ហើយ (P) កាត់តាម $A(-1, 2, 3)$

នោះសមីការប្លង់ (P) កំណត់ដោយ $2[x - (-1)] + 4(y - 2) + 4(z - 3) = 0$

$$2x + 2 + 4y - 8 + 4z - 12 = 0$$

$$2x + 4y + 4z - 18 = 0$$

$$x + 2y + 2z - 9 = 0 \quad [\because \text{ចែកអង្គទាំងពីរនឹង 2}]$$

ដូចនេះ: $\text{សមីការប្លង់ (P) : } x + 2y + 2z - 9 = 0$

គ) រកកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វ H រវាង (P) និង (L)

តាង $H(x_H, y_H, z_H)$ ដោយ H ជាចំណុចប្រសព្វរវាង (P) និង (L) យើងបាន

$$H \in (P) \text{ នោះ } x_H + 2y_H + 2z_H - 9 = 0 \quad (1) \text{ និង } H \in (L) \text{ នោះ } \begin{cases} x_H = 2t \\ y_H = 4t - 1 \\ z_H = 4t + 1 \end{cases} \quad (2)$$

យក (2) ជំនួសចូល (1) នាំឱ្យ $2t + 2(4t - 1) + 2(4t + 1) - 9 = 0$

$$2t + 8t - 2 + 8t + 2 - 9 = 0$$

$$18t - 9 = 0$$

$$18t = 9$$

$$t = \frac{1}{2} \quad \text{ជំនួសចូល (2)}$$

$$\text{យើងបាន } \begin{cases} x_H = 2\left(\frac{1}{2}\right) = 1 \\ y_H = 4\left(\frac{1}{2}\right) - 1 = 1 \\ z_H = 4\left(\frac{1}{2}\right) + 1 = 3 \end{cases} \quad \text{នាំឱ្យ } H(1, 1, 3)$$

ដូចនេះ: $\text{កូអរដោនេចំណុច } H(1, 1, 3)$

ឃ) រកប្រភេទត្រីកោណ ABC រួចគណនា S_{ABC}

យើងមាន $\overrightarrow{BC} = (2, 4, 4)$

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A) = (1, -3, -2)$$

$$\text{និង } \overrightarrow{AC} = (x_C - x_A, y_C - y_A, z_C - z_A) = (3, 1, 2)$$

$$\text{យើងបាន } \begin{cases} BC = \sqrt{2^2 + 4^2 + 4^2} = \sqrt{36} = 6 \\ AB = \sqrt{1^2 + (-3)^2 + (-2)^2} = \sqrt{14} \\ AC = \sqrt{3^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{14} \end{cases} \implies AB = AC \neq BC \text{ នោះ } \triangle ABC \text{ ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A}$$

ដូចនេះ: $\triangle ABC \text{ ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A}$

តាមរូបមន្ត $S_{ABC} = \frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{AC}|$

ដោយ $\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -3 & -2 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & -2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \vec{k} = -4\vec{i} - 8\vec{j} + 10\vec{k}$

យើងបាន $|\vec{AB} \times \vec{AC}| = \sqrt{(-4)^2 + (-8)^2 + 10^2} = \sqrt{16 + 64 + 100} = \sqrt{180} = 6\sqrt{5}$

នាំឱ្យ $S_{ABC} = \frac{1}{2} (6\sqrt{5}) = 3\sqrt{5}$

ដូចនេះ $S_{ABC} = 3\sqrt{5}$ ឯកតាផ្ទៃ

