

គ្រឿងប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង៖

វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យា (វិទ្យាសាស្ត្រពិត)

រយៈពេល ១៥០នាទី

ពិន្ទុសរុប ១២៥ពិន្ទុ

មណ្ឌលប្រឡង

លេខបន្ទប់ លេខតុ

ឈ្មោះបេក្ខជន

ហត្ថលេខា

វិញ្ញាសា ០៣

- I** ១ កំណត់ចំនួនពិត a, b ដើម្បីឱ្យ $2 - 3i$ ជាចម្លើយនៃសមីការ $x^2 + ax + b = 0$ ។
- ២ កំណត់ម៉ូឌុល និងអាកុយម៉ង់នៃ $\left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{1 + i}\right)^{10}$ ។
- II** ១ គណនាលីមីតខាងក្រោម
- ក $\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{1}{x-3} - \frac{6}{x^2-9} \right)$ ខ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$ គ $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{x^2 - x + 1} - \sqrt{x^2 + x + 1} \right)$
- ២ កំណត់ចំនួនពិត a, b និង c ដើម្បីឱ្យ $\frac{2x+1}{x^2(x+1)} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x^2} + \frac{c}{x+1}$ ដែល $x \notin \{-1, 0\}$ ។ គណនា $I = \int_1^2 \frac{2x+1}{x^2(x+1)} dx$ ។
- III** ក្នុងចំណោមលេខ ១ ដល់ ៩ ។ គេចាប់យកលេខបីខ្ទង់មួយៗដោយមិនដាក់ចូលវិញ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖
- ក A: លេខទាំងបីខ្ទង់ជាពហុគុណនៃ ៥ ។
- ខ B: លេខទាំងបីខ្ទង់បង្កើតបានពីតួនៃស្វ៊ីតនព្វន្ឋមួយមានផលសងរួមស្មើ ៣ ។
- គ C: លេខទាំងបីខ្ទង់បង្កើតបានពីតួនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រមួយមានផលសងស្មើ ២ ។
- IV** ក ដោះស្រាយសមីការ (E) : $2y'' - 3y' + y = 0$ ។
- ខ រកចម្លើយមួយនៃ (E) ដោយដឹងថាបន្ទាត់ (D) : $y = 2x + 1$ ប៉ះក្រាបនៃចម្លើយត្រង់ចំណុច $A(0, 1)$ ។
- V** គេឱ្យសមីការអេលីប (E) : $16x^2 + 25y^2 - 32x - 100y - 284 = 0$ ។
- ក រកសមីការស្តង់ដារនៃ (E) ។
- ខ រកកូអរដោនេផ្ចិត កំពូល កំណុំ ប្រវែងអ័ក្សតូច ប្រវែងអ័ក្សធំ និងសង់អេលីប (E) ។
- VI** គេឱ្យអនុគមន៍ f កំណត់ចំពោះ $x > 0$ ដោយ $f(x) = 2x - 5 + \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x}$ ។
- ក គណនា $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ និង $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ។ ទាញរកសមីការអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C) តំណាងអនុគមន៍ f ។
- ខ ស្រាយថាបន្ទាត់ (d) : $y = 2x - 5$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C) ផ្នែក $+\infty$ ។ សិក្សាទីតាំងរវាង (C) និង (d) ។
- គ គណនា $f'(x)$ រួចបញ្ជាក់ថា $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $u(x) = 2x^2 - 2 + \ln x$ ។
- ឃ បង្ហាញថា $u'(x) > 0$ រួចទាញរកសញ្ញានៃ $u(x)$ ។ គូសតារាងអថេរភាពនៃ f ។
- ង បង្ហាញថាក្រាប (C) កាត់អ័ក្ស (ox) ត្រង់ពីរចំណុច α, β ដែល $\frac{1}{e} < \alpha < 1$ និង $2 < \beta < e$ ។
- ច សង់ (C) និង (d) ។ គេឱ្យ $e = 2.7$, $\frac{1}{e} = 0.4$ និង $\ln 2 = 0.7$ ។
- VII** គេឱ្យបន្ទាត់ (d) : $\frac{x-3}{2} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-2}{-1}$ និងស្វ៊ែរ (S) : $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 2z - 3 = 0$ ។
- ក កំណត់កូអរដោនេផ្ចិត I និងកាំ R នៃស្វ៊ែរ (S) ។
- ខ រកកូអរដោនេនៃចំណុច A ដែលជាចំណោលកែងនៃ I លើបន្ទាត់ (d) ។
- គ គណនា AI រួចទាញថាបន្ទាត់ (d) ប៉ះស្វ៊ែរ (S) ។

ដំណោះស្រាយ

I ១ កំណត់ចំនួនពិត a, b

ដើម្បីឱ្យ $2 - 3i$ ជាចម្លើយនៃសមីការ $x^2 + ax + b = 0$ កាលណា

$$(2 - 3i)^2 + a(2 - 3i) + b = 0$$

$$4 - 12i + (3i)^2 + 2a - 3ia + b = 0$$

$$4 - 12i - 9 + 2a - 3ia + b = 0$$

$$(2a + b - 5) + (-3a - 12)i = 0$$

$$\text{នាំឱ្យ } \begin{cases} 2a + b - 5 = 0 \\ -3a - 12 = 0 \end{cases} \quad \text{នាំឱ្យ } \begin{cases} a = -4 \\ b = 13 \end{cases}$$

$$\left[\because a + bi = 0 \implies \begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \end{cases} \right]$$

ដូចនេះ: $a = -4$ និង $b = 13$

II ២ កំណត់ម៉ូឌុល និងអាកុយម៉ង់នៃ $\left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{1 + i}\right)^{10}$

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } \left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{1 + i}\right)^{10} &= \left[\frac{2 \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}{\sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)} \right]^{10} \\ &= \left(\sqrt{2} \cdot \frac{\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}}{\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}} \right)^{10} \quad \left[\because \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \right] \\ &= \left\{ \sqrt{2} \left[\cos \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right) \right] \right\}^{10} \\ &= (\sqrt{2})^{10} \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12} \right)^{10} \\ &= 2^5 \left(\cos \frac{10\pi}{12} + i \sin \frac{10\pi}{12} \right) \quad \left[\because (\sqrt{2})^{10} = (2^{\frac{1}{2}})^{10} = 2^5 \right] \\ &= 32 \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right) \end{aligned}$$

យើងទាញបាន ម៉ូឌុល $= 32$ និង អាកុយម៉ង់ $= \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$ ដែល $k \in \mathbb{Z}$

ដូចនេះ: ចំនួនកុំផ្លិច $\left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{1 + i}\right)^{10}$ មាន ម៉ូឌុល $= 32$ និង អាកុយម៉ង់ $= \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$ ដែល $k \in \mathbb{Z}$

II ១ គណនាលីមីតខាងក្រោម

ក) $\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{1}{x-3} - \frac{6}{x^2-9} \right)$ (រាងមិនកំណត់ $\infty - \infty$)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{1}{x-3} - \frac{6}{x^2-9} \right) &= \lim_{x \rightarrow 3} \left[\frac{1}{x-3} - \frac{6}{(x-3)(x+3)} \right] \quad \left[\because x^2 - 9 = x^2 - 3^2 = (x-3)(x+3) \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x+3-6}{(x-3)(x+3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{(x-3)(x+3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x+3} \\ &= \frac{1}{6} \end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{1}{x-3} - \frac{6}{x^2-9} \right) = \frac{1}{6}$

ខ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} \quad \left(\text{រាងមិនកំណត់} \frac{0}{0} \right)$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{\cos x} - \sin x}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \cos x \sin x}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x(1 - \cos x)}{x^3 \cos x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \left(2 \sin^2 \frac{x}{2} \right)}{x^3 \cos x} \quad \left[\because \cos x = 1 - 2 \sin^2 \frac{x}{2} \implies 1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{\cos x} \cdot \frac{\sin x \cdot \sin^2 \frac{x}{2}}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{\cos x} \cdot \left(\frac{\sin x}{x} \right) \cdot \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 \cdot \frac{1}{4} \\ &= \frac{2}{1} \cdot (1) \cdot (1)^2 \cdot \frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{2}$

គុណកន្សោមផ្លាស់

គី $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{x^2 - x + 1} - \sqrt{x^2 + x + 1} \right) \quad \left(\text{រាងមិនកំណត់} \infty - \infty \right)$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{x^2 - x + 1} - \sqrt{x^2 + x + 1} \right) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(\sqrt{x^2 - x + 1} - \sqrt{x^2 + x + 1})(\sqrt{x^2 - x + 1} + \sqrt{x^2 + x + 1})}{\sqrt{x^2 - x + 1} + \sqrt{x^2 + x + 1}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x^2 - x + 1) - (x^2 + x + 1)}{\sqrt{x^2 - x + 1} + \sqrt{x^2 + x + 1}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x}{\left[\sqrt{x^2 \left(1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right)} + \sqrt{x^2 \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right)} \right]} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x}{|x| \sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} + |x| \sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}} \quad \left[\because \sqrt{x^2} = |x| \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x}{-x \sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} - x \sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}} \quad \left[\because |x| = -x \text{ បើ } x < 0 \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x}{-x \left(\sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} + \sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} \right)} \\ &= \frac{2}{\sqrt{1-0+0} + \sqrt{1+0+0}} \\ &= \frac{2}{2} \\ &= 1 \end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{x^2 - x + 1} - \sqrt{x^2 + x + 1} \right) = 1$

២) កំណត់ចំនួនពិត a, b និង c ដើម្បីឱ្យ $\frac{2x+1}{x^2(x+1)} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x^2} + \frac{c}{x+1}$ ដែល $x \notin \{-1, 0\}$

$$\text{យើងបាន } \frac{2x+1}{x^2(x+1)} = \frac{ax(x+1) + b(x+1) + cx^2}{x^2(x+1)} \quad [\because \text{ភាគបែងរួម } x^2(x+1)]$$

$$\frac{2x+1}{x^2(x+1)} = \frac{ax^2 + ax + bx + b + cx^2}{x^2(x+1)}$$

$$\frac{2x+1}{x^2(x+1)} = \frac{(a+c)x^2 + (a+b)x + b}{x^2(x+1)} \quad [\because \text{ផ្គុំតួដែលមានដឺក្រេដូចគ្នា}]$$

$$2x+1 = (a+c)x^2 + (a+b)x + b \quad [\because \text{លុបភាគបែងចោល}]$$

$$\text{នាំឱ្យ } \begin{cases} a+c=0 \\ a+b=2 \\ b=1 \end{cases} \quad [\because \text{ផ្ទឹមមេគុណនៃតួដែលមានដឺក្រេដូចគ្នា}]$$

$$\text{នាំឱ្យ } \begin{cases} b=1 \\ a=1 \\ c=-1 \end{cases}$$

ដូចនេះ: $a=1 ; b=1$ និង $c=-1$

$$\begin{aligned} \text{មួយវិញទៀត } I &= \int_1^2 \frac{2x+1}{x^2(x+1)} dx \\ &= \int_1^2 \left(\frac{a}{x} + \frac{b}{x^2} + \frac{c}{x+1} \right) \\ &= \int_1^2 \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{-1}{x+1} \right) dx \\ &= \left[\ln|x| - \frac{1}{x} - \ln|x+1| \right]_1^2 \\ &= \left(\ln 2 - \frac{1}{2} - \ln 3 \right) - (\ln 1 - 1 - \ln 2) \\ &= -\frac{1}{2} + 1 + \ln 2 - \ln 3 + \ln 2 \\ &= \frac{1}{2} + \ln \frac{4}{3} \end{aligned}$$

$$\left[\because \int \frac{dx}{x+a} = \ln|x+a| ; \int \frac{dx}{x^n} = -\frac{1}{(n-1)x^{n-1}} \right]$$

$$\text{ដូចនេះ: } I = \frac{1}{2} + \ln \frac{4}{3}$$

III) តាង S ជាលំហសំណាកនៃពិសោធន៍ចៃដន្យនេះ

ដោយគេចាប់យកលេខបីខ្ទង់មួយៗចេញពីថង់មួយដែលមានលេខ 1 ដល់ 9 ដោយមិនដាក់ចូលវិញ យើងបាន៖

ការចាប់លើកទីមួយមាន 9 របៀប

ការចាប់លើកទីពីរមាន 8 របៀប

ការចាប់លើកទីបីមាន 7 របៀប

$$\text{នាំឱ្យ } n(S) = 9 \times 8 \times 7$$

រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

ក) A: លេខទាំងបីខ្ទង់ជាពហុគុណនៃ 5

យើងដឹងហើយថាចំនួនដែលជាពហុគុណនៃ 5 ជាចំនួនទាំងឡាយណាដែលមានលេខខាងចុងជាលេខ 0 ឬ 5

នោះយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឱ្យខ្ទង់ទីបីនៃចំនួននោះជាលេខ 5

ខ្ទង់ទីមួយ

ខ្ទង់ទីពីរ

ខ្ទង់ទីបីជាលេខ 5

8 របៀប

7 របៀប

1 របៀប

យើងបាន $n(A) = 8 \times 7 \times 1$
 នាំឱ្យ $P(A) = \frac{8 \times 7 \times 1}{9 \times 8 \times 7} = \frac{1}{9}$

ដូចនេះ $P(A) = \frac{1}{9}$

- ខ B: លេខទាំងបីខ្ទង់បង្កើតបានពីតួនៃស្វ៊ីតនព្វន្ឋមួយមានផលសងរួមស្មើ 3

យើងបាន $B = \{(1, 4, 7); (2, 5, 8); (3, 6, 9)\} \implies n(B) = 3$

នាំឱ្យ $P(B) = \frac{3}{9 \times 8 \times 7} = \frac{1}{168}$

ដូចនេះ $P(B) = \frac{1}{168}$

- គ C: លេខទាំងបីខ្ទង់បង្កើតបានពីតួនៃស្វ៊ីតធរណីមាត្រមួយមានអសុងស្មើ 2

យើងបាន $C = \{(1, 2, 4); (2, 4, 8)\} \implies n(C) = 2$

នាំឱ្យ $P(C) = \frac{2}{9 \times 8 \times 7} = \frac{1}{252}$

ដូចនេះ $P(C) = \frac{1}{252}$

- IV ក ដោះស្រាយសមីការ (E) : $2y'' - 3y' + y = 0$

សមីការសម្គាល់ $2\lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0 \implies \lambda_1 = 1; \lambda_2 = \frac{1}{2}$

[$\because$ មេគុណ $a + b + c = 0$]

យើងបាន $y = Ae^{\lambda_1 x} + Be^{\lambda_2 x} = Ae^x + Be^{\frac{1}{2}x}$ ដែល $A, B \in \mathbb{R}$

ដូចនេះ ចម្លើយនៃសមីការ (E) គឺ $y = Ae^x + Be^{\frac{1}{2}x}$ ដែល $A, B \in \mathbb{R}$

- ខ រកចម្លើយមួយនៃ (E)

ដោយដឹងថាបន្ទាត់ (D) : $y = 2x + 1$ ប៉ះក្រាបនៃចម្លើយត្រង់ចំណុច $A(0, 1)$ យើងបាន $\begin{cases} y(0) = 1 \\ y'(0) = 2 \end{cases}$

ចំពោះ $y(0) = 1 \implies A + B = 1$ (*)

ហើយ $y' = (Ae^x + Be^{\frac{1}{2}x})' = Ae^x + \frac{1}{2}Be^{\frac{1}{2}x}$

ដោយ $y'(0) = 2 \implies A + \frac{1}{2}B = 2 \implies A = 2 - \frac{1}{2}B$ យកជំនួសចូល (*) យើងបាន

$$2 - \frac{1}{2}B + B = 1$$

$$2 + \frac{1}{2}B = 1$$

$$\frac{1}{2}B = -1$$

នាំឱ្យ $B = -2$

នាំឱ្យ $A = 2 - \frac{1}{2}(-2) = 3$

នាំឱ្យ $y = 3e^x - 2e^{\frac{1}{2}x}$

ដូចនេះ ចម្លើយមួយនៃ (E) គឺ $y = 3e^x - 2e^{\frac{1}{2}x}$

- V ក រកសមីការស្តង់ដារអេលីប (E)

យើងមានសមីការទូទៅ (E) : $16x^2 + 25y^2 - 32x - 100y - 284 = 0$

យើងបាន $(16x^2 - 32x) + (25y^2 - 100y) = 284$

$$16(x^2 - 2x) + 25(y^2 - 4y) = 284$$

$$16(x^2 - 2x + 1 - 1) + 25(y^2 - 4y + 4 - 4) = 284$$

$$16[(x - 1)^2 - 1] + 25[(y - 2)^2 - 4] = 284$$

$$16(x-1)^2 - 16 + 25(y-2)^2 - 100 = 284$$

$$16(x-1)^2 + 25(y-2)^2 = 284 + 16 + 100$$

$$16(x-1)^2 + 25(y-2)^2 = 400$$

$$\frac{16(x-1)^2}{400} + \frac{25(y-2)^2}{400} = 1$$

$$\frac{(x-1)^2}{25} + \frac{(y-2)^2}{16} = 1$$

$$\frac{(x-1)^2}{5^2} + \frac{(y-2)^2}{4^2} = 1$$

[$\because$ ចែកអង្គទាំងពីរនឹង 400]

ដូចនេះ: សមីការស្តង់ដារអេលីប (E) : $\frac{(x-1)^2}{5^2} + \frac{(y-2)^2}{4^2} = 1$

ខ) រកកូអរដោនេផ្ចិត កំពូល កំណុំ ប្រវែងអ័ក្សតូចនិងអ័ក្សធំ និងសង់អេលីប (E)


តាមរយៈចម្លើយខាងលើ អេលីប (E) មានសមីការស្តង់ដារ $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$ ដែល $a > b > 0$

យើងទាញបាន $\begin{cases} a = 5; b = 4 \\ h = 1; k = 2 \end{cases}$ ហើយ $a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{25 - 16} = 3$

នាំឱ្យ $\begin{cases} \text{ផ្ចិត} & I(h, k) = (1, 2) \\ \text{កំពូល} & V_{1,2}(h \pm a, k) = (-4, 2); (6, 2) \\ \text{កំណុំ} & F_{1,2}(h \pm c, k) = (-2, 2); (4, 2) \\ \text{អ័ក្សតូច} & 2b = 2 \times 4 = 8 \\ \text{អ័ក្សធំ} & 2a = 2 \times 5 = 10 \end{cases}$

ដូចនេះ: ផ្ចិត $I(1, 2)$ កំពូល $V_{1,2} = (-4, 2); (6, 2)$ កំណុំ $F_{1,2} = (-2, 2); (4, 2)$ អ័ក្សតូច $2b = 8$ និងអ័ក្សធំ $2a = 10$

សំណង់អេលីប (E)



VI ក) គណនា $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ និង $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ រួចទាញរកសមីការអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C) តំណាងអនុគមន៍ f

យើងមាន $f(x) = 2x - 5 + \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x}$ កំណត់ចំពោះគ្រប់ $x > 0$

$$\begin{aligned}\text{យើងបាន } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(2x - 5 + \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x} \right) \\ &= 2(0) - 5 + (+\infty) - (-\infty) = +\infty \quad \left[\because \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty ; \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty \right] \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2x - 5 + \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x} \right) \\ &= 2(+\infty) - 5 + 0 - 0 = +\infty \quad \left[\because \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 ; \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \right]\end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ និង $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

ដោយ $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ នោះបន្ទាត់ $x = 0$ ជាអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C) ផ្នែក $+\infty$

ដូចនេះ: បន្ទាត់ $x = 0$ ជាអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប (C) ផ្នែក $+\infty$

ខ) ស្រាយថាបន្ទាត់ (d) : $y = 2x - 5$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C) ផ្នែក $+\infty$ រួចសិក្សាទីតាំងរវាង (C) និង (d)

$$\begin{aligned}\text{ពិនិត្យមើល } \lim_{x \rightarrow +\infty} (y_C - y_d) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(2x - 5 + \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x} \right) - (2x - 5) \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x} \right) \\ &= 0\end{aligned}$$

នោះបន្ទាត់ (d) : $y = 2x - 5$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ផ្នែក $+\infty$

ដូចនេះ: បន្ទាត់ (d) : $y = 2x - 5$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ផ្នែក $+\infty$

$$\text{យើងមាន } y_C - y_d = \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x} = \frac{1 - \ln x}{x}$$

ចំពោះគ្រប់ $x > 0$ នោះ $y_C - y_d$ មានសញ្ញាដូច $1 - \ln x$

- $y_C - y_d = 0$ នាំឱ្យ $1 - \ln x = 0 \Rightarrow \ln x = 1 \Rightarrow x = e$
- $y_C - y_d = 0$ នាំឱ្យ $1 - \ln x > 0 \Rightarrow \ln x < 1 \Rightarrow x < e$
- $y_C - y_d < 0$ នាំឱ្យ $1 - \ln x < 0 \Rightarrow \ln x > 1 \Rightarrow x > e$

យើងបានតារាងទីតាំងរវាងក្រាប (C) និងបន្ទាត់ (d) ដូចខាងក្រោម

x	0	e	$+\infty$
$y_C - y_d$		+	-

ដូចនេះ: (C) ប្រសព្វ (d) ត្រង់ $x = e$; (C) នៅលើ (d) ពេល $x \in (0, e)$ និង (C) នៅក្រោម (d) ពេល $x \in (e, +\infty)$

គ) គណនា $f'(x)$ រួចបញ្ជាក់ថា $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $u(x) = 2x^2 - 2 + \ln x$

$$\begin{aligned}\text{យើងបាន } f'(x) &= \left(2x - 5 + \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x} \right)' \\ &= 2 - \frac{1}{x^2} - \frac{(\ln x)'x - (x)' \ln x}{x^2} \quad \left[\because \left(\frac{1}{x^n} \right)' = -\frac{n}{x^{n+1}} ; \left(\frac{u}{v} \right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2} \right] \\ &= 2 - \frac{1}{x^2} - \frac{\left(\frac{1}{x} \right)x - \ln x}{x^2} \\ &= 2 - \frac{1}{x^2} - \frac{1 - \ln x}{x^2} \\ &= \frac{2x^2 - 1 - (1 - \ln x)}{x^2} \quad \left[\because \text{តម្រូវភាគបែងរួម } x^2 \right] \\ &= \frac{2x^2 - 2 + \ln x}{x^2}\end{aligned}$$

ដូចនេះ: $f'(x) = \frac{2x^2 - 2 - \ln x}{x^2}; \forall x > 0$

ដោយ $u(x) = 2x^2 - 2 + \ln x$ នាំឱ្យ $f'(x) = \frac{u(x)}{x^2}$

ចំពោះគ្រប់ $x > 0$ នាំឱ្យ $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $u(x)$

ដូចនេះ: $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $u(x) = 2x^2 - 2 + \ln x$

ឃ) បង្ហាញថា $u'(x) > 0$ រួចទាញរកសញ្ញានៃ $u(x)$ ហើយគូសតារាងអថេរភាពនៃ f

យើងបាន $u'(x) = (2x^2 - 2 + \ln x)' = 4x + \frac{1}{x} = \frac{4x^2 + 1}{x}$

ចំពោះ $x > 0$ នោះ: $\frac{4x^2 + 1}{x} > 0 \implies u'(x) > 0$

ដូចនេះ: $u'(x) > 0$ ចំពោះគ្រប់ $x > 0$

ពិនិត្យ $u(1) = 2(1)^2 - 2 + \ln 1 = 2 - 2 + 0 = 0$

យើងបានតារាងអថេរភាពនៃ $u(x)$ ដូចខាងក្រោម

x	0	1	$+\infty$
$u'(x)$		+	+
$u(x)$		0	

តាមតារាងខាងលើ យើងទាញបាន $\begin{cases} u(x) < 0 \text{ ពេល } x \in (0, 1) \\ u(x) > 0 \text{ ពេល } x \in (1, +\infty) \end{cases}$

ដូចនេះ: $u(x) = 0$ ពេល $x = 1$; $u(x) < 0$ ពេល $x \in (0, 1)$ និង $u(x) > 0$ ពេល $x \in (1, +\infty)$

ដោយ $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $u(x)$ នាំឱ្យ $\begin{cases} f'(x) = 0 \text{ ពេល } x = 1 \\ f'(x) < 0 \text{ ពេល } x \in (0, 1) \\ f'(x) > 0 \text{ ពេល } x \in (1, +\infty) \end{cases}$

ហើយ $f(1) = 2(1) - 5 + \frac{1}{1} - \frac{\ln 1}{1} = 2 - 5 + 1 - 0 = -2$


យើងបានតារាងអថេរភាព f ដូចខាងក្រោម

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$	$+\infty$ -2 $+\infty$		

ង) បង្ហាញថាក្រាប (C) កាត់អ័ក្ស (ox) ត្រង់ពីរចំណុច α, β ដែល $\frac{1}{e} < \alpha < 1$ និង $2 < \beta < e$

ព្រះ ត្រីស៊ីបនត្ថែកណ្តាល

បើ f ជាអនុគមន៍ជាប់លើចន្លោះបិទ $[a, b]$ ហើយកើន ឬចុះលើចន្លោះ $[a, b]$ និង $f(a) \cdot f(b) < 0$ នោះគេថាប្រាបនៃ f កាត់អ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រង់ចំណុច c តែមួយគត់ដែល $c \in (a, b)$ ។ (ពិនិត្យក្រាហ្វិចខាងក្រោមដើម្បីយល់ពីអត្ថន័យ)



តាមរយៈក្រាហ្វិចខាងលើនេះឃើញថា៖

- អនុគមន៍ $y = f(x)$ ជាប់លើ $[a, b]$
- ប្រាបនៃ $y = f(x)$ កើនលើ $[a, b]$
- $f(a) < 0$; $f(b) > 0 \implies f(a) \cdot f(b) < 0$
- ប្រាបនៃ $y = f(x)$ កាត់អ័ក្ស (ox) ត្រង់ c ដែល $c \in (a, b)$

- តាមតារាងអថេរភាព f ខាងលើឃើញថា $f(x)$ ចុះលើចន្លោះ $(0, 1]$ នោះ f ក៏ចុះលើចន្លោះ $\left[\frac{1}{e}, 1\right]$ ដែរ

$$\text{ពិនិត្យ } f\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{2}{e} - 5 + \frac{1}{\frac{1}{e}} - \frac{\ln \frac{1}{e}}{\frac{1}{e}}$$

$$= \frac{2}{e} - 5 + e + e$$

$$= \frac{2}{e} - 5 + 2e$$

$$= 2(0.4) - 5 + 2(2.7)$$

$$= 1.4$$

$$\text{និង } f(1) = -2$$

$$\left[\because \ln \frac{1}{e} = -\ln e = -1 ; \frac{1}{\frac{1}{e}} = e \right]$$

$$\left[e = 2.7 ; \frac{1}{e} = 0.4 \right]$$

$$\left[\because \text{ខាងលើ} \right]$$

នាំឱ្យ $f\left(\frac{1}{e}\right) \cdot f(1) < 0$ នោះប្រាប (C) កាត់អ័ក្ស (ox) ត្រង់ចំណុច α ដែល $\frac{1}{e} < \alpha < 1$

- តាមតារាងអថេរភាព f កើនលើចន្លោះ $[1, +\infty)$ នោះ f ក៏កើនលើចន្លោះ $[2, e]$ ដែរ

$$\text{ពិនិត្យ } f(2) = 2(2) - 5 + \frac{1}{2} - \frac{\ln 2}{2}$$

$$= 4 - 5 + 0.5 - \frac{0.7}{2}$$

$$= -0.5 - 0.35$$

$$= -0.85 < 0$$

$$\text{និង } f(e) = 2e - 5 + \frac{1}{e} - \frac{\ln e}{e}$$

$$= 2(2.7) - 5 + \frac{1}{e} - \frac{1}{e}$$

$$= 0.4 > 0$$


$$[\because \ln 2 = 0.7]$$

នាំឱ្យ $f(2) \cdot f(e) < 0$ នោះប្រាប (C) កាត់អ័ក្ស (ox) ត្រង់ចំណុច β ដែល $2 < \beta < e$

ដូចនេះ ប្រាប (C) កាត់អ័ក្ស (ox) ត្រង់ពីរចំណុច α, β ដែល $\frac{1}{e} < \alpha < 1$ និង $2 < \beta < e$

ច) សង់ (C) និង (d)

$$\text{បន្ទាត់ (d) : } y = 2x - 5 \quad \begin{array}{c|cc} x & 2 & 2.5 \\ y & -1 & 0 \end{array}$$



VII

ក) កំណត់កូអរដោនេផ្ចិត I និងកាំ R នៃស្វ៊ែរ (S)

យើងមានសមីការទូទៅ (S) : $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 2z - 3 = 0$ យើងបាន

$$(x^2 - 4x) + (y^2 + 2y) + (z^2 - 2z) = 3$$

$$(x^2 - 4x + 4 - 4) + (y^2 + 2y + 1 - 1) + (z^2 - 2z + 1 - 1) = 3$$

$$(x - 2)^2 - 4 + (y + 1)^2 - 1 + (z - 1)^2 - 1 = 3$$

$$(x - 2)^2 + (y + 1)^2 + (z - 1)^2 = 9$$

ជាសមីការស្តង់ដាររាង $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$

យើងទាញបាន ផ្ចិត I(2, -1, 1) និងកាំ $R^2 = 9 \implies R = 3$

ដូចនេះ: ស្វ៊ែរ (S) មានផ្ចិត I(2, -1, 1) និងកាំ R = 3

ខ) រកកូអរដោនេចំណុច A ដែលជាចំណោលកែងនៃ I លើ (d)

តាង $A(a, b, c) \implies \vec{AI} = (2 - a, -1 - b, 1 - c)$

ដោយ (d) : $\frac{x-3}{2} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-2}{-1} \iff \begin{cases} x = 2t + 3 \\ y = 2t + 3 \\ z = -t + 2 \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$ នោះ (d) មានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{n} = (2, 2, -1)$

ដោយ A ជាចំណោលកែងនៃ I លើ (d) នោះ $\vec{AI} \perp (d) \implies \vec{AI} \perp \vec{n} \implies \vec{AI} \cdot \vec{n} = 0$ យើងបាន

$$2(2 - a) + 2(-1 - b) + (-1)(1 - c) = 0$$

$$4 - 2a - 2 - 2b - 1 + c = 0$$

$$-2a - 2b + c + 1 = 0 \quad (*)$$

ម្យ៉ាងទៀត $A \in (d) \implies \begin{cases} a = 2t + 3 \\ b = 2t + 3 \\ c = -t + 2 \end{cases} \quad (**)$ យកជំនួសចូល (*)

យើងបាន $-2(2t + 3) - 2(2t + 3) + (-t + 2) + 1 = 0$

$$-4t - 6 - 4t - 6 - t + 2 + 1 = 0$$

$$-9t - 9 = 0$$

$$t = -1 \text{ ជំនួសចូល (**)}$$

$$\text{នាំឱ្យ} \begin{cases} a = 2(-1) + 3 = 1 \\ b = 2(-1) + 3 = 1 \\ c = -(-1) + 2 = 3 \end{cases} \Rightarrow A(1, 1, 3)$$

ដូចនេះ: កូអរដោនេ $A(1, 1, 3)$

គ) គណនា AI រួចបង្ហាញថាបន្ទាត់ (d) ប៉ះស្វ៊ែរ (S)

$$\text{យើងមាន } \overrightarrow{AI} = (1, -2, -2) \Rightarrow AI = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + (-2)^2} = 3$$

យើងសង្កេតឃើញថា $AI = R = 3$ នោះបន្ទាត់ (d) ប៉ះស្វ៊ែរ (S) ត្រង់ចំណុច A

ដូចនេះ: បន្ទាត់ (d) ប៉ះស្វ៊ែរ (S)

