

គ្រឿងប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង៖

វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យា (វិទ្យាសាស្ត្រពិត)

រយៈពេល ១៥០នាទី

ពិន្ទុសរុប ១២៥ពិន្ទុ

មណ្ឌលប្រឡង

លេខបន្ទប់ លេខតុ

ឈ្មោះបេក្ខជន

ហត្ថលេខា

វិញ្ញាសា ០៨

- I** គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $a = 2\sqrt{3} - 2i$ និង $b = -\sqrt{2} + i\sqrt{2}$ ។
- ក ចូរសរសេរ $z = a^2 + b^2 + 4ai + 2\sqrt{2}b$ ជាទម្រង់ពីជគណិត។
- ខ ចូរសរសេរ a ; b និង ab ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។
- II** គណនាលីមីតខាងក្រោម
- ក $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x} - \sqrt{x} - \sqrt{x})$ ខ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{\tan^2 x}$ គ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2021x} - e^{2020x}}{\ln(1+x)}$
- III** ក្នុងប្រអប់មួយមានឃ្លីសពីរគ្រាប់ចុះលេខ 1, 2 និងឃ្លីខៀវបីគ្រាប់ចុះលេខ 1, 2, 3 ។ គេចាប់យកឃ្លីពីរគ្រាប់ព្រមគ្នាដោយចៃដន្យ។ រកប្រូបាប៊ីលីតេនៃព្រឹត្តិការណ៍៖
- A: ចាប់បានឃ្លីទាំងពីរមានពណ៌ដូចគ្នា។
- B: ចាប់បានឃ្លីមានផលបូកលេខស្មើ 3 ។
- C: ចាប់បានឃ្លីមានពណ៌ដូចគ្នា និងមានផលបូកលេខស្មើ 3 ។
- IV** ១ គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = \frac{4-2x}{(2x+1)(x^2+1)}$ ដែល $x \neq -\frac{1}{2}$ ។
- ក កំណត់ m, n, p ដើម្បីឱ្យ $f(x) = \frac{m}{2x+1} + \frac{nx+p}{x^2+1}$ ។
- ខ គណនា $I(a) = \int_0^a f(x)dx$ ។ រួចទាញរក $\lim_{a \rightarrow +\infty} I(a)$ ។
- ២ គេឱ្យសមីការ (E) : $y'' + 3y' + 2y = 2x^2 + 12x + 13$ ។
- ក ដោះស្រាយសមីការ (F) : $y'' + 3y' + 2y = 0$ ។
- ខ កំណត់ពហុធានីក្រេទីពីរ $P(x)$ ជាចម្លើយមួយនៃសមីការ (E) ។
- គ ទាញរកចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E) ។
- V** ១ ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(\vec{O}, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេឱ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{u} = -4\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ និង $\vec{v} = -\vec{j} + \vec{k}$ ។
- ក រកកូអរដោនេចំណុច M បើ $\vec{OM} = \vec{u} + 2\vec{v}$ ។
- ខ គណនា $\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v}$ រួចទាញថា $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ មិនកូលីនេអ៊ែរគ្នា។
- គ រកសមីការប្លង់ (P) កាត់តាម M ហើយកែងនឹង $\vec{w}$ ។
- ឃ រកកូអរដោនេនៃចំណុច A, B, C បើដឹងថា $\vec{OA} = \vec{u}$; $\vec{OB} = \vec{v}$ និង $\vec{OC} = \vec{w}$ ។ ទាញរកមាឌចតុមុខ OABC ។
- ២ គេឱ្យប៉ារ៉ាបូល (P) : $x^2 + ax + by + c = 0$ ។
- ក កំណត់ a, b, c បើគេដឹងថាប៉ារ៉ាបូលកាត់តាមចំណុច $A(-1, 2)$; $B(-3, 5)$ និង $C(3, 2)$ ។
- ខ សរសេរសមីការស្តង់ដារនៃ (P) រួចសង្ខេប។
- VI** ១ គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = (x-1)e^x + 1$ ដែល $x \in \mathbb{R}$ ។
- ក គណនា $f'(x)$ រួចសង្ខេបតារាងអថេរភាព f ។ (មិនបាច់គណនាលីមីតចុងដែនកំណត់)
- ខ ទាញរកសញ្ញានៃ $f(x)$ ។
- ២ អនុគមន៍ g កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $g(x) = (x-2)(e^x + 1)$ និងក្រាបតំណាង (C) ។
- ក គណនា $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x)$ ។ គណនា $g'(x)$ រួចរកសញ្ញារបស់វា។

- ខ) បង្ហាញថាបន្ទាត់ (d) : $y = x - 2$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C) ខាង $-\infty$ ។ សិក្សាទីតាំងរវាង (C) និង (d) ។
- គ) កំណត់សមីការបន្ទាត់ប៉ះ (T) ទៅនឹងក្រាប (C) ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ (d) ។
- ឃ) គណនា $g''(x)$ រួចរកកូអរដោនេចំណុចរបស់ I នៃក្រាប (C) ។
- ង) សង់តារាងអថេរភាព g ។
- ច) សង់ក្រាប (C) ។ គណនាក្រឡាផ្ទៃ $S(a)$ ដែលខណ្ឌដោយក្រាប (C) បន្ទាត់ (d) និង $x = a$; $x = 2$ ដែល $a < 2$ ។ គណនា $\lim_{a \rightarrow -\infty} S(a)$ ។ (គេឱ្យ $e = 2.7$)

ដំណោះស្រាយ

I ក) ចូរសរសេរ $z = a^2 + b^2 + 4ai + 2\sqrt{2}b$ ជាទម្រង់ពីជគណិត

យើងមាន $a = 2\sqrt{3} - 2i$ និង $b = -\sqrt{2} + i\sqrt{2}$

$$\begin{aligned}\text{យើងបាន } z &= (2\sqrt{3} - 2i)^2 + (-\sqrt{2} + i\sqrt{2})^2 + 4i(2\sqrt{3} - 2i) + 2\sqrt{2}(-\sqrt{2} + i\sqrt{2}) \\ &= (12 - 8i\sqrt{3} - 4) + (2 - 4i - 2) + (8i\sqrt{3} + 8) + (-4 + 4i) \\ &= 8 - 8i\sqrt{3} - 4i + 8i\sqrt{3} + 8 - 4 + 4i \\ &= 12\end{aligned}$$

ដូចនេះ: $z = 12$

ខ) ចូរសរសេរ a ; b និង ab ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

យើងបាន $a = 2\sqrt{3} - 2i$

$$\begin{aligned}&= 4 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - i\frac{1}{2} \right) \\ &= 4 \left[\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) \right]\end{aligned}$$

$$b = -\sqrt{2} + i\sqrt{2}$$

$$\begin{aligned}&= 2 \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \\ &= 2 \left(\cos\frac{3\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4} \right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{និង } ab &= 4 \left[\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) \right] \times 2 \left(\cos\frac{3\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4} \right) \\ &= 8 \left[\cos\left(-\frac{\pi}{6} + \frac{3\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{6} + \frac{3\pi}{4}\right) \right] \\ &= 8 \left(\cos\frac{7\pi}{12} + i\sin\frac{7\pi}{12} \right)\end{aligned}$$

ដូចនេះ: $a = 4 \left[\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) \right]$; $b = 2 \left(\cos\frac{3\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4} \right)$ និង $ab = 8 \left(\cos\frac{7\pi}{12} + i\sin\frac{7\pi}{12} \right)$

II គណនាលីមីតខាងក្រោម

ក) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x - \sqrt{x}} - \sqrt{x})$ (រាងមិនកំណត់ $\infty - \infty$)

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x - \sqrt{x}} - \sqrt{x}) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x - \sqrt{x}} - \sqrt{x})(\sqrt{x - \sqrt{x}} + \sqrt{x})}{\sqrt{x - \sqrt{x}} + \sqrt{x}} \quad \left[\because \text{គុណកន្សោមផ្លាស់} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \sqrt{x} - x}{\sqrt{x - \sqrt{x}} + \sqrt{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\sqrt{x}}{\sqrt{x - \sqrt{x}} + \sqrt{x}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\sqrt{x}}{\sqrt{x} \cdot \sqrt{1 - \frac{1}{\sqrt{x}}} + \sqrt{x}} \\
&= - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} \left(\sqrt{1 - \frac{1}{\sqrt{x}}} + 1 \right)} \\
&= - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{\sqrt{x}}} + 1} \\
&= - \frac{1}{\sqrt{1 - 0} + 1} \\
&= -\frac{1}{2}
\end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x} - \sqrt{x} - \sqrt{x} \right) = -\frac{1}{2}}$

ខ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{\tan^2 x} \quad \left(\text{រាងមិនកំណត់ } \frac{0}{0} \right)$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{\tan^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \sqrt{\cos x})(1 + \sqrt{\cos x})}{\tan^2 x (1 + \sqrt{\cos x})}$$

[$\because$ គុណកន្សោមផ្លាស់]

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\tan^2 x (1 + \sqrt{\cos x})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{\tan^2 x (1 + \sqrt{\cos x})}$$

$$\left[\because \cos x = 1 - 2 \sin^2 \frac{x}{2} \implies 1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2} \right]$$

$$= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 \cdot \left(\frac{x}{\tan x} \right)^2 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1 + \sqrt{\cos x}}$$

$$= 2 \cdot (1)^2 \cdot (1)^2 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{4}$$

ដូចនេះ: $\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{\tan^2 x} = \frac{1}{4}}$

គ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2021x} - e^{2020x}}{\ln(1+x)} \quad \left(\text{រាងមិនកំណត់ } \frac{0}{0} \right)$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2021x} - e^{2020x}}{\ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2020x}(e^x - 1)}{\ln(1+x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} e^{2020x} \cdot \frac{e^x - 1}{x} \cdot \frac{x}{\ln(1+x)}$$

$$= e^0 \cdot (1) \cdot (1)$$

$$= 1$$

ដូចនេះ: $\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2021x} - e^{2020x}}{\ln(1+x)} = 1}$

III តាង S ជាលំហសំណាកនៃពិសោធន៍ចៃដន្យនេះ

ដោយគេចាប់យកឃ្លីពីគ្រាប់ចេញពីឃ្លីសរុបទាំងប្រាំគ្រាប់

យើងបាន $n(S) = C(5, 2) = \frac{5!}{(5-2)! \times 2!} = \frac{5!}{3! \times 2!} = \frac{5 \times 4}{2} = 10$

រកប្រូបាប៊ីលីតេនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

A: ចាប់បានឃ្លីទាំងពីរមានពណ៌ដូចគ្នា

ការចាប់ឱ្យបានឃ្លីពីរមានពណ៌ដូចគ្នាមានពីរករណីដូចខាងក្រោម៖

- ចាប់ឃ្លីសទាំងពីរ គឺគេត្រូវចាប់យកឃ្លីស 2 គ្រាប់ចេញពីឃ្លីសសរុបទាំង 2 គ្រាប់
នាំឱ្យ ចំនួនរបៀប = $C(2, 2) = 1$
- ចាប់បានឃ្លីខៀវទាំងពីរ គឺគេត្រូវចាប់យកឃ្លីខៀវ 2 គ្រាប់ចេញពីឃ្លីខៀវសរុបទាំង 3 គ្រាប់
នាំឱ្យ ចំនួនរបៀប = $C(3, 2) = 3$

យើងបាន $n(A) = 1 + 3 = 4$

នាំឱ្យ $P(A) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$

ដូចនេះ $P(A) = \frac{2}{5}$

B: ចាប់បានឃ្លីមានផលបូកលេខស្មើ 3

តាង w_1, w_2 ជាឃ្លីសទាំងពីរដែលចុះលេខ 1, 2 រៀងគ្នា

b_1, b_2, b_3 ជាឃ្លីខៀវទាំងបីដែលចុះលេខ 1, 2, 3 រៀងគ្នា

យើងបាន $B = \{(w_1, w_2); (w_1, b_2); (w_2, b_1); (b_1, b_2)\} \Rightarrow n(B) = 4$

នាំឱ្យ $P(B) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$

ដូចនេះ $P(B) = \frac{2}{5}$

C: ចាប់បានឃ្លីមានពណ៌ដូចគ្នា និងមានផលបូកលេខស្មើ 3

យើងបាន $C = \{(w_1, w_2); (b_1, b_2)\} \Rightarrow n(C) = 2$

នាំឱ្យ $P(C) = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$

ដូចនេះ $P(C) = \frac{1}{5}$

IV 9 គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = \frac{4-2x}{(2x+1)(x^2+1)}$ ដែល $x \neq -\frac{1}{2}$

ក កំណត់ m, n, p ដើម្បីឱ្យ $f(x) = \frac{m}{2x+1} + \frac{nx+p}{x^2+1}$

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } \frac{4-2x}{(2x+1)(x^2+1)} &= \frac{m}{2x+1} + \frac{nx+p}{x^2+1} \\ \frac{4-2x}{(2x+1)(x^2+1)} &= \frac{m(x^2+1) + (nx+p)(2x+1)}{(2x+1)(x^2+1)} \end{aligned}$$

$$4-2x = m(x^2+1) + (nx+p)(2x+1)$$

[$\because$ លុបភាគបែងចោល]

$$-2x+4 = mx^2+m+2nx^2+nx+2px+p$$

$$0x^2-2x+4 = (m+2n)x^2 + (n+2p)x + (m+p)$$

$$\text{នាំឱ្យ } \begin{cases} m+2n=0 & (1) \\ n+2p=-2 & (2) \\ m+p=4 & (3) \end{cases}$$

[$\because$ ផ្ទឹមមេគុណនៃតួដែលមានដឺក្រេដូចគ្នា]

$$\text{យក } (1) - (3) \text{ យើងបាន } 2n-p=-4 \quad (4)$$

$$\text{តាម } (2) \text{ និង } (4) \text{ យើងបាន } \begin{cases} n+2p=-2 & (2) \\ 2n-p=-4 & (4) \times 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n+2p=-2 & (2) \\ 4n-2p=-8 & (4) \end{cases}$$

$$\text{យក } (2) + (4) \text{ នាំឱ្យ } 5n=-10 \Rightarrow n=-2$$

$$\text{តាម } (1) \Rightarrow m=-2n=-2(-2)=4$$

$$\text{តាម } (3) \Rightarrow p=4-m=4-4=0$$

ដូចនេះ $m=4; n=-2 \text{ និង } p=0$

ខ) គណនា $I(a) = \int_0^a f(x) dx$ រួចទាញរក $\lim_{a \rightarrow +\infty} I(a)$

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } I(a) &= \int_0^a \left(\frac{4}{2x+1} + \frac{-2x}{x^2+1} \right) dx \\ &= 4 \int_0^a \frac{dx}{2x+1} - \int_0^a \frac{d(x^2+1)}{x^2+1} \quad [\because d(x^2+1) = 2x dx] \\ &= 4 \left[\frac{1}{2} \ln |2x+1| \right]_0^a - \left[\ln |x^2+1| \right]_0^a \\ &= 2 [\ln(2a+1) - \ln 1] - [\ln(a^2+1) - \ln 1] \\ &= 2 \ln(2a+1) - \ln(a^2+1) \\ &= \ln(2a+1)^2 - \ln(a^2+1) \quad [\because n \ln x = \ln x^n] \\ &= \ln \frac{(2a+1)^2}{a^2+1} \quad \left[\because \ln a - \ln b = \ln \frac{a}{b} \right] \end{aligned}$$

ដូចនេះ: $I(a) = \ln \frac{(2a+1)^2}{a^2+1}$ ចំពោះ $a > 0$

$$\begin{aligned} \text{មួយវិញទៀត } \lim_{a \rightarrow +\infty} I(a) &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \ln \frac{(2a+1)^2}{a^2+1} \\ &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \ln \left[\frac{a^2 \left(2 + \frac{1}{a} \right)^2}{a^2 \left(1 + \frac{1}{a^2} \right)} \right] \\ &= \ln \frac{2^2}{1} \\ &= 2 \ln 2 \end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\lim_{a \rightarrow +\infty} I(a) = 2 \ln 2$

២) គេឱ្យសមីការ (E) : $y'' + 3y' + 2y = 2x^2 + 12x + 13$

ក) ដោះស្រាយសមីការ (F) : $y'' + 3y' + 2y = 0$

$$\text{សមីការសម្គាល់ } \lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0 \implies \lambda_1 = -1 ; \lambda_2 = -2$$

$[\because \text{មេគុណ } a - b + c = 0]$

នាំឱ្យសមីការ (F) មានចម្លើយ $y = Ae^{\lambda_1 x} + Be^{\lambda_2 x} = Ae^{-x} + Be^{-2x}$ ដែល $A, B \in \mathbb{R}$

ដូចនេះ: ចម្លើយនៃសមីការ (F) គឺ $y = Ae^{-x} + Be^{-2x}$ ដែល $A, B \in \mathbb{R}$

ខ) កំណត់ពហុធានីក្រេទីពីរ $P(x)$ ជាចម្លើយមួយនៃសមីការ (E)

$$\text{តាង } P(x) = ax^2 + bx + c \implies P'(x) = (ax^2 + bx + c)' = 2ax + b \implies P''(x) = 2a$$

$P(x)$ ជាចម្លើយមួយនៃ (E) កាលណា

$$\begin{aligned} P''(x) + 3P'(x) + 2P(x) &= 2x^2 + 12x + 13 \\ 2a + 3(2ax + b) + 2(ax^2 + bx + c) &= 2x^2 + 12x + 13 \\ 2a + 6ax + 3b + 2ax^2 + 2bx + 2c &= 2x^2 + 12x + 13 \\ 2ax^2 + (6a + 2b)x + (2a + 3b + 2c) &= 2x^2 + 12x + 13 \end{aligned}$$

$$\text{នាំឱ្យ } \begin{cases} 2a = 2 \\ 6a + 2b = 12 \\ 2a + 3b + 2c = 13 \end{cases} \implies \begin{cases} a = 1 \\ b = \frac{12 - 6a}{2} = \frac{12 - 6}{2} = 3 \\ c = \frac{13 - 3b - 2a}{2} = \frac{13 - 9 - 2}{2} = 1 \end{cases} \quad \text{នាំឱ្យ } P(x) = x^2 + 3x + 1$$

ដូចនេះ: ពហុធានីក្រេទីពីរគឺ $P(x) = x^2 + 3x + 1$

គ) ទាញរកចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E)

ដោយ $y = Ae^{-x} + Be^{-2x}$ ជាចម្លើយនៃសមីការអូម៉ូសែន (F)

និង $P(x) = x^2 + 3x + 1$ ជាចម្លើយមួយនៃសមីការ (E)

នោះ $y = Ae^{-x} + Be^{-2x} + x^2 + 3x + 1$ ជាចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E)

ដូចនេះ: ចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E) គឺ $y = Ae^{-x} + Be^{-2x} + x^2 + 3x + 1$ ដែល $A, B \in \mathbb{R}$

V

9 ក

រកកូអរដោនេចំណុច M បើ $\overrightarrow{OM} = \vec{u} + 2\vec{v}$

គេឱ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{u} = -4\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ និង $\vec{v} = -\vec{j} + \vec{k}$

តាង $M(x_M, y_M, z_M)$ នោះ $\overrightarrow{OM} = (x_M, y_M, z_M)$

[$\because O(0, 0, 0)$]

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } (x_M, y_M, z_M) &= (-4\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) + 2(-\vec{j} + \vec{k}) \\ &= -4\vec{i} + \vec{j} + \vec{k} - 2\vec{j} + 2\vec{k} \\ &= -4\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k} \\ &= (-4, -1, 3) \end{aligned}$$

$$\text{នាំឱ្យ } \begin{cases} x_M = -4 \\ y_M = -1 \\ z_M = 3 \end{cases} \implies M(-4, -1, 3)$$

ដូចនេះ: កូអរដោនេចំណុច $M(-4, -1, 3)$

ខ គណនា $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$ រួចទាញថា $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ មិនកូលីនេអ៊ែរគ្នា

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } \vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -4 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} -4 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} -4 & 1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= 2\vec{i} + 4\vec{j} + 4\vec{k} \neq \vec{0} \implies \vec{u}, \vec{v} \text{ មិនកូលីនេអ៊ែរគ្នា} \end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\vec{n} = (2, 4, 4)$ និង $\vec{u}, \vec{v}$ មិនកូលីនេអ៊ែរគ្នា

គ រកសមីការប្លង់ (P) កាត់តាម M ហើយកែងនឹង $\vec{n}$

ប្លង់ (P) កាត់តាមចំណុច $M(-4, -1, 3)$ និងមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n} = (2, 4, 4)$ មានសមីការកំណត់ដោយ៖

$$2[x - (-4)] + 4[y - (-1)] + 4[z - 3] = 0$$

$$2x + 8 + 4y + 4 + 4z - 12 = 0$$

$$2x + 4y + 4z = 0$$

$$x + 2y + 2z = 0$$

ដូចនេះ: សមីការប្លង់ (P) : $x + 2y + 2z = 0$

ឃ រកកូអរដោនេនៃចំណុច A, B, C រួចទាញរកមាឌចតុមុខ OABC

$$\text{ដោយគេដឹងថា } \begin{cases} \overrightarrow{OA} = \vec{u} = (-4, 1, 1) \\ \overrightarrow{OB} = \vec{v} = (0, -1, 1) \\ \overrightarrow{OC} = \vec{n} = (2, 4, 4) \end{cases} \implies \begin{cases} A(-4, 1, 1) \\ B(0, -1, 1) \\ C(2, 4, 4) \end{cases}$$

ដូចនេះ: $A(-4, 1, 1)$; $B(0, -1, 1)$ និង $C(2, 4, 4)$

$$\text{ហើយ } V_{OABC} = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}) \cdot \overrightarrow{OC}| = \frac{1}{6} |(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{n}|$$

$$\text{ដោយ } (\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{n} = (2, 4, 4) \cdot (2, 4, 4) = (2)(2) + (4)(4) + (4)(4) = 36$$

$$\text{នាំឱ្យ } V_{OABC} = \frac{1}{6} \times 36 = 6$$

ដូចនេះ: មាឌចតុមុខ OABC គឺ $V_{OABC} = 6$ ឯកតាមាឌ

២ ក

កំណត់ a, b, c

បើគេដឹងថាប៉ារ៉ាប៉ូល (P) : $x^2 + ax + by + c = 0$ កាត់តាមចំណុច $A(-1, 2)$; $B(-3, 5)$ និង $C(3, 2)$

$$\text{យើងបាន } \begin{cases} (-1)^2 - a + 2b + c = 0 & (1) \\ (-3)^2 - 3a + 5b + c = 0 & (2) \\ 3^2 + 3a + 2b + c = 0 & (3) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -a + 2b + c = -1 & (1) \\ -3a + 5b + c = -9 & (2) \\ 3a + 2b + c = -9 & (3) \end{cases}$$

$$\text{យក } (1) - (2) \text{ និង } (2) - (3) \text{ យើងបាន } \begin{cases} 2a - 3b = 8 & (4) \\ -6a + 3b = 0 & (5) \end{cases}$$

$$\text{យក } (4) + (5) \text{ នោះ: } -4a = 8 \Rightarrow a = -2$$

$$\text{តាម } (5) \Rightarrow b = \frac{6a}{3} = 2a = 2(-2) = -4$$

$$\text{តាម } (1) \Rightarrow c = -1 + a - 2b = -1 - 2 - 2(-4) = 5$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{a = -2, b = -4 \text{ និង } c = 5}$$

ខ) សរសេរសមីការស្តង់ដារនៃ (P) រួចសង្កេត

$$\text{តាមការគណនាខាងលើយើងបាន } (P): x^2 - 2x - 4y + 5 = 0$$

$$(x^2 - 2x \cdot 1 + 1^2) - 4y + 4 = 0$$


$$(x - 1)^2 = 4y - 4$$

$$(x - 1)^2 = 4(y - 1)$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{\text{សមីការស្តង់ដារប៉ារ៉ាបូល } (P): (x - 1)^2 = 4(y - 1)}$$

$$\text{សមីការខាងលើមានរាង } (x - h)^2 = 4p(y - k) \text{ នោះ: } \begin{cases} h = 1 \\ k = 1 \\ p = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \text{កំពូល} & V(h, k) = (1, 1) \\ \text{កំណុំ} & F(h, k + p) = (1, 2) \\ \text{បន្ទាត់ប្រាប់ទិស} & y = k - p = 0 \end{cases}$$

$$\text{តារាងតម្លៃលេខជំនួយ } \begin{array}{c|cc} x & -1 & 3 \\ \hline y & 2 & 2 \end{array}$$



VI ៩ ក) គណនា $f'(x)$ រួចសង្កេតតារាងអថេរភាព f (មិនបាច់គណនាលីមីតចុងដែនកំណត់)

$$\text{យើងមានអនុគមន៍ } f(x) = (x - 1)e^x + 1 \text{ ដែល } x \in \mathbb{R}$$

$$\text{យើងបាន } f'(x) = [(x - 1)e^x + 1]'$$

$$= (x - 1)'e^x + (x - 1)(e^x)' + 0 \quad [(\cdot)'(uv)' = u'v + uv']$$

$$= e^x + (x - 1)e^x$$

$$= e^x(1 + x - 1)$$

$$= xe^x$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{f'(x) = xe^x; \forall x \in \mathbb{R}}$$

ដោយ $e^x > 0$ ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ នោះ $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច x យើងបាន៖

- $f'(x) = 0$ ពេល $x = 0$
- $f'(x) > 0$ ពេល $x > 0$
- $f'(x) < 0$ ពេល $x < 0$

យើងបានតារាងអថេរភាព f ដូចខាងក្រោម

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$			

ខ) ទាញរកសញ្ញានៃ $f(x)$

តាមតារាងអថេរភាពខាងលើឃើញថា f មានតម្លៃអប្បបរមាធៀបត្រង់ $x = 0$ គឺ $f(0) = (0 - 1)e^0 + 1 = -1 + 1 = 0$ យើងទាញបាន $f(x) \geq 0$ ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$

ដូចនេះ $f(x) \geq 0 ; \forall x \in \mathbb{R}$

២) អនុគមន៍ g កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $g(x) = (x - 2)(e^x + 1)$ និងក្រាបតំណាង (C)

ក) គណនា $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x)$ និងគណនា $g'(x)$ រួចរកសញ្ញារបស់វា

យើងបាន $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x - 2)(e^x + 1)$

$$= (-\infty - 2)(0 + 1) \quad \left[\because \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \right]$$

$$= -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 2)(e^x + 1)$$

$$= (+\infty - 2)(+\infty + 1) \quad \left[\because \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \right]$$

$$= +\infty$$

ដូចនេះ $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = \pm\infty$

$$\begin{aligned} \text{ហើយ } g'(x) &= [(x - 2)(e^x + 1)]' \\ &= (x - 2)'(e^x + 1) + (x - 2)(e^x + 1)' \\ &= e^x + 1 + (x - 2)e^x \\ &= e^x + 1 + xe^x - 2e^x \\ &= xe^x - e^x + 1 \\ &= (x - 1)e^x + 1 \end{aligned}$$

ដូចនេះ $g'(x) = (x - 1)e^x + 1$

ដោយ $g'(x) = (x - 1)e^x + 1 = f(x)$ នាំឱ្យ $g'(x)$ មានសញ្ញាដូច $f(x)$ យើងបាន $g'(x) \geq 0$ ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$

ដូចនេះ $g'(x) \geq 0$ ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$

ខ) • បង្ហាញថាបន្ទាត់ (d) : $y = x - 2$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C) ខាង $-\infty$

$$\begin{aligned} \text{ពិនិត្យ } \lim_{x \rightarrow -\infty} (y_c - y_d) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} [(x - 2)(e^x + 1) - (x - 2)] \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (x - 2)(e^x + 1 - 1) \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (x - 2)e^x \\ &= 0 \end{aligned}$$

នាំឱ្យ $y = x - 2$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C) ខាង $-\infty$

ដូចនេះ: បន្ទាត់ (d) : $y = x - 2$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C) ខាង $-\infty$

- សិក្សាទីតាំងរវាង (C) និង (d) យើងមាន $y_C - y_d = (x - 2)e^x$ នាំឱ្យ $y_C - y_d$ មានសញ្ញាដូច $x - 2$
 - * $x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2$
 - * $x - 2 > 0 \Rightarrow x > 2$
 - * $x - 2 < 0 \Rightarrow x < 2$

ដូចនេះ: ក្រាប (C) ប្រសព្វ (d) ត្រង់ $x = 2$; (C) នៅលើ (d) ពេល $x > 2$ និង (C) នៅក្រោម (d) ពេល $x < 2$

- គ) កំណត់សមីការបន្ទាត់ប៉ះ (T) ទៅនឹងក្រាប (C) ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ (d)
 ឧបមាថាបន្ទាត់ (T) ប៉ះទៅនឹងក្រាប (C) ត្រង់ចំណុចដែលមានអាបស៊ីស x_0
 នោះ (T) មានមេគុណប្រាប់ទិស $g'(x_0)$ ហើយ (T) $\parallel$ (d) : $y = x - 2$ យើងបាន៖

$$\begin{aligned} g'(x_0) &= 1 \\ \text{នាំឱ្យ } (x_0 - 1)e^{x_0} + 1 &= 1 \\ (x_0 - 1)e^{x_0} &= 0 \\ x_0 - 1 &= 0 \quad [\because e^{x_0} > 0] \\ x_0 &= 1 \\ \text{ហើយ } g(x_0) &= (x_0 - 2)(e^{x_0} + 1) \\ &= (1 - 2)(e + 1) \\ &= -e - 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{សមីការបន្ទាត់ (T) មានរាង } y &= g'(x_0)(x - x_0) + g(x_0) \\ &= 1(x - 1) + (-e - 1) \\ &= x - e - 2 \end{aligned}$$

ដូចនេះ: សមីការបន្ទាត់ប៉ះ (T) : $y = x - e - 2$

- ឃ) គណនា $g''(x)$ រួចរកកូអរដោនេចំណុចរបត់ I នៃក្រាប (C)

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } g''(x) &= [g'(x)]' \\ &= [(x - 1)e^x + 1]' \\ &= (x - 1)'e^x + (x - 1)(e^x)' \\ &= e^x + (x - 1)e^x \\ &= e^x(1 + x - 1) \\ &= xe^x \end{aligned}$$

យើងបាន $g''(x)$ មានសញ្ញាដូច x
 តារាងសញ្ញានៃ $g''(x)$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g''(x)$	$-$	0	$+$

តាមតារាងសញ្ញាខាងលើឃើញថា $g''(x)$ ប្តូរសញ្ញាពី $(-)$ ទៅ $(+)$ ត្រង់ $x = 0$ និង $g(0) = (0 - 2)(e^0 + 1) = -4$
 នោះកូអរដោនេចំណុចរបត់នៃក្រាប (C) គឺ $I(0, -4)$

ដូចនេះ: កូអរដោនេចំណុចរបត់នៃក្រាប (C) គឺ $I(0, -4)$

- ង) សង់តារាងអថេរភាព g

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$		0	
$g(x)$	$-\infty$	-4	$+\infty$


ថ) • សង់ក្រាប (C)

បន្ទាត់ (d) : $y = x - 2$

x	0	2
y	-2	0

បន្ទាត់ (T) : $y = x - e - 2$

x	0	$e + 2 = 4.7$
y	$-e - 2 = -4.7$	0



• គណនាក្រឡាផ្ទៃ $S(a)$ និង $\lim_{a \rightarrow -\infty} S(a)$

ផ្ទៃ $S(a)$ ដែលខណ្ឌដោយក្រាប (C) បន្ទាត់ (d) និង $x = a$; $x = 2$ ដែល $a < 2$ កំណត់ដោយ៖

$$S(a) = \int_a^2 (y_d - y_c) dx \quad [\because \text{ក្រាបនៅក្រោមបន្ទាត់ពេល } x < 2]$$

$$= - \int_a^2 (x - 2)e^x dx \quad [\because y_c - y_d = (x - 2)e^x]$$

តាង $u = x - 2 \Rightarrow du = dx$

$dv = e^x \Rightarrow v = \int e^x dx = e^x$

យើងបាន $S(a) = - \left([uv]_a^2 - \int_a^2 v du \right) \quad [\because \text{អាំងតេក្រាលដោយផ្នែក}]$

$$= - \left[(x - 2)e^x \right]_a^2 + \int_a^2 e^x dx$$

$$\begin{aligned}
 &= - \left[(2 - 2)e^2 - (a - 2)e^a \right] + \left[e^x \right]_a^2 \\
 &= (a - 2)e^a + (e^2 - e^a) \\
 &= (a - 2)e^a - e^a + e^2 \\
 &= (a - 3)e^a + e^2
 \end{aligned}$$

ហើយ $\lim_{a \rightarrow -\infty} S(a) = \lim_{a \rightarrow -\infty} [(a - 3)e^a + e^2] = 0 + e^2 = 2.7^2 = 7.29$

ដូចនេះ: $S(a) = (a - 3)e^a + e^2$ និង $\lim_{x \rightarrow -\infty} S(a) = 7.29$

