

គ្រឿងប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង៖

វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យា (វិទ្យាសាស្ត្រពិត)

រយៈពេល ១៥០នាទី

ពិន្ទុសរុប ១២៥ពិន្ទុ

មណ្ឌលប្រឡង

លេខបន្ទប់ លេខតុ

ឈ្មោះបេក្ខជន

ហត្ថលេខា

វិញ្ញាសា ០៩

I គណនាលីមីតខាងក្រោម

ក $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 6x - 7}{x^2 - 5x + 4}$

ខ $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2}{x^2 - 1} - \frac{1}{x - 1} \right)$

គ $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{2(1 - \cos x)} - \frac{1}{\sin^2 x} \right]$

II គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z = -2 + 2\sqrt{3}i$ និង $w = x(x - i) + y(y + i)$ ។

ក សរសេរ z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

ខ សរសេរ z^3 ជាទម្រង់ $a + bi$ ។

គ គណនា x, y ដើម្បីឱ្យ $w = z^3$ ។

III ក្នុងប្រអប់មួយមានឃ្លីបួនគ្រាប់ដែលចុះលេខ 1, 2, 3, 4 ។ គេចាប់យកឃ្លីម្តងមួយៗចំនួនពីរដងដោយមិនដាក់ចូលវិញ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

A: ឃ្លីមួយមានលេខសេស និងឃ្លីមួយទៀតមានលេខគូ។

B: ផលបូកលេខលើឃ្លីទាំងពីរជាពហុគុណនៃ 3 ។

C: លេខលើឃ្លីទាំងពីរជាពហុគុណនៃ 2 ។

IV ១ គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = \frac{3x^2 - 5x - 2}{x(x - 1)^2}$ ចំពោះ $x \notin \{0, 1\}$ ។

ក កំណត់ a, b, c ដើម្បីឱ្យ $f(x) = \frac{a}{x} + \frac{b}{x - 1} + \frac{c}{(x - 1)^2}$ ។

ខ គណនា $I = \int_2^3 f(x) dx$ ។

២ គេឱ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) : $y'' - 3y' + 2y = 2x^2 - 6x + 2$ ។

ក រកអនុគមន៍ដ៏ក្រេទីពីរ $g(x)$ ដែលជាចម្លើយមួយនៃ (E) ។

ខ បង្ហាញថាអនុគមន៍ $f(x)$ ជាចម្លើយនៃ (E) លុះត្រាតែអនុគមន៍ $f(x) - g(x)$ ជាចម្លើយនៃ (E') : $y'' - 3y' + 2y = 0$ ។

គ ដោះស្រាយសមីការ (E') រួចទាញរកចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E) ។

V ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $(\vec{0}, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេឱ្យចំណុច $S(0, 0, 3)$ និងវ៉ិចទ័រ $\vec{p} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ ។

ក រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់ (d) ដែលកាត់ចំណុច S ហើយស្របនឹង $\vec{p}$ ។

ខ យក $M(a, b, c)$ ជាចំណុចក្នុងតម្រុយ $(\vec{0}, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ។ រកទំនាក់ទំនងរវាង a, b, c ដើម្បីឱ្យ $\vec{SM}$ អរតូកូណាល់នឹង $\vec{p}$ ។

គ គេឱ្យចំណុច $A(3, 0, 0)$ និង $B(0, 3, 0)$ ។ បង្ហាញថា $\triangle ABS$ ជាត្រីកោណសម័ង្ស។

ឃ គណនា $\vec{SA} \times \vec{SB}$ រួចទាញរកផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ SAB ។

VI f ជាអនុគមន៍កំណត់ដោយ $f(x) = -x^2 + 1 - \ln x$ ដែល $x > 0$ ។

១ គណនា $f'(x)$ ។ គណនា $f(1)$ រួចទាញរកសញ្ញានៃ $f(x)$ ។

២ អនុគមន៍ g កំណត់លើ $(0, +\infty)$ ដោយ $g(x) = -x + 1 + \frac{\ln x}{x}$ និងមានក្រាប (C) ។

ក គណនា $g'(x)$ រួចបង្ហាញថា $g'(x)$ មានសញ្ញាដូច $f(x)$ ។

ខ គណនា $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$ និង $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ ។ សង់តារាងអថេរភាពនៃ g ។

គ រកសមីការអាស៊ីមតូតទ្រីត (d) នៃ (C) រួចសិក្សាទីតាំងធៀបរបស់វា។

ឃ សង់ក្រាប (C) និងបន្ទាត់ (d) ក្នុងតម្រុយ $(\vec{0}, \vec{i}, \vec{j})$ តែមួយ។

VII គេឱ្យសមីការអ៊ីពែបូល $-x^2 + 4y^2 - 2x - 16y + 11 = 0$ ។

- ក រកកូអរដោនេផ្ចិត កំពូល កំណុំ និងសមីការអាស៊ីមតូត។
ខ សង់អ៊ីពែបូល។

ដំណោះស្រាយ

I គណនាលីមីតខាងក្រោម

ក $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 6x - 7}{x^2 - 5x + 4} \quad \left(\text{រាងមិនកំណត់ } \frac{0}{0} \right)$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 6x - 7}{x^2 - 5x + 4} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+7)}{(x-1)(x-4)} \\ &= \frac{1+7}{1-4} \\ &= -\frac{8}{3} \end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\boxed{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 6x - 7}{x^2 - 5x + 4} = -\frac{8}{3}}$

ខ $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2}{x^2 - 1} - \frac{1}{x - 1} \right) \quad \left(\text{រាងមិនកំណត់ } \infty - \infty \right)$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2}{x^2 - 1} - \frac{1}{x - 1} \right) &= \lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{2}{(x-1)(x+1)} - \frac{1}{x-1} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2 - (x+1)}{(x-1)(x+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x}{(x-1)(x+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-(x-1)}{(x-1)(x+1)} \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\boxed{\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2}{x^2 - 1} - \frac{1}{x - 1} \right) = -\frac{1}{2}}$

គ $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{2(1 - \cos x)} - \frac{1}{\sin^2 x} \right] \quad \left(\text{រាងមិនកំណត់ } \infty - \infty \right)$


$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{2(1 - \cos x)} - \frac{1}{\sin^2 x} \right] &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{2(1 - \cos x)} - \frac{1}{1 - \cos^2 x} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{2(1 - \cos x)} - \frac{1}{(1 - \cos x)(1 + \cos x)} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \cos x - 2}{2(1 - \cos x)(1 + \cos x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{2(1 - \cos x)(1 + \cos x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-(1 - \cos x)}{2(1 - \cos x)(1 + \cos x)} \\ &= \frac{-1}{2(1 + \cos 0)} \\ &= -\frac{1}{4} \end{aligned}$$

ដូចនេះ $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{2(1 - \cos x)} - \frac{1}{\sin^2 x} \right] = -\frac{1}{4}$

II ក សរសេរ z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ
យើងមានចំនួនកុំផ្លិច $z = -2 + 2\sqrt{3}i$

យើងបាន $z = 4 \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right)$
 $= 4 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right)$

ដូចនេះ $z = 4 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right)$



ខ សរសេរ z^3 ជាទម្រង់ $a + bi$

យើងបាន $z^3 = \left[4 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right) \right]^3$
 $= 4^3 \left[\cos \left(3 \times \frac{2\pi}{3} \right) + i \sin \left(3 \times \frac{2\pi}{3} \right) \right]$
 $= 64 (\cos 2\pi + i \sin 2\pi)$
 $= 64(1 + i \times 0)$
 $= 64 + 0i$

ដូចនេះ $z^3 = 64 + 0i$

គ គណនា x, y ដើម្បីឱ្យ $w = z^3$

ដោយ $w = x(x - i) + y(y + i)$

យើងបាន $x(x - i) + y(y + i) = 64 + 0i$
 $x^2 - xi + y^2 + yi = 64 + 0i$
 $(x^2 + y^2) + (-x + y)i = 64 + 0i$

នាំឱ្យ $\begin{cases} x^2 + y^2 = 64 \\ -x + y = 0 \end{cases}$
នាំឱ្យ $\begin{cases} x^2 + y^2 = 64 & (1) \\ x = y & (2) \end{cases}$

[$\because$ ផ្នែកពិតស្មើផ្នែកពិត ផ្នែកនិមិត្តស្មើផ្នែកនិមិត្ត]

យក (2) ជំនួសចូល (1) យើងបាន $x^2 + x^2 = 64$
 $2x^2 = 64$
 $x^2 = 32$
 $x = \pm\sqrt{32}$
 $= \pm 4\sqrt{2}$

ដូចនេះ $x = y = \pm 4\sqrt{2}$

III តាង S ជាលំហសំណាកនៃពិសោធន៍ចៃដន្យនេះ

ដោយគេចាប់យកឃ្លីមួយមួយៗ ចំនួនពីរដងដោយមិនដាក់ចូលវិញចេញពីឃ្លីសរុបទាំងបួនគ្រាប់
នោះការចាប់លើកទីមួយមាន 4 របៀប និងការចាប់លើកទីពីរមាន 3 របៀប

នាំឱ្យ $n(S) = 4 \times 3 = 12$

រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

A: ឃ្លីមួយមានលេខសេស និងឃ្លីមួយទៀតមានលេខគូ

យើងបាន $A = \{(1, 2); (2, 1); (1, 4); (4, 1); (2, 3); (3, 2); (3, 4); (4, 3)\} \Rightarrow n(A) = 8$

[$\because$ លទ្ធផលគិតលំដាប់]

$$\text{នាំឱ្យ } P(A) = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{P(A) = \frac{2}{3}}$$

B: ផលបូកលេខលើឃ្លីទាំងពីរជាពហុគុណនៃ 3

$$\text{យើងបាន } B = \{(1, 2); (2, 1); (2, 4); (4, 2)\} \implies n(B) = 4$$

$$\text{នាំឱ្យ } P(B) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{P(B) = \frac{1}{3}}$$

C: លេខលើឃ្លីទាំងពីរជាពហុគុណនៃ 2

$$\text{យើងបាន } C = \{(2, 4); (4, 2)\} \implies n(C) = 2$$

$$\text{នាំឱ្យ } P(C) = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{P(C) = \frac{1}{6}}$$

IV 9 គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = \frac{3x^2 - 5x - 2}{x(x-1)^2}$ ចំពោះ $x \notin \{0, 1\}$

ក កំណត់ a, b, c ដើម្បីឱ្យ $f(x) = \frac{a}{x} + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{(x-1)^2}$

$$\text{យើងបាន } \frac{3x^2 - 5x - 2}{x(x-1)^2} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{(x-1)^2}$$

$$\frac{3x^2 - 5x - 2}{x(x-1)^2} = \frac{a(x-1)^2 + bx(x-1) + cx}{x(x-1)^2}$$

$$3x^2 - 5x - 2 = a(x-1)^2 + bx(x-1) + cx$$

$$3x^2 - 5x - 2 = a(x^2 - 2x + 1) + bx^2 - bx + cx$$

$$3x^2 - 5x - 2 = ax^2 - 2ax + a + bx^2 - bx + cx$$

$$3x^2 - 5x - 2 = (a+b)x^2 + (-2a-b+c)x + a$$

$$\text{នាំឱ្យ } \begin{cases} a+b=3 \\ -2a-b+c=-5 \\ a=-2 \end{cases}$$

$$\text{នាំឱ្យ } \begin{cases} a=-2 \\ b=3-a=3-(-2)=5 \\ c=-5+2a+b=-5+2(-2)+5=-4 \end{cases}$$

[$\because$ ភាគបែងរួមគឺ $x(x-1)^2$]

[$\because$ លុបភាគបែងចោល]

[$\because$ ផ្ទឹមមេគុណត្រូវគ្នា]

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{a = -2 ; b = 5 \text{ និង } c = -4}$$

ខ គណនា $I = \int_2^3 f(x) dx$

$$\text{យើងបាន } I = \int_2^3 \left[\frac{-2}{x} + \frac{5}{x-1} + \frac{-4}{(x-1)^2} \right] dx$$

$$= \left[-2 \ln|x| + 5 \ln|x-1| + \frac{4}{x-1} \right]_2^3 \quad \left[\because \int \frac{dx}{x+a} = \ln|x+a| ; \int \frac{dx}{(x+a)^n} = -\frac{1}{(n-1)(x+a)^{n-1}} \right]$$

$$= \left(-2 \ln 3 + 5 \ln 2 + \frac{4}{3-1} \right) - \left(-2 \ln 2 + 5 \ln 1 + \frac{4}{2-1} \right)$$

$$= -2 \ln 3 + 5 \ln 2 + 2 + 2 \ln 2 - 0 - 4$$

$$= -2 \ln 3 + 7 \ln 2 - 2$$

$$= \ln 2^7 - \ln 3^2 - 2$$

$$= \ln 128 - \ln 9 - 2$$

$$= \ln \frac{128}{9} - 2$$

ដូចនេះ: $I = \ln \frac{128}{9} - 2$

២ ក) រកអនុគមន៍ដឺក្រេទីពីរ $g(x)$ ដែលជាចម្លើយមួយនៃ (E)

តាង $g(x) = ax^2 + bx + c$ នាំឱ្យ $g'(x) = 2ax + b$ នាំឱ្យ $g''(x) = 2a$

ដោយ $g(x)$ ជាចម្លើយមួយនៃ (E) : $y'' - 3y' + 2y = 2x^2 - 6x + 2$ យើងបាន៖

$$g''(x) - 3g'(x) + 2g(x) = 2x^2 - 6x + 2$$

$$2a - 3(2ax + b) + 2(ax^2 + bx + c) = 2x^2 - 6x + 2$$

$$2a - 6ax - 3b + 2ax^2 + 2bx + 2c = 2x^2 - 6x + 2$$

$$2ax^2 + (-6a + 2b)x + (2a - 3b + 2c) = 2x^2 - 6x + 2$$

$$\text{នាំឱ្យ} \begin{cases} 2a = 2 \\ -6a + 2b = -6 \\ 2a - 3b + 2c = 2 \end{cases} \quad \text{នាំឱ្យ} \begin{cases} a = 1 \\ b = \frac{-6 + 6a}{2} = \frac{-6 + 6}{2} = 0 \\ c = \frac{2 - 2a + 3b}{2} = \frac{2 - 2 + 0}{2} = 0 \end{cases} \quad \text{នាំឱ្យ } g(x) = x^2$$

ដូចនេះ: $\boxed{\text{អនុគមន៍ដឺក្រេទីពីរ } g(x) = x^2}$

ខ) បង្ហាញថាអនុគមន៍ $f(x)$ ជាចម្លើយនៃ (E) លុះត្រាតែអនុគមន៍ $f(x) - g(x)$ ជាចម្លើយនៃ (E') : $y'' - 3y' + 2y = 0$ យើងនឹងបង្ហាញពីករណីដូចខាងក្រោម៖

- បើ $f(x)$ ជាចម្លើយនៃ (E) នោះអនុគមន៍ $f(x) - g(x)$ ជាចម្លើយនៃ (E') : $y'' - 3y' + 2y = 0$

ដោយ $f(x)$ ជាចម្លើយនៃ (E) នោះ $f''(x) - 3f'(x) + 2f(x) = 2x^2 - 6x + 2$ (1)

ហើយ $g(x)$ ក៏ជាចម្លើយនៃ (E) គឺ $g''(x) - 3g'(x) + 2g(x) = 2x^2 - 6x + 2$ (2)

យក (1) - (2) យើងបាន $[f''(x) - 3f'(x) + 2f(x)] - [g''(x) - 3g'(x) + 2g(x)] = 0$

$$[f''(x) - g''(x)] - 3[f'(x) - g'(x)] + 2[f(x) - g(x)] = 0$$

$$[f(x) - g(x)]'' - 3[f(x) - g(x)]' + 2[f(x) - g(x)] = 0 \quad (E')$$

នាំឱ្យ $f(x) - g(x)$ ជាចម្លើយនៃសមីការ (E') : $y'' - 3y' + 2y = 0$

- បើ $f(x) - g(x)$ ជាចម្លើយនៃសមីការ (E') : $y'' - 3y' + 2y = 0$ នោះ $f(x)$ ជាចម្លើយនៃ (E)

ដោយ $f(x) - g(x)$ ជាចម្លើយនៃ (E') : $y'' - 3y' + 2y = 0$ យើងបាន៖

$$[f(x) - g(x)]'' - 3[f(x) - g(x)]' + 2[f(x) - g(x)] = 0$$

$$f''(x) - g''(x) - 3f'(x) + 3g'(x) + 2f(x) - 2g(x) = 0$$

$$[f''(x) - 3f'(x) + 2f(x)] - \underbrace{[g''(x) - 3g'(x) + 2g(x)]}_{2x^2 - 6x + 2} = 0$$

$$[f''(x) - 3f'(x) + 2f(x)] - (2x^2 - 6x + 2) = 0$$

$$f''(x) - 3f'(x) + 2f(x) = 2x^2 - 6x + 2 \quad (E)$$

នាំឱ្យ $f(x)$ ជាចម្លើយនៃសមីការ (E) : $y'' - 3y' + 2y = 2x^2 - 6x + 2$

ដូចនេះ: $\boxed{\text{អនុគមន៍ } f(x) \text{ ជាចម្លើយនៃ (E) លុះត្រាតែអនុគមន៍ } f(x) - g(x) \text{ ជាចម្លើយនៃ (E') : } y'' - 3y' + 2y = 0}$

គ) ដោះស្រាយសមីការ (E') រួចទាញរកចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E)

(E') : $y'' - 3y' + 2y = 0$ មានសមីការសម្គាល់ $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0 \implies \lambda_1 = 1 ; \lambda_2 = 2 \quad [\because a + b + c = 0]$

នោះចម្លើយនៃ (E') គឺ $y = Ae^{\lambda_1 x} + Be^{\lambda_2 x} = Ae^x + Be^{2x}$ ដែល $A, B \in \mathbb{R}$

ហើយ $g(x) = x^2$ ជាចម្លើយមួយនៃ (E) : $y'' - 3y' + 2y = 2x^2 - 6x + 2$

នាំឱ្យចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E) គឺ $y = Ae^x + Be^{2x} + x^2$ ដែល $A, B \in \mathbb{R}$

ដូចនេះ: $\boxed{\text{ចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E) គឺ } y = Ae^x + Be^{2x} + x^2 \text{ ដែល } A, B \in \mathbb{R}}$

- V ក) រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់ (d) ដែលកាត់ចំណុច S ហើយស្របនឹង $\vec{u}$
 បន្ទាត់ (d) កាត់តាមចំណុច $S(0, 0, 3)$ និងមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{u} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k} = (1, 1, 1)$

$$\text{មានសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រ} \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t + 3 \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{\text{សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់ (d) : } \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t + 3 \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$$

- ខ) រកទំនាក់ទំនងរវាង a, b, c ដើម្បីឱ្យ $\overrightarrow{SM}$ អរតូកូណាល់នឹង $\vec{u}$
 យើងមាន $M(a, b, c)$ នោះ $\overrightarrow{SM} = (a, b, c - 3)$
 ដើម្បីឱ្យ $\overrightarrow{SM}$ អរតូកូណាល់នឹង $\vec{u}$ គឺ $\overrightarrow{SM} \perp \vec{u}$ កាលណា៖

$$\overrightarrow{SM} \cdot \vec{u} = 0$$

$$(a, b, c - 3) \cdot (1, 1, 1) = 0$$

$$a(1) + b(1) + (c - 3)(1) = 0$$

$$a + b + c - 3 = 0$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{\text{ទំនាក់ទំនងរវាង } a, b, c \text{ គឺ } a + b + c - 3 = 0}$$

- គ) បង្ហាញថា $\triangle ABS$ ជាត្រីកោណសម័ង្ស

យើងមានចំណុច $A(3, 0, 0)$ និង $B(0, 3, 0)$ ហើយ $S(0, 0, 3)$

$$\text{យើងបាន } \overrightarrow{AB} = (-3, 3, 0) \Rightarrow AB = \sqrt{(-3)^2 + 3^2 + 0^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

$$\overrightarrow{SA} = (3, 0, -3) \Rightarrow AS = \sqrt{3^2 + 0^2 + (-3)^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

$$\overrightarrow{SB} = (0, 3, -3) \Rightarrow BS = \sqrt{0^2 + 3^2 + (-3)^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

$$\text{នោះ } AB = AS = BS = 3\sqrt{2} \Rightarrow \triangle ABS \text{ ជាត្រីកោណសម័ង្ស}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{\triangle ABS \text{ ជាត្រីកោណសម័ង្ស}}$$

- ឃ) គណនា $\overrightarrow{SA} \times \overrightarrow{SB}$ រួចទាញរកផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ SAB

$$\text{យើងបាន } \overrightarrow{SA} \times \overrightarrow{SB} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 0 & -3 \\ 0 & 3 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -3 \\ 3 & -3 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 3 & -3 \\ 0 & -3 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} \vec{k} = 9\vec{i} + 9\vec{j} + 9\vec{k}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{\overrightarrow{SA} \times \overrightarrow{SB} = 9\vec{i} + 9\vec{j} + 9\vec{k}}$$

$$\text{តាមរូបមន្ត } S = \frac{1}{2} |\overrightarrow{SA} \times \overrightarrow{SB}| = \frac{1}{2} \sqrt{9^2 + 9^2 + 9^2} = \frac{1}{2} \times 9\sqrt{3} = \frac{9\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \boxed{S = \frac{9\sqrt{3}}{2} \text{ ឯកតាផ្ទៃ}}$$

- VI ១) គណនា $f'(x)$ គណនា $f(1)$ រួចទាញរកសញ្ញានៃ $f(x)$

យើងមាន $f(x) = -x^2 + 1 - \ln x$ កំណត់ចំពោះ $x > 0$

$$\text{យើងបាន } f'(x) = (-x^2 + 1 - \ln x)'$$

$$= -2x - \frac{1}{x}$$

$$= \frac{-2x^2 - 1}{x}$$

$$= -\frac{2x^2 + 1}{x}$$

$$\text{ហើយ } f(1) = -1^2 + 1 - \ln 1 = 0$$

ដូចនេះ: $f'(x) = -\frac{2x^2+1}{x}$ និង $f(1) = 0$

ដោយគ្រប់ $x > 0$ នោះ: $\frac{2x^2+1}{x} > 0 \implies -\frac{2x^2+1}{x} < 0 \implies f'(x) < 0$

យើងបានតារាងអថេរភាព f ដូចខាងក្រោម៖

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		0	
$f(x)$		0	

តាមតារាងខាងលើឃើញថា៖

- $f(x) > 0$ ពេល $x \in (0, 1)$
- $f(x) < 0$ ពេល $x \in (1, +\infty)$

២) អនុគមន៍ g កំណត់លើ $(0, +\infty)$ ដោយ $g(x) = -x + 1 + \frac{\ln x}{x}$ និងមានក្រាប (C)

ក) គណនា $g'(x)$ រួចបង្ហាញថា $g'(x)$ មានសញ្ញាដូច $f(x)$

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } g'(x) &= \left(-x + 1 + \frac{\ln x}{x} \right)' \\ &= -1 + \frac{(\ln x)'x - \ln x(x)'}{x^2} \\ &= -1 + \frac{1 - \ln x}{x^2} \\ &= \frac{-x^2 + 1 - \ln x}{x^2} \end{aligned}$$

ដោយ $x^2 > 0$ នោះ: $g'(x)$ មានសញ្ញាដូច $-x^2 + 1 - \ln x = f(x)$

ដូចនេះ: $g'(x) = \frac{-x^2 + 1 - \ln x}{x^2}$ និង $g'(x)$ មានសញ្ញាដូច $f(x)$

ខ) គណនា $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$ និង $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ រួចសង្កេតតាមអថេរភាពនៃ g

$$\begin{aligned} \text{យើងបាន } \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-x + 1 + \frac{\ln x}{x} \right) \\ &= -0 + 1 + (-\infty) \quad \left[\because \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty \right] \\ &= -\infty \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{និង } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-x + 1 + \frac{\ln x}{x} \right) \\ &= -(+\infty) + 1 + 0 \quad \left[\because \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \right] \\ &= -\infty \end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty$ និង $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$

ដោយ $g'(x)$ មានសញ្ញាដូច $f(x)$ យើងបាន៖

- $g'(x) = 0$ ពេល $x = 1$
- $g'(x) > 0$ ពេល $x \in (0, 1)$
- $g'(x) < 0$ ពេល $x \in (1, +\infty)$

ហើយ $g(1) = -1 + 1 + \frac{\ln 1}{1} = 0$

តាមអថេរភាពនៃ g

x	0	1	$+\infty$	
$g'(x)$		$+$	0	$-$
$g(x)$		$-\infty$	0	$-\infty$

គ) រកសមីការអាស៊ីមតូតទ្រេត (d) នៃ (C) រួចសិក្សាទីតាំងធៀបរបស់វា

$$\begin{aligned}\text{យើងមាន } \lim_{x \rightarrow +\infty} (y_C - y_d) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[-x + 1 + \frac{\ln x}{x} - (-x + 1) \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} \\ &= 0\end{aligned}$$

នោះបន្ទាត់ (d) : $y = -x + 1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C)

ដូចនេះ បន្ទាត់ (d) : $y = -x + 1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C)


យើងមាន $y_C - y_d = \frac{\ln x}{x}$ ចំពោះគ្រប់ $x > 0 \Rightarrow y_C - y_d$ មានសញ្ញាដូច $\ln x$

- ពេល $x = 1 \Rightarrow \ln x = 0 \Rightarrow y_C - y_d = 0$
- ពេល $x \in (0, 1) \Rightarrow \ln x < 0 \Rightarrow y_C - y_d < 0$
- ពេល $x \in (1, +\infty) \Rightarrow \ln x > 0 \Rightarrow y_C - y_d > 0$

ដូចនេះ (C) ប្រសព្វ (d) ត្រង់ $x = 1$; (C) នៅក្រោម (d) ពេល $x \in (0, 1)$ និង (C) នៅលើ (d) ពេល $x \in (1, +\infty)$

ឃ) សង់ក្រាប (C) និងបន្ទាត់ (d) ក្នុងតម្រុយ $(O, \vec{i}, \vec{j})$ តែមួយ

$$\text{បន្ទាត់ (d) : } y = -x + 1 \quad \begin{array}{c|cc} x & 0 & 1 \\ \hline y & 1 & 0 \end{array}$$



យើងមានសមីការអ៊ីពែបូល $-x^2 + 4y^2 - 2x - 16y + 11 = 0$ យើងបាន៖

$$\begin{aligned} 4(y^2 - 4y) - (x^2 + 2x) &= -11 \\ 4(y^2 - 2y \times 2 + 2^2 - 2^2) - (x^2 + 2x \times 1 + 1^2 - 1^2) &= -11 \\ 4[(y - 2)^2 - 4] - [(x + 1)^2 - 1] &= -11 \\ 4(y - 2)^2 - 16 - (x + 1)^2 + 1 &= -11 \\ 4(y - 2)^2 - (x + 1)^2 &= 4 \\ \frac{(y - 2)^2}{1} - \frac{(x + 1)^2}{4} &= 1 \quad \left[\because \text{ចែកអង្គទាំងពីរនឹង 4} \right] \end{aligned}$$

ជាសមីការស្តង់ដារអ៊ីពែបូលរាង $\frac{(y - k)^2}{a^2} - \frac{(x - h)^2}{b^2} = 1$ យើងទាញបាន $\begin{cases} h = -1 ; k = 2 \\ a = 1 ; b = 2 \end{cases}$

ហើយ $c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$

យើងបាន កូអរដោនេផ្ចិត $I(h, k) = (-1, 2)$

កូអរដោនេកំពូល $V_{1,2}(h, k \pm a) = (-1, 1); (-1, 3)$

កូអរដោនេកំណុំ $F_{1,2}(h, k \pm c) = (-1, 2 - \sqrt{5}); (-1, 2 + \sqrt{5})$

អាស៊ីមតូតទ្រេត $y_1 = k - \frac{a}{b}(x - h) = 2 - \frac{1}{2}(x + 1) = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$

$y_2 = k + \frac{a}{b}(x - h) = 2 + \frac{1}{2}(x + 1) = \frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$

ខ សង់អ៊ីពែបូល

