

ប្រធាន

- I. តើនៅក្នុងស្បែកមានស្រទាប់អ្វីខ្លះ ? តើស្រទាប់នីមួយៗមាននាទីដូចម្តេចខ្លះ ?
- II. ហេតុអ្វីបានជាគេនិយាយថា អង់ស៊ីមជាប្រូតេអ៊ីនដែលមានសកម្មភាពខ្លាំង ?
- III. ចូរប្រៀបធៀប ប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វឆ្អឹងកង និង ប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វឥតឆ្អឹងកង។
- IV. តើវិស្វកម្មសេនេទិចជួយដល់រុក្ខជាតិដូចម្តេចខ្លះ ?
- V. ក្រោយពេលដំឡើងទ្វេរហើយ ហេតុអ្វីបានជាម៉ូលេគុល ADN កូនទាំងពីរដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹងម៉ូលេគុល ADN មេ ?
- VI. ម៉ូលេគុល ADN មួយមាននុយក្លេអូទីតប្រភេទ $C = 180\,000$ ដែលមានសមាមាត្រ 30% នៃនុយក្លេអូទីតទាំងអស់។
១. រកភាគរយនៃនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗ ។
២. រកប្រវែងម៉ូលេគុល ADN គិតជាមីក្រូម៉ែត្រ (μm) ។
៣. រកចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុបរបស់ម៉ូលេគុល ADN ។
- VII. សែនមួយមានប្រវែង 680nm ។ សែននេះកំណត់សំយោគ ARN_m មួយ ដែលមានទំនាក់ទំនងរវាងនុយក្លេអូទីត $2A - 3C = 3G - 2U$
១. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់សែននេះ។
២. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ ARN_m បើគេដឹងថាក្នុងម៉ូលេគុល ARN_m នេះមានផលដករវាង A និង $U = 600$ ហើយផលដករវាង C និង $G = 400$ ។