

ប្រធាន

- I. តើគេហៅឈ្មោះរបស់អង់ស៊ីមបានត្រឹមត្រូវដោយផ្អែកលើកត្តាអ្វីខ្លះ?
- II. តើពោតជារុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូន ឬឌីកូទីលេដូន? ហេតុអ្វី?
- III. តើមានបាតុភូតអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលរីបូសូមលោតដល់កូដុងស្តុប?
- IV. តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលបណ្តាលឲ្យកើតការវាស់ប្រភេទថ្មី? ចូររៀបរាប់។
- V. ប្រៀបធៀបក្រពេញអិចសូត្រីន និងក្រពេញអង់ដូត្រីន។
- VI. ក. ដូចម្តេចដែលហៅថាអាំងត្យូប្រសាទ?
ខ. ហេតុអ្វីបានជាពេលដែលមានរូសដោយវត្ថុមុតស្រួចធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់?
- VII. ម៉ូលេគុល ADN មួយមានសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុប 16×10^4 ។ នុយក្លេអូទីតប្រភេទ C ច្រើនជាង
នុយក្លេអូទីតប្រភេទ A ចំនួនពីរដង។
ក. រកចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ ADN។
ខ. ពេលម៉ូលេគុល ADN ស្វ័យជំឡើងទ្វេដង តើត្រូវការនុយក្លេអូទីតសេរីនីមួយៗចំនួនប៉ុន្មាន?
- VIII. ម៉ូលេគុល ARN នាំសារមួយមានសមាមាត្រជាភាគរយនៃនុយក្លេអូទីត $U = 20\%$ $C = 20\%$
 $A = 28\%$ ។
ក. រកសមាមាត្រជាភាគរយនៃនុយក្លេអូទីតនីមួយៗនៃអង្គត់ ADN ដែលបានសំយោគម៉ូលេគុល ARN នាំសារខាងលើ។
ខ. តើអង្គត់ ADN នេះមានប្រវែងប៉ុន្មានណាណូម៉ែត (nm) បើ $U = 1800$ ។