

ប្រធាន

- I. ដូចម្តេចហៅថាដំណើរលម្អងសិប្បនិម្មិត? ហេតុអ្វីបានជាគេធ្វើ ដំណើរលម្អងសិប្បនិម្មិត?
- II. ចូរពន្យល់ពី:
 - ក. ដំណើរឆ្លងកាត់ស៊ីណាប់របស់អាំងត្រូប្រសាទ។
 - ខ. ការកើតនៃពុម្ពក្រៅ?
- III. ចូរពណ៌នាពីលក្ខណៈរបស់អង់ស៊ីម?
- IV. តើអម្រូនដែលបញ្ចេញដោយកោសិកា (B) និងកោសិកាអា ល់ហ្វា (a) របស់លំពែងមានសកម្មភាពដូចម្តេចខ្លះ?
- V. ចូរប្រៀបធៀប ADN និងប្រូតេអ៊ីន។
- VI. ម៉ូលេគុល ADN មួយមានចំនួនរង្វង់ 10^5 ។ ដោយការនៃផលសងនុយក្លេអូទីត A និងនុយក្លេអូទីត C ស្មើ 4×10^{10} ។
 - ក. រកចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ ADN ។
 - ខ. តើ ADN នេះស្វ័យជំឡើងទ្វេប៉ុន្មានលើក? បើក្រោយស្វ័យ ជំឡើងទ្វេរួច ADN មានកូននុយក្លេអូទីត A ស្មើ 48×10^5 ។
- VII. ប្រាក់ម្ខាងនៃសែនមួយមាននុយក្លេអូទីត $C = \frac{1}{2}$ និង $A = \frac{1}{3}$ និង $T = \frac{1}{6}$ ។ ARNm មួយចម្លងក្រមចេញពីប្រាក់ម្ខាងនៃសែននេះមានរីបូនុយក្លេអូទីត 750 ។
 - ក. រកចំនួនរីបូនុយក្លេអូទីតនៃរាល់ប្រភេទរបស់ ARNm នេះ?
 - ខ. រកចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែននៃសែនខាងលើ

កំណែវិវិទ្យា

- I. + ដំណើរលម្អងសិប្បនិម្មិត ជាដំណើរលម្អងដែលមនុស្សយក គ្រាប់លម្អងពីរុក្ខជាតិមួយទៅដាក់ លើស្ទិចម៉ាតនៃរុក្ខជាតិមួយទៀត។ (៣ (ឬជាដំណើរលម្អងកាត់ដែលត្រូវបញ្ជូនដោយមនុស្ស) +មនុស្សធ្វើដំណើរលម្អងសិប្បនិម្មិតដើម្បីបង្កាត់រុក្ខជាតិមានលក្ខណៈពិសេសៗដែលគេចង់បាន។
- II. ពន្យល់ ៖
- ក. ដំណើរឆ្លងកាត់ស៊ីណាប់របស់អាំងត្យូប្រសាទនៅចុងអាក់សូនមានថង់ តូចៗជាច្រើនដែលផ្ទុកសារធាតុ (ណឺរ៉ូនបញ្ជូនសារ ឬណឺរ៉ូបញ្ជូនសារ ឬពុះតូចៗ) ។ ពេលអាំងត្យូប្រសាទទៅដល់ចុងអាក់សូន ថង់តូចៗទាំងនោះផ្ទុះ បែកហើយបញ្ចេញជាប្រូបញ្ជូនសារសាយឆ្លងកាត់ស៊ីណាប់។ បន្ទាប់មកណឺរ៉ូបញ្ជូនសារនេះ បង្កើតអាំងត្យូប្រសាទថ្មីទៅក្នុងដង់ឌ្រីករបស់ណឺរ៉ូនបន្ទាប់ រួចធ្វើដំណើរតាមគួរកោសិកា និងចុះតាមអាក់សូនរហូតដល់ចុងអាក់សូន។
- ខ. ការកកើតពុម្ពក្រៅ កកើតឡើងនៅពេលសារពាង្គកាយកប់ក្នុងកំទេច កំណត្រូវរលាយបន្តិចម្តងៗហើយបន្សល់ទុកនូវពុម្ពទទេដែលមានទម្រង់ដូចសារពាង្គកាយ។ ពុម្ពទទេនេះ ជាពុម្ពក្រៅ។ (ឬនៅពេលការវះកាត់បានដាច់ ទៅបានធ្លាក់ទៅបាតបឹងឬបាតសមុទ្រទឹកហូរនាំសិលាកម្ទេចកំណត្របដណ្តប់លើសាកសពនោះ។ សាកសពរលួយបែកធាតុហើយបន្សល់ទុកនៅ តែរូបរាងដែលបង្ហាញពីរូបរាងរបស់ការវះនោះ។ នេះជាពុម្ពក្រៅ។)
- III. ពណ៌នាពីលក្ខណៈរបស់អង់ស៊ីម៖
- អង់ស៊ីមទាំងអស់ជាប្រូតេអ៊ីនមានអំពើជាយថាប្រភេទ។
 - អង់ស៊ីមមានសកម្មភាពខ្លាំង។ គឺអង់ស៊ីមមួយចំនួនតូចអាចបង្កើតល្បឿន ប្រតិកម្មគីមីបានមួយចំនួនធំ។
 - អង់ស៊ីមប្រែប្រួលទម្រង់និងនាទីទៅតាមសីតុណ្ហភាព ឥទ្ធិពល pH និង កំហាប់ស៊ុបស្តាត។
 - អង់ស៊ីមជាកាតាលីករដែលមានប្រតិកម្មបញ្ជ្រាស់ទៅវិញទៅមក។
 - អង់ស៊ីមខ្លះត្រូវការកូអង់ស៊ីម ។
- IV. + សកម្មភាពអរម៉ូនដែលបញ្ចេញដោយកោសិកាបេតា (B) នៅពេល កម្រិតខ្ពស់កូសក្នុងឈាមឡើងខ្ពស់ កោសិកា (B) របស់លំពែងត្រូវបាន ភ្លេចរួចបញ្ចេញអរម៉ូនអាំងស៊ុយលីនចូលទៅក្នុង

ចរន្តឈាមទៅក្លោចកោសិកាគោលដៅមានដូចជាថ្លើម កោសិកាសាច់ដុំជាប់ផ្ចឹង និងជាលិកា ខ្លាញ់ឲ្យចាប់យកគ្នាភ្ជួរភ្ជួរស្របប្រាស់ជាប្រភពថាមពលសកម្មភាពផ្សេងៗ។ គ្នាភ្ជួរភ្ជួរនៅសល់ បំប្លែងជាខ្លីកូសែនស្តុកទុកក្នុងថ្លើមនិងសាច់ដុំជាប់ផ្ចឹង។ ម្យ៉ាងទៀតគ្នាភ្ជួរភ្ជួរត្រូវបំប្លែងជាខ្លាញ់ ហើយស្តុកទុកក្នុងជាលិកាខ្លាញ់។

+ សកម្មភាពអម្ពូនដែលបញ្ចេញដោយកោសិកាអាល់ហ្វា (a)។ នៅពេលកំហាប់គ្នាភ្ជួរភ្ជួរក្នុង ឈាមធ្លាក់ចុះក្រោមកម្រិតកំណត់ កោសិកា(a) របស់លំពែងត្រូវបានភ្លេចឲ្យបញ្ចេញអម្ពូន គ្នាភ្ជួរភ្ជួរទៅក្លោចកោសិកាគោលដៅឲ្យផលិតគ្នាភ្ជួរភ្ជួរ។ ក្នុងថ្លើមគ្នាភ្ជួរភ្ជួរក្នុងបំប្លែងខ្លីកូសែន ឲ្យទៅជាគ្នាភ្ជួរភ្ជួរសាយចូលទៅក្នុងចរន្តឈាម។ គ្នាភ្ជួរភ្ជួរធ្វើឲ្យអាស៊ីតអាមីននិងអាស៊ីត ខ្លាញ់បំប្លែងជាគ្នាភ្ជួរភ្ជួរវិញ។

V. ប្រៀបធៀប AND និងប្រូតេអ៊ីន

+ លក្ខណៈដូចៗ៖

- ជាម៉ាក្រូម៉ូលេគុល
- ម៉ូលេគុលនីមួយៗជាច្រវាក់ប៉ូលីមែដែលកើតពីឯកតានៃធាតុបង្ក (ម៉ូណូមែ)
- ម៉ូលេគុលនីមួយៗមានតំណលំដាប់នុយក្លេអូទីតឬតំណលំដាប់អាស៊ីតអាមីននិងអាស៊ីត ខ្លាញ់

+ លក្ខណៈខុស៖

AND	ប្រូតេអ៊ីន
- ម៉ូណូមែគឺនុយក្លេអូទីត	- ម៉ូណូមែគឺអាស៊ីតអាមីន
- កើតពីច្រវាក់នុយ.ពីខ្សែ	- កើតពីច្រវាក់អា.អា.ទោល
- នុយ.៣កំណត់អា.អា.១	- អា.អា.១កំណត់ដោយនុយ.៣
- តំណលំដាប់នុយ.កំណត់នូវតំណ លំដាប់អា.អា	- តំណលំដាប់អា.អា.កំណត់ នុយ,
- បង្កពីនុយក្លេអូទីត៤ប្រភេទ	- បង្កអាស៊ីតអាមីន២០ប្រភេទ
(*អា.អា គឺអាស៊ីតអាមីន)	

VI. ក. រកចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ AND

បម្រាប់ ADN មាន 10^5 ផ្ទាំង

$$(A - C)^2 = 4 \times 10^{10}$$

$$A_{\text{កូន}} = 48 \times 10^5 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

ដោយ១ផ្ទាំងជុំ = ២០នុយក្លេអូទីត

$$M = \text{ចំនួនផ្ទាំង} \times 20$$

$$= 10^5 \times 20 = 2 \times 10^6 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

$$\text{គោលការណ៍បាសបំពេញគ្នា } A - T, C - G \Rightarrow A = T, C = G$$

$$M = 2A + 2C = 2(A + C)$$

$$\Rightarrow A + C = \frac{M}{2} = \frac{2 \cdot 10^6}{2} = 10^6 \quad (1)$$

$$\text{ដោយ } (A - C)^2 = 4 \times 10^{10}$$

$$\Rightarrow A - C = 2 \times 10^5 \quad (2)$$

តាម (1) និង (2) យើងបាន

$$\begin{cases} A + C = 10 \times 10^5 \\ A - C = 2 \times 10^5 \end{cases}$$

$$2A = 12 \times 10^5$$

$$A = 6 \times 10^5$$

$$(1) \Rightarrow A + C = 10 \times 10^5$$

$$\Rightarrow C = 10 \times 10^5 - 6 \times 10^5 = 4 \times 10^5$$

ដូចនេះ $A = T = 6 \times 10^5$ នុយក្លេអូទីត

$$C = G = 4 \times 10^5 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

ខ. រកចំនួនដងស្វ័យជំឡើងទ្វេ AND

បម្រាប់ $A_{កូន} = 48 \times 10^5$ នុយក្លេអូទីត

ANDស្វ័យជំឡើងទ្វេ ១លើកបាន ADN កូន 2^1

ADN ស្វ័យជំឡើងទ្វេ ២លើកបាន ADN កូន 2^2

ADN ស្វ័យជំឡើងទ្វេ ៣លើកបាន ADN កូន 2^3

.....

ADN ស្វ័យជំឡើងទ្វេ n លើកបាន ADN កូន 2^n

$$A_{កូន} = A \times 2^n \Rightarrow 2^n = \frac{A_{កូន}}{A} = \frac{48 \times 10^5}{6 \times 10^5}$$

$$2^n = 8 = 2^3 \Rightarrow n = 3$$

ដូចនេះ ADN នេះស្វ័យជំឡើងទ្វេ ៣ដង

VII. ក. រកចំនួនវីបូនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ ARNm

$$\text{បម្រាប់ } C_1 = \frac{1}{2} \text{ នៃ } \frac{M}{2} = \frac{1}{2} \times \frac{M}{2}$$

$$A_1 = \frac{1}{3} \text{ នៃ } \frac{M}{2} = \frac{1}{3} \times \frac{M}{2}$$

$$T_1 = \frac{1}{6} \text{ នៃ } \frac{M}{2} = \frac{1}{6} \times \frac{M}{2}$$

$$m = 750 \text{ វីបូនុយក្លេអូទីត}$$

ដោយម៉ូលេគុល ARN_m សំយោគចេញពីប្រាក់ម្ខាងនៃសែន

$$m = \frac{M}{2} = 750 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

$$\Rightarrow A_1 = \frac{1}{3} \times \frac{M}{2} = \frac{1}{3} \times 750 = 250 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

$$\Rightarrow T_1 = \frac{1}{6} \times \frac{M}{2} = \frac{1}{6} \times 750 = 125 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

$$\Rightarrow C_1 = \frac{1}{2} \times \frac{M}{2} = \frac{1}{2} \times 750 = 375 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

$$\text{ដោយ } \frac{M}{2} = A_1 + T_1 + C_1 + G_1$$

$$\Rightarrow G_1 = \frac{M}{2} - (A_1 + T_1 + C_1)$$

$$= 750 - (250 + 125 + 375) = 0$$

ដោយ ARNm សំយោគចេញពីប្រភេទទី១នៃសែន

តាមគោលការណ៍បំពេញបាន ឬចម្លងក្រុម $A - T, C - G \Rightarrow A = T, C = G$

$$A_1 = U_{ARNm} = 250 \text{ រីបូនុយក្លេអូទីត}$$

$$T_1 = A_{ARNm} = 125 \text{ រីបូនុយក្លេអូទីត}$$

$$C_1 = G_{ARNm} = 375 \text{ រីបូនុយក្លេអូទីត}$$

$$\text{ដូចនេះ: } A_1 = U_{ARNm} = 250 \text{ រីបូនុយក្លេអូទីត}$$

$$T_1 = A_{ARNm} = 125 \text{ រីបូនុយក្លេអូទីត}$$

$$C_1 = G_{ARNm} = 375 \text{ រីបូនុយក្លេអូទីត}$$

ខ. រកចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនរបស់សែន

តាមគោលការណ៍ចម្លងក្រុម

$$A_{សែន} = T_{សែន} = (A + U)_{ARNm} = 125 + 250 = 375 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

$$C_{សែន} = G_{សែន} = (C + G)_{ARNm} = 0 + 375 = 375 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

ដោយ A ភ្ជាប់ T ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន ២

C ភ្ជាប់ G ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន ៣

$$\Rightarrow L_H = 2A + 3C = 2(375) + 3(375) = 1875 \text{ សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន}$$

$$\text{ដូចនេះ: } L_H = 1875 \text{ សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន}$$