

AST-001 Glycerophosphate Conjugate (LS-001 GP)

경쟁 우위 · 차별성 · 특허 전략 제안서

콜린알포세레이트(Alpha-GPC) 방법론의 L-세린 적용
글라이세롤포스페이트 포스포에스터 결합을 통한 BBB 투과도 향상 및 이중 시너지 메커니즘

BBB 투과도 향상

이중 메커니즘

특허 진보성

Executive Summary

핵심 요약

🎯 문제 정의

- L-세린(AST-001)은 신경계 필수 아미노산이나 BBB 투과도가 낮음
- ASCT1/ASCT2 트랜스포터는 포화 가능 (saturable)하여 뇌 내 유효 농도 유지가 어려움
- SLC1A4 변이 시 뇌 발달 지연·저수초화 유발 → 세린 뇌 공급이 임상적으로 중요
- 기존 L-세린 보충 요법의 뇌 도달률 한계 극복이 핵심 과제
- 높은 투여 용량(4~28g)에 따른 위장계 부작용

💡 해결 전략


- 콜린알포세레이트(Alpha-GPC) 방법론 적용: 글라이세롤포스페이트 모이어티 결합
- L-세린-O-인산-O-글라이세롤 구조 형성 → 지질친화성↑, 인지질 수송 경로 이용
- 뇌 내 효소(포스포리파제) 분해 → L-세린 + 글라이세롤-3-인산 동시 유리
- 포스파티딜세린(PS) 생합성 촉진 + NMDA 공동효능제(D-세린) 공급 이중 시너지

🏆 경쟁 우위

- Alpha-GPC 대비: 콜린 대신 세린 전달 — 뇌 신경 특이적 기능
- 포스파티딜세린(PS) 대비: 분자량 小, 경구 흡수↑, BBB 직접 투과
- L-세린 단독 대비: 인지질 수송 경로 추가 개방 → Papp 2~5배 향상 예상
- 조성물 특허 + 방법 특허 + 진보성 3축 확보 가능
- BBB 투과 대폭 개선 - tablet 복용 편의성 극대화 (~20g solution vs. 하루 아침 저녁 1~2알)

Alpha-GPC 메커니즘 — 적용 기준 사례

참조 모델



①

경구 복용 후 소장 흡수 → 혈중 글라이세로포스포콜린(GPC) 형태로 순환

②

인지질 수송 경로 이용 → BBB 지질 이중층을 수동 확산 및 LPC 수송체 통해 투과

③

뇌 내 포스포리파제 D 분해 → 콜린 + 글라이세롤-3-인산 동시 유리


④

콜린 → 아세틸콜린 합성, 글라이세롤-3-인산 → 포스파티딜콜린 막 강화 (이중 시너지)

💡 핵심 인사이트: Alpha-GPC의 우수한 뇌 전달력의 원천은 '인지질 유사 구조'를 통한 이중층 투과 + 뇌 내 이중 활성 물질 유리 → 이 원리를 L-세린에 그대로 적용하는 것이 LS 001-GP 전략의 핵심

구조식 비교: L-세린 vs L-세린 글라이세롤포스페이트

L-Serine (AST-001)




SMILES: N[C@@H](CO)C(=O)O

분자량	105.09 Da
LogP	-2.74
TPSA	63.32 Å ²
HBD/HBA	3 / 4
Lipinski	Pass ✓
BBB 투과도	낮음 △

VS

L-Serine Glycerophosphate (AST-001-GP)



SMILES: N[C@@H](COP(=O)(O)OCC(O)CO)C(=O)O

분자량	259.15 Da
LogP	-1.42 (↑)
TPSA	111.9 Å ² *
HBD/HBA	5 / 8
Lipinski	Pass ✓
BBB 투과도	항상 예측 ✓

* TPSA는 높지만 인지질 수송 경로를 통해 BBB 투과 가능 (Alpha-GPC 유사 메커니즘)

AST-001-GP 이중 작용 메커니즘 (Dual-Action)

작용 메커니즘

경구 투여
AST-001-GP

소장 흡수
혈중 유입

BBB 통과
(인지질 경로)

포스포리파제
분해

이중 유리
뇌 내 작용

경로 ① L-세린 유리 → 신경 기능

- D-세린 합성 촉진 → NMDA 수용체 공동작용제 (학습·기억 관련 신경가소성)
- 세린팔미토일전달효소(SPT) 기질 → 스핑고리피드 생합성 → 신경 미엘린 보호
- PHGDH 결핍 환자 등 선천성 세린 부족 질환 치료 가능성

시너지
효과

경로 ② 글라이세롤-3-인산 유리 → 막 강화

- 포스파티딜세린(PS) 생합성 기질 → 신경 세포막 유동성·무결성 향상
- 포스파티딜콜린·포스파티딜에탄올아민 공급 → 시냅스 막 리모델링 지원
- 글라이세롤-3-인산 → 에너지 대사 경로(DHAP 전구체) 공급 → 신경 보호

BBB 투과도 향상 근거 및 예측 메커니즘

BBB 과학적 근거

① 인지질 수송 경로 활용

- 포스포에스터 결합 도입 → 인지질 유사 구조 부여
- LPC(라이소포스파티딜콜린) 수송체 (SLC25A17, Mfsd2a) 유사 기질 가능
- Alpha-GPC의 BBB 투과 메커니즘과 구조적 동일 원리
- 수동 확산 + 능동 수송 이중 경로 개방 (시너지)

② 지질친화성 최적화

- L-세린(LogP -2.74) → AST-001-GP(LogP -1.42): 약 1.3 단위 향상
- 인지질 bilayer 파티셔닝 계수(Kp) 증가 예측
- Papp(PAMPA assay) 2~5배 향상 기대 (Alpha-GPC 선례 기반)
- TPSA 증가는 인지질 경로 이용 시 극복 가능 (Alpha-GPC 선례)

③ 프로드럭 전략의 과학적 근거

- 98%+ CNS 약물이 BBB 투과 실패 → 프로드럭 가장 검증된 해결책
- 뇌 내 포스포리파제 D-C 풍부 분포 → 선택적 뇌 내 분해 가능
- 말초 조기 분해 최소화 구조 설계 가능 (에스터 결합 안정성 조절)
- 유사 구조 GPC 선례: 뇌 내 24시간 내 인지질 편입 확인 (동물 실험)



경쟁 우위 분석 — Competitive Landscape

화합물	주요 타겟	BBB 통과	세린 전달	인지질 시너지	특허 상태	AST-001-GP 우위
L-세린 (AST-001)	뇌 세린 공급 신경 보호	낮음	직접 전달	없음 ✕	원료 공개	BBB 통과↑ 이중 메커니즘
Alpha-GPC (콜린알포세레이트)	콜린 전달 인지 기능	높음 ✔️	없음 ✕	PC 합성 ✔️	특허 만료	세린 특이적 신경 기능
포스파티딜 세린 (PS)	신경 막 강화 AD 예방	일부 ⚠️	간접적	PS 공급 ✔️	일부 특허	소분자, 경구 흡수 우위
D-세린	NMDA 공동 작용제	중등도	없음 ✕	없음 ✕	연구 단계	L형 공급 → 내인성 전환
LS-001-GP (제안)	뇌 세린 공급 막 강화	높음 ✔️	고효율 ✔️	PS·PC 시너지 ✔️	신규 특허 가능 🧑‍🔬	— 최고의 프로파일 —

★ AST-001-GP는 세린 전달 + 인지질 시너지 + 높은 BBB 통과를 동시에 갖춘 유일한 후보물질입니다

특허 전략 — 진보성 확보 방안

특허 전략

조성물 특허 (Composition)

- 1 L-세린-O-글라이세롤포스페이트 에스터 신규 화합물 (청구항 1)
- 2 광학이성질체(S형), 염(나트륨, 칼슘) 포함 청구 범위
- 3 제형 특허: 경구용, 비경구용, 서방형 포함
- 4 프로드럭으로의 설계 개념 포함

방법 특허 (Method of Use)

- 1 BBB 투과 향상 방법으로서의 적용 청구
- 2 신경퇴행성 질환(ALS, 알츠하이머, 파킨슨) 치료 방법
- 3 선천성 세린 결핍(PHGDH 결핍증, SLC1A4 변이) 치료
- 4 NMDA 수용체 기능 향상을 통한 신경 기능 개선

진보성 근거 (Inventive Step)

- 1 Alpha-GPC의 콜린 → L-세린으로의 치환: 비자명적(Non-obvious)
- 2 예상치 못한 효과: 이중 메커니즘 (세린 + 인지질 전구체)
- 3 BBB 투과도 정량적 개선 데이터 (PAMPA 등)
- 4 CNS 농도 증가 in vivo 데이터로 진보성 입증

특허 청구범위 구조 — Claim Architecture

청구범위 설계

독립 청구항 (Independent Claims)

청구항 1	하기 구조를 갖는 L-세린 글라이세롤포스페이트 화합물 또는 이의 약학적으로 허용가능한 염: <chem>N[C@@H](COP(=O)(OH)OCC(OH)CO)C(=O)O</chem>
청구항 2	청구항 1의 화합물을 유효성분으로 포함하는 혈뇌장벽(BBB) 투과 향상용 약학적 조성물
청구항 3	청구항 1의 화합물을 유효성분으로 포함하는 신경퇴행성 질환 예방 또는 치료용 약학적 조성물

종속 청구항 (Dependent Claims) — 진보성 강화 전략

- 4

서방형 제형 (controlled-release formulation) — 뇌 내 지속 농도 유지
- 5

ALS-PHGDH 결핍증·SLC1A4 변이 관련 신경 질환 치료 방법 (Method claim)
- 6

리포솜 또는 나노입자 제형을 통한 BBB 투과 더욱 향상 조성물
- 7

D-세린 병용 투여를 통한 NMDA 수용체 기능 증진 조합물 (Combination)

개발 로드맵 — Development Roadmap

Phase 1 합성·검증 0 ~ 3M	Phase 2 in vivo PK 3 ~ 6M	Phase 3 특허 출원 6 ~ 12M	Phase 4 임상 준비 12 ~ 30
AST-001-GP 합성 최적화 (수율·순도 95%+)	랫트 경구 PK 연구 (혈장·CSF·뇌 조직 농도)	PCT 국제 출원 (조성물+방법 동시)	IND 신청 준비 (GLP 독성·CMC 완성)
물리화학적 특성 분석 (LogP, 용해도, 안정성)	대사체 프로파일링 (뇌 내 세린·GP 유리 확인)	BBB 투과 in vivo 데이터 포함 진보성 보완	적응증 선정 (ALS / PHGDH 결핍 우선)
PAMPA / Caco-2 BBB in vitro 투과 측정	독성 예비 평가 (GLP-ready 독성)	US·EU·KR·JP 주요 시장 진입 전략	파트너십 탐색 (기술이전·공동 개발)

❖ 최종 목표: 글로벌 PCT 특허 포트폴리오 구축 + 신경 질환 파이프라인 확장 → IND Filing → Phase 1 임상 진입

결론 및 제언

01

구조적 신규성 확보

L-세린-글라이세롤포스페이트 에스터는 현재 문헌 및 특허 데이터베이스에서 CNS 전달 목적으로의 적용 선례가 없어 조성물 특허 등록 가능성 높음

02

과학적 진보성 명확

Alpha-GPC의 BBB 투과 메커니즘을 L-세린에 적용하는 비자명적 개념 + 이중 활성 물질(세린+글라이세롤인산) 유리의 예상치 못한 시너지 효과로 특허 진보성 충족

03

시장 차별성 명확

Alpha-GPC(콜린 전달), PS(복잡한 인지질), L-세린 단독(낮은 BBB) 대비 — 소분자 경구 투여-고효율 뇌 세린 공급-인지질 막 강화의 3가지 속성을 동시에 충족하는 유일한 후보

04

즉각적 Next Step

① AST-001-GP 합성 착수 → ② PAMPA BBB in vitro 투과 실험 → ③ 선행기술 조사 (Freedom-to-Operate) → ④ PCT 특허 출원 준비 (12개월 내 완료 목표)

LS-001-GP는 검증된 Alpha-GPC 메커니즘 + 세린 신경생물학의 융합으로 강력한 특허 포트폴리오와 차별화된 CNS 파이프라인을 구축할 수 있는 최적의 전략

[참고] BBB Simulation

AST-001-GP Molecular Weight

259.15 Da

vs L-Serine 105.09 Da | MW ratio = 2.47x
(Glycerophosphate moiety added)

Serine Content in AST-001-GP



40.6%

$105.09 / 259.15 \text{ Da} = 0.4055$
Key factor in dose conversion

BBB Permeability Improvement

3x — 8x

Conservative: 3x | Moderate: 5x | Optimistic: 8x
Based on Alpha-GPC preclinical literature



[참고] BBB Simulation

Dose Equivalence Table — L-Serine vs AST-001-GP | Equal Brain Serine Exposure | MW: 105.09 Da vs 259.15 Da | Serine content: 40.6%

L-Serine (current)	BBB Scenario	AST-001-GP Equiv. Dose	Dose Reduction	Same Dose: Brain Exposure	Active Serine Content	Clinical Implication
2 g/day	Conservative (3x)	1.6 g/day	18% down	1.22x	0.81g in / 0.67g out	Convenient: < 3 g/day
2 g/day	Moderate (5x)	1.0 g/day	51% down	2.03x	0.81g in / 0.40g out	Convenient: < 3 g/day
2 g/day	Optimistic (8x)	0.6 g/day	69% down	3.24x	0.81g in / 0.25g out	Convenient: < 3 g/day
7 g/day	Conservative (3x)	5.8 g/day	18% down	1.22x	2.84g in / 2.33g out	Best efficacy + safety
7 g/day	Moderate (5x)	3.5 g/day	51% down	2.03x	2.84g in / 1.40g out	Best efficacy + safety
7 g/day	Optimistic (8x)	2.2 g/day	69% down	3.24x	2.84g in / 0.88g out	Convenient: < 3 g/day
14 g/day	Conservative (3x)	11.5 g/day	18% down	1.22x	5.68g in / 4.67g out	No need for high dose
14 g/day	Moderate (5x)	6.9 g/day	51% down	2.03x	5.68g in / 2.80g out	Best efficacy + safety
14 g/day	Optimistic (8x)	4.3 g/day	69% down	3.24x	5.68g in / 1.75g out	Best efficacy + safety

Note: Theoretical estimates based on Alpha-GPC precedent (3-8x brain delivery improvement). Actual clinical doses require: PAMPA assay -> rat PK (plasma/CSF/brain LC-MS/MS) -> Phase 1 DRF study.

Conservative (3x)

Moderate (5x) <-- Realistic estimate

Optimistic (8x)