
0–6 months
6–12 months
1–2 years
2–3 years
Cocaine use disorder · Sema 0.53 0.56 0.64 0.65
Cocaine use disorder · Tirz 0.32 0.53 0.48 0.58
Other stimulant use disorder · Sema 0.52 0.66 0.61 0.81
Other stimulant use disorder · Tirz 0.38 0.43 0.60 0.37
Cannabis use disorder · Sema 0.73 0.88 0.86 0.77
Cannabis use disorder · Tirz 0.64 0.78 0.84 0.69
Opioid use disorder · Sema 0.83 0.88 0.97 0.99
Opioid use disorder · Tirz 0.68 0.69 0.83 0.93
Nicotine dependence · Sema 0.82 0.91 0.97 0.97
Nicotine dependence · Tirz 0.73 0.84 0.97 0.96
Alcohol use disorder · Sema 0.76 0.82 0.92 0.88
Alcohol use disorder · Tirz 0.81 1.02 1.02 0.98
Schizophrenia · Sema 0.70 0.76 0.59 0.74
Schizophrenia · Tirz 0.48 0.51 0.42 0.50
Bipolar disorder · Sema 0.81 0.95 0.84 0.84
Bipolar disorder · Tirz 0.77 0.95 0.75 0.83
Suicidal ideation · Sema 0.58 0.69 0.76 0.86
Suicidal ideation · Tirz 0.48 0.62 0.67 0.55
Suicide attempt · Sema 0.62 0.55 0.76 0.63
Suicide attempt · Tirz 0.37 0.53 0.96 0.31
Major depressive disorder, single episode · Sema 0.90 0.99 0.99 1.11
Major depressive disorder, single episode · Tirz 0.82 0.92 0.92 1.03
Major depressive disorder, recurrent · Sema 0.97 1.01 1.01 1.07
Major depressive disorder, recurrent · Tirz 0.93 0.90 0.90 1.03
Anxiety disorders · Sema 0.95 1.07 1.11 1.11
Anxiety disorders · Tirz 0.98 1.12 1.18 1.25
Forearm fracture (control) · Sema 1.05 0.85 1.03 0.99
Forearm fracture (control) · Tirz 0.97 0.87 0.90 0.93
2.8
2
1.4
1
0.7
0.5
0.4
Ratio of interval incidence (drug/SGLT2i)