



効率とシステムサイズの関係に対する 確率モデルによる考察

先進理工学部物理学科4年
山崎研究室 藤本将太郎



背景



一般化

系のシステムサイズが大きくなると、その特徴量が
単純に比例して大きくはならず、相互作用等によって
それよりも小さくなるような系

アプローチ

- モデルの作成
- 解析的計算、数値シミュレーション
- 特徴量のシステムサイズに対する応答を調べる



Outline

- 背景
- 作成したモデルの説明
- 解析結果
- まとめ
- 展望と課題



アロメトリー則 ($E \sim M^{3/4}$)

- 動物の体のサイズ(質量 M)と、基礎代謝率 E の間の関係
- 代謝率は体重に対して比例関係ではなく、 $3/4$ 乗ほどでスケールされる

ホヤの実験によるシステムサイズと代謝率の関係

- ホヤ: 群体を形成
- 任意に群体の構成個数を変更可能
- 群体サイズと代謝率の間に、アロメトリー則のような関係

アロメトリー則は種の違いや成長による細胞機能自体の変
化によるものではなく、
実際のシステムのサイズによって代謝率が変わっている？

会議やグループワークの参加人数と効率の関係

- 参加人数が増えすぎると意見がまとまらず、効率的な会議にならない



作成したモデルの説明





- \mathbb{R}^d 上の点 x
- x を元とする N 個の集合 $\{X_1, X_2, \dots, X_N\}$
- システムサイズは N
- 時刻 k を1進めることに1つの点 x_k を選択(時刻 K まで)
- 与えられたルールにしたがって、点同士にエッジを結ぶ
⇒ 結ばれた点同士のネットワーク + X をノードとした(有向)ネットワーク



点 x の選択に関する設定の場合分け

1. X_i を選び、次に点 $(x \in [0, 1])$ を一様を選ぶ
 X_i を選ぶ確率
 - A. 等しい
 - B. 一つ前の時刻の X に依存
2. 過去の点を参照して次の点 x を選ぶ
参照する点
 - A. なし (case 1)
 - B. 一つの点
 - a. 時刻0における点 (case 2)
 - b. 一つ前の時刻の点 (case 3)
 - C. 二つの点
 - a. 時刻0における点 + 一つ前の時刻の点 (case 4)
 - b. 二つ前の時刻までの点 (case 5)




解析結果

それぞれの場合について、そのシミュレーション・解析の概要を示す



条件:

- 閾値 r で定められる領域内に入った点すべてにエッジを張る



結果:

- 時刻 k に点が選ばれたとき、領域に入る点の個数は二項分布 $B(k, p(r) = -r^2 + 2r)$ に従う
- 二項分布の期待値が $E(X) = kp$ で表せることから、 k 番目の点の次数の期待値は $(-r^2 + 2r)k$
- X の区別はできない
⇒ システムサイズ N との関係は考えられない



1-A. X_i を選ぶ確率が等しく、 $x \in [0, 1]$ として一様な確率で x を選ぶ場合

1. X_i を選び、次に点 $(x \in [0, 1])$ を一様を選ぶ
 X_i を選ぶ確率
 - A. 等しい
 - B. 一つ前の時刻の X に依存



1-B. X_i を選ぶ確率が異なり、 $x \in [0, 1]$ として一様な確率で x を選ぶ場合

1. X_i を選び、次に点 $(x \in [0, 1])$ を一様を選ぶ
 X_i を選ぶ確率
 - A. 等しい
 - B. 一つ前の時刻の X に依存



- x の選び方は同じ
⇒ 選ばれた点 x によるネットワークは全く同一の性質
シミュレーションの1例を示す($r = 1/3$)。



12




図2.時刻 k までの次数の総和 L

$$L = \frac{1}{2} (-r^2 + 2r) k^2 \quad (\text{理論値})$$



14



2. 過去の点を参照して次の点 x が選ばれる

- X_i を選び、次に点 $(x \in [0, 1])$ を一樣に選ぶ
- 過去の点を参照して次の点 x を選ぶ
参照する点
 - なし (case 1)
 - 一つの点
 - 時刻0における点 (case 2)
 - 一つ前の時刻の点 (case 3)
 - 二つの点
 - 時刻0における点 + 一つ前の時刻の点 (case 4)
 - 二つ前の時刻までの点 (case 5)



16




図1.時刻 k とそととき選ばれた点の次数 l との間の関係

- 緑の曲線: 1-Aで確率を用いて求めた関係式

$$l = (-r^2 + 2r) k$$
 ⇒ 一致



13



- X_i を選ぶ確率は、一つ前の X のみに依存する
⇒ マルコフ連鎖(説明は割愛)




15



- x は $\Omega = [0, 1] \times [0, 1]$ に一樣に分布
- X_i はそれぞれ S 個の点をもつ
- X_i ごとに、参照点から最も近い点を1つ選ぶ
- 選ばれた点の参照点からの近さの順に X を整理する
- X_i の順番に従い、確率 P_i でそれぞれ点 x が選ばれる
- 点 x が選ばれなかったとき(確率 $1 - P_i$)は、次の X_j について同様の操作を行う
- すべての X から点 x が選ばれなかったとき、時刻を1進めて同じ操作を繰り返す



17



19

2-A. 過去に依らず点が選ばれる場合



- X_i が、 X の配列の中で $r+1$ ($r = 1, 2, \dots, n-1$) 番目に選ばれたとき
自分まで順番が回ってくる確率は

$$p_{r+1}(i) = \frac{\sum_{J=\langle j_0, \dots, j_{r-1} \rangle_r} \prod_{j \in J} (1 - P_j)}{n-1 C_r}.$$

$J = \langle j_0, j_1, \dots, j_{r-1} \rangle_r$ は、 i を除く $n-1$ 個の要素から r 個選んだときの組み合わせのうちの1組いをあらわす

- 1番目になるとき

$$p_1(i) = 1$$



20



2-B. 一つの点を参照する場合

- 点 x と点 y の間の近さの指標
⇒ a 次元ユークリッド距離

$$\begin{aligned} D(x, y) &= d(x, y) \\ &= \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_a - y_a)^2} \end{aligned}$$



22



- 過去の点を参照しない
⇒ X_i が r 番目となる確率は等しい
 - X_i から点が選ばれる確率の期待値
- $$p(i) = \frac{\sum_{r=1}^n p_r(i)}{n} P_i.$$
- ($S > K$ なら) 毎時刻ごとにこの確率で X_i から点が選ばれることと等価
⇒ 単純な確率過程に帰着



21



$K = 30, N = 6, S = 50, a = 2, p = 0.6$ のとき




図4. [case 2] x_0 のみを参照



23




図5. [case 3] 一つ前の点のみを参照



2-C. 二つの点を参照する場合

- 点 x から2点 y, z までの近さの指標

$$D(x, (y, z)) = \alpha d(x, y) + \beta d(x, z) \quad (\alpha, \beta > 0)$$



$K = 30, N = 6, S = 50, a = 2, p = 0.6,$
 $\alpha = 2.5, \beta = 1$ のとき




図6. [case 4] x_0 一つ前の点を参照



結果




図8. X の数 N に対する1ステップあたりの移動距離の平均値

- $N \rightarrow$ 大
 \Rightarrow 点 x の密度 \rightarrow 大
 \Rightarrow 1ステップあたりの移動距離 \rightarrow 小



図7. [case 5] 二つ前までの点を参照





図9. 選択確率 p に対する各ステップ間角度 θ (rad)の平均値

- $p \rightarrow$ 大
 \Rightarrow ステップ間の角度は小さくなる
 \bullet case5は、戻りの効果によって角度は大きくなる





まとめ

- いくつかのモデルからシステムサイズ N と系の特徴量の間の関係を見た
- 系のサイズによって状態が変化するモデルの条件を考察した



30



参考文献

- Geoffrey West, James Brown, Brian Enquist, [A General Model for the Origin of Allometric Scaling Laws in Biology](#), *Science*, Vol.276, No.5309, pp.122-126, 1997.
- C. R. White, P. Cassey, T. M. Blackburn, Allometric exponents do not support a universal metabolic allometry, *Ecology*, **88**(2), 315-323 (2007).
- T. Kolokotronis, V. Savage, E. J. Deeds, W. Fontana, Curvature in metabolic scaling, *Nature* **464**, 753-756 (2010)
- J. Kozlowski, J. Weiner, Interspecific allometries are by-products of body size optimization, *The American Naturalist*, **149**(2) (1997).
- G. B. West, J. H. Brown, Life's universal scaling laws, *Physics Today*, **57**, 36-49 (2004).
- H. A. Feldman, T. A. McMahon, The $\frac{3}{4}$ mass exponent for energy metabolism is not a statistical artifact, *Respiration Physiology*, **52**, 149-163, (1983).



32



展望と課題

- 考えているような系の他の条件とは？
- より検証しやすい系のデータを実際に解析
- さらにどのように一般化されるか



31



- G. B. West, J. H. Brown, The origin of allometric scaling laws in biology from genomes to ecosystems towards a quantitative unifying theory of biological structure and organization, *The Journal of Experimental Biology*, **208**, 1575-1592 (2005).
- V. M. Savage, J. F. Gilloly, W. H. Woodruff, G. B. West, A. P. Allen, B. J. Enquist, J. H. Erown, The predominance of quarter-power scaling in biology, *Functional Ecology*, **18**, 257-282 (2004).
- 本川 達雄, 「ホヤー群体形成と自己組織化」, 『自己組織化ハンドブック』, 330 - 331, 2009.
- 石川 正純・足立 にれか・岡本 浩一, 会議分析のための数値シミュレーション技法・組織内集団に見られる意思決定モデルの開発, 社会技術研究論文集, 2004.
- 城 綾実・細馬 宏通, 多人数会話における自発的ジェスチャーの同期, *Cognitive Studies*, **16**(1), 103-119, 2009.



33



- 藤本 学・大坊 郁夫, 小集団の会話の展開に及ぼす会話者の発話行動傾向の影響, *The Japanese Journal of Experimental Social Psychology*, **47**(1), 51-60, 2007.
- 高良 美樹, 集団討議の参加者の人数が集団決定および個人決定に及ぼす影響について, *人間科学*, **1**, 67-84, 1998.
- 山本浩・森隆一・藤曲哲郎, シミュレーションによる確率論, 日本評論社, 137-143, 1993.



34