

Diskrete Strukturen II

Aufgabe 1. Was trifft zu? (7 Punkte)

Entscheiden Sie, welche der folgenden Aussagen zutreffen. Begründen Sie Ihre Antwort indem Sie gegebenenfalls rechnen, die Vorlesung bzw. das Buch zitieren oder Gegenbeispiele angeben.

- (a) Für $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ und $a > 0$ gilt $aX \sim \text{Exp}(\frac{\lambda}{a})$.
- (b) Für alle Zufallsvariablen X_1, \dots, X_n gilt $\mathbb{E}[X_1 \cdot \dots \cdot X_n] = \mathbb{E}[X_1] \cdot \dots \cdot \mathbb{E}[X_n]$.
- (c) Die Markov-Kette mit nebenstehendem Übergangsdiagramm
 - (1) ist aperiodisch.
 - (2) ist irreduzibel.
 - (3) hat eine eindeutige stationäre Verteilung.



- (d) Wenn eine Markov-Kette ergodisch ist, hat sie eine eindeutige stationäre Verteilung.
- (e) Wenn eine Markov-Kette eine eindeutige stationäre Verteilung hat, ist sie ergodisch.

Aufgabe 2. Zufallsgraph (6 Punkte)

Sei G ein ungerichteter einfacher Graph auf der Knotenmenge $V = \{1, 2, \dots, n\}$, wobei für jede der $\binom{n}{2}$ möglichen Kanten unabhängig mit Wahrscheinlichkeit p entschieden wird, ob sie in G existiert oder nicht. Die Anzahl der Kanten, die mit einem Knoten inzidieren, heißt der *Grad* des Knotens. Für $i \in V$ bezeichne D_i den Grad des Knotens i und $D = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n D_i$ sei der *Durchschnittsgrad* von G .

- (a) Berechnen Sie $\mathbb{E}[D_i]$ für alle $i \in V$ und $\mathbb{E}[D]$.
- (b) Zeigen Sie
 - (1) $\Pr[D_i \leq \frac{1}{2}\mathbb{E}[D_i]] \leq e^{-\frac{\mathbb{E}[D_i]}{8}}$ für alle $i \in V$ und
 - (2) $\Pr[\min\{D_i : i \in V\} \leq \frac{1}{2}\mathbb{E}[D]] \leq ne^{-\frac{\mathbb{E}[D]}{8}}$.


Aufgabe 3. Glühbirnen (6 Punkte)

Für n Glühbirnen ergab sich aus Dauertests eine durchschnittliche Lebensdauer von 98 Tagen. Es wird angenommen, dass die Lebensdauern der Glühbirnen unabhängig, identisch geometrisch verteilt sind mit unbekannter Wahrscheinlichkeit p . Schätzen Sie p mit der Maximum Likelihood Methode, indem Sie die Likelihood-Funktion aufstellen und damit den ML-Schätzwert für p durch ausführliche Rechnung bestimmen.

Bitte wenden!

Aufgabe 4. Nachtwächter (8 Punkte)

Ein Nachtwächter bewegt sich in nebenstehendem Museum mit den drei Räumen A , B und C . Bei jedem Raumwechsel wählt er einen Durchgang unabhängig von früheren Entscheidungen gleichverteilt aus. Die Zufallsvariable X_n beschreibe den Raum, in dem sich der Wächter nach dem n -ten Wechsel befindet.



- (a) Bestimmen Sie Zustandsraum, Übergangsmatrix und Übergangsgraph der Markov-Kette $\{X_n\}_{n \geq 0}$.
- (b) Begründen Sie detailliert, warum diese Markov-Kette ergodisch ist.
- (c) Berechnen Sie die stationäre Verteilung.


Aufgabe 5. Verkaufsabschlüsse (7 Punkte)

Ein Verkäufer war bei 900 Gesprächen 108 mal erfolgreich. Kann er aufgrund dieses Ergebnisses die Nullhypothese „Höchstens 10% meiner Gespräche führen zu einem Erfolg“ auf dem 2,5% Signifikanzniveau verwerfen? Begründen Sie Ihre Antwort mit Hilfe eines geeigneten statistischen Tests. Sie können dabei annehmen, dass der Grenzwertsatz von DeMoivre eine brauchbare Näherung liefert.

Quantil der Standardnormalverteilung: $z_{0,975} = 1,9600$

Aufgabe 6. Spam Verteilung (6 Punkte)

Die Anzahl E der Emails, die man an einem Tag erhält, sei Poisson-verteilt mit Parameter λ . Eine Email ist mit Wahrscheinlichkeit p Spam und mit Wahrscheinlichkeit $q = 1 - p$ regulär. Zeigen Sie, dass die Anzahl S der Spam Emails Poisson-verteilt ist mit Parameter $p\lambda$.



Viel Erfolg!