

748 대수적 중복도와 기하적 중복도 (2) (Algebraic multiplicity and geometric multiplicity (2))

Thm $A : m \times m$ 행렬.

고유값 λ 의 대수적 중복도를 a

기하적 중복도를 g 라고 하면

항상 $a \geq g$ 이다.

$$(A - \lambda I)x = 0$$

pf) $g = \dim(S) \quad S = \{x \in \mathbb{R}^m \mid Ax = \lambda x\}$

$$B = \{x_1, x_2, \dots, x_g\}$$

$$g \leq m$$

$$S \subseteq \mathbb{R}^m$$

$$\hookrightarrow E = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$$

$$T = [x_1 \ x_2 \ \dots \ x_g \mid y_1 \ \dots \ y_{m-g}] = [X \mid Y]$$

$$AT = [A]_{1 \times 1} [x_1 \ x_2 \ \dots \ x_g \mid y_1 \ \dots \ y_{m-g}]_{1 \times m}$$

$$= [Ax_1 \ Ax_2 \ \dots \ Ax_g \mid Ay_1 \ Ay_2 \ \dots \ Ay_{m-g}]$$

$$= [\lambda x_1 \ \lambda x_2 \ \dots \ \lambda x_m \mid Ay_1 \ Ay_2 \ \dots \ Ay_{m-g}]$$

$$= [\lambda X \mid AY] = [X \mid Y] \begin{bmatrix} \lambda I & Q \\ 0 & S \end{bmatrix} = T \begin{bmatrix} \lambda I & Q \\ 0 & S \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} g \times g & g \times (m-g) \\ (m-g) \times g & (m-g) \times (m-g) \end{matrix}$$

$$[x_1 \ \dots \ x_g] = X, [y_1 \ \dots \ y_{m-g}] = Y$$

$$XP + YR = \lambda X, \quad XQ + YS = AY$$

$$AT = T \cdot \lambda I = \lambda X \quad A = T \cdot \lambda I \cdot T^{-1}$$

$$[x_1 \ x_2 \ \dots \ x_g]Q + [y_1 \ \dots \ y_{m-g}]S = A[y_1 \ \dots \ y_{m-g}]$$

$$\hookrightarrow [Q_1 \ Q_2 \ \dots \ Q_{m-g}]$$

$$\hookrightarrow [S_1 \ S_2 \ \dots \ S_{m-g}]$$

$$f(x) = Ax$$

$$\mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$$

$$\begin{aligned} xQ_1 + yS_1 &= Ay_1 = f(y_1) \\ xQ_2 + yS_2 &= Ay_2 = f(y_2) \\ &\vdots \\ xQ_{m-g} + yS_{m-g} &= Ay_{m-g} = f(y_{m-g}) \end{aligned}$$

$$AT = T \begin{bmatrix} \lambda I & Q \\ 0 & S \end{bmatrix}$$

$$= [X \ Y] \begin{bmatrix} \lambda I & Q \\ 0 & S \end{bmatrix}$$

$$A = T \begin{bmatrix} \lambda I & Q \\ 0 & S \end{bmatrix} T^{-1}$$

① det
② tr
③ 고유값 \rightarrow 특성방정식

$$\det(cI - A) = \det(cI - \begin{bmatrix} \lambda I & Q \\ 0 & S \end{bmatrix}) = \det(cI - \lambda I)$$

$$= \det \left(\begin{bmatrix} (c-\lambda)I & -Q \\ 0 & cI - S \end{bmatrix} \right) = (c-\lambda)^m$$

$$= \det((c-\lambda)I) \det(cI - S)$$

$$= (c-\lambda)^g \det(cI - S)$$

$$a \geq g.$$

