



Assignment - Vector-4

Surajit Sarkar

CONTENTS

I	Problem	1
II	Solution	1
III	Code Link	1
IV	Figure	1

using section formula

Let the ratio be k:1

$$\mathbf{n}^\top \mathbf{P} = c \quad (2)$$

$$\Rightarrow \mathbf{n}^\top \left(\frac{k\mathbf{B} + \mathbf{A}}{k+1} \right) = c \quad (3)$$

$$\Rightarrow \mathbf{n}^\top (k\mathbf{B} + \mathbf{A}) = c(k+1) \quad (4)$$

$$\Rightarrow \mathbf{n}^\top k\mathbf{B} + \mathbf{n}^\top \mathbf{A} = c(k+1) \quad (5)$$

$$\Rightarrow k\mathbf{n}^\top \mathbf{B} + \mathbf{n}^\top \mathbf{A} = c(k+1) \quad (6)$$

$$\Rightarrow k\mathbf{n}^\top \mathbf{B} - ck = -\mathbf{n}^\top \mathbf{A} + c \quad (7)$$

$$\Rightarrow k(\mathbf{n}^\top \mathbf{B} - c) = c - \mathbf{n}^\top \mathbf{A} \quad (8)$$

$$\Rightarrow k = \frac{c - \mathbf{n}^\top \mathbf{A}}{\mathbf{n}^\top \mathbf{B} - c} \quad (9)$$

$$\Rightarrow k = \frac{4 - 2}{13 - 4} \quad (10)$$

$$\Rightarrow k = \frac{2}{9} \quad (11)$$

I. PROBLEM

Determine the ratio in which the line $2x+y-4=0$ divides the line segment joining the points A(2,-2) and B(3,7).

III. CODE LINK

<https://github.com/sssrajit/fwc/blob/main/vector/vector-4/codes/vector.py>

Execute the code by using the command
python3 vector.py

II. SOLUTION

Symbol	Value
A	$\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$
B	$\begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$
c	4
P	$\frac{k\mathbf{B} + \mathbf{A}}{k+1}$
n	$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

TABLE I: Parameters

Given equation

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}^\top \mathbf{x} - 4 = 0 \quad (1)$$

IV. FIGURE




Fig. 1