



ÉTOUFFEMENT

Adulte conscient

Ne peut plus parler, tousser ni respirer : agir

1

**Jusqu'à 5 claques
entre les omoplates**



- 1 Placer la victime penchée en avant.
- 2 Soutenir son thorax d'une main.
- 3 Donner jusqu'à 5 claques avec le talon de la main entre les omoplates.

2

**Si échec : jusqu'à 5
compressions abdominales**



- 1 Se placer derrière la victime.
- 2 Placer un poing au-dessus du nombril, sous le sternum.
- 3 Recouvrir le poing avec l'autre main.
- 4 Réaliser jusqu'à 5 compressions abdominales vers l'intérieur puis vers le haut.



Alterner. Arrêter dès que la respiration reprend.



Toux efficace :
encourager à tousser,
sans claques.



- La victime peut parler, tousser et respirer.
- Laisser la toux se poursuivre.

Ne pas réaliser de claques
ni de compressions.



**Femme enceinte ou
abdomen impossible
à entourer :**
compressions thoraciques.



- Se placer derrière la victime.
- Placer les mains au milieu du thorax, sur la partie inférieure du sternum.
- Réaliser jusqu'à 5 compressions thoraciques vers l'intérieur puis vers le haut.



Perte de connaissance :
accompagner au sol,
alerer et commencer la RCP.



- Accompagner la victime au sol en la protégeant.
- Alerer immédiatement les secours (15 / 112).
- Commencer la RCP (compressions thoraciques).



Alerter
15 / 112



Commencer
la RCP