

심층학습 5장. 기계 학습의 기초 (5.3장~)

5.3 초매개변수와 검증 집합

- **초매개변수 (hyperparameter)**

- 알고리즘의 행동을 제어하는데 사용
- 초매개변수들의 값을 학습 알고리즘 자체가 적응시키지는 않음
 - 단, 한 학습 알고리즘이 다른 학습 알고리즘의 최상의 초매개변수 값들을 배우는 방식은 가능
- 학습 알고리즘이 학습하지 않는 설정 중 최적화하기 어려운 설정을 초매개변수로 두는 경우도 있음
- 더 자주 쓰이는 접근 방식은, 훈련 집합으로 학습하기에 적합하지 않은 설정을 초매개변수로 두는 것임

- **만일 초매개변수를 훈련 집합을 통해 학습한다면 과대적합이 일어남**

- 이를 해결하기 위해 훈련 알고리즘이 관측하지 않은 견본들로 이루어진 검증 집합이 필요
- 검증 집합은 초매개변수를 선택할때 쓰임
- 일반적으로 훈련 자료의 약 80%를 훈련에, 나머지 20%를 검증에 사용함

- **교차검증**

- 자료 집합을 하나의 고정된 훈련집합과 하나의 고정된 시험집합으로 나눌 경우, 시험집합이 너무 작으면 문제가 될 수 있음 → 시험 집합이 작다는 것은 추정된 평균 시험 오차에 대한 통계적 불확실성이 존재한다는 의미
- 그렇기 때문에 교차검증이 필요함

- **k 중 교차 검증 (k -fold cross-validation)**

- 자료 집합을 k 개의 서로 겹치지 않는 부분집합들로 나눔
- k 회의 시행으로 얻은 수치들로 평균 시험 오차를 구함
- 시행 i 에서는 자료의 i 번째 부분집합을 시험 집합으로 사용하고, 나머지는 훈련 집합을 사용함

5.4 추정량, 편향, 분산

- 점 추정

- 어떤 수량에 대한 최고의 예측 하나를 제공하는 것을 목표로 함
- 집합 $\{x^{(1)}, \dots, x^{(m)}\}$ 이 독립적이고 동일하게 분포된 m 개의 자료점으로 이루어진 집합일 때, 이 자료집합의 점 추정량 또는 통계량을 아래 식으로 정의할 수 있음

$$\hat{\theta}_m = g(\mathbf{x}^{(1)}, \dots, \mathbf{x}^{(m)}). \quad (5.19)$$

- g 가 반드시 θ 의 참값에 가까운 하나의 값을 돌려주는 함수이어야 하는 것은 아님
- g 의 치역이 θ 가 가질 수 있는 값들의 집합과 반드시 같아야 하는 것도 아님
- 좋은 추정량은 훈련 자료를 생성한 바탕 θ 의 참값에 가까운 값을 산출
- 빈도주의자의 관점에서
 - θ 의 참값이 고정되어 있지만 알려지지 않는
 - 점 추정량 $\hat{\theta}$ 는 하나의 확률변수임
 - 입력과 목표 변수의 관계를 추정하는 것도 점 추정 또는 함수 추정이라고 부름
 - 함수 추정: 주어진 입력 벡터 \mathbf{x} 에 기초해서 변수 y 의 값을 예측하는 것

5.4 추정량, 편향, 분산

- 편향

- 추정량의 편향(bias)은 식 5.20과 같이 정의됨

$$\text{bias}(\hat{\theta}_m) = \mathbb{E}(\hat{\theta}_m) - \theta, \quad (5.20)$$

- 기댓값 \mathbb{E} : 자료 전체에 대한 평균
- θ : 자료 생성 분포를 정의하는데 쓰인 θ 의 참 값
- 불편추정량
 - 편향이 전혀 없을 때의 추정량
 - 즉, $\text{bias}(\hat{\theta}_m) = 0$ ($\mathbb{E}(\hat{\theta}_m) = \mathbb{E}(\theta_m) = 0$)
- 점근 불편추정량
 - $\lim_{m \rightarrow \infty} \text{bias}(\hat{\theta}_m) = 0$ ($\lim_{m \rightarrow \infty} \mathbb{E}(\hat{\theta}_m) = 0$) 인 추정량

5.4 추정량, 편향, 분산

- 예제: 베르누이 분포

$$\text{bias}(\hat{\theta}_m) = \mathbb{E}(\hat{\theta}_m) - \theta, \quad (5.20)$$

$$P(x^{(i)}; \theta) = \theta^{x^{(i)}} (1 - \theta)^{(1 - x^{(i)})}. \quad (5.21)$$

$$\hat{\theta}_m = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m x^{(i)}. \quad (5.22)$$

5.4 추정량, 편향, 분산

- 예제: 베르누이 분포

$$\text{bias}(\hat{\theta}_m) = \mathbb{E}[\hat{\theta}_m] - \theta \quad (5.23)$$

$$= \mathbb{E} \left[\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m x^{(i)} \right] - \theta \quad (5.24)$$

$$= \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \mathbb{E}[x^{(i)}] - \theta \quad (5.25)$$

$$= \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \sum_{x^{(i)}=0}^1 (x^{(i)} \theta^{x^{(i)}} (1-\theta)^{(1-x^{(i)})}) - \theta \quad (5.26)$$

$$= \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (\theta) - \theta \quad (5.27)$$

$$= \theta - \theta = 0. \quad (5.28)$$

- $\text{bias}(\theta^\wedge) = 0$ 이므로 추정량 θ^\wedge 는 편향되지 않았음

5.4 추정량, 편향, 분산

- 예제: 가우스 분포의 평균의 추정량

$$p(x^{(i)}; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{(x^{(i)} - \mu)^2}{\sigma^2}\right). \quad (5.29)$$

$$\hat{\mu}_m = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m x^{(i)}. \quad (5.30)$$

$$\text{bias}(\hat{\mu}_m) = \mathbb{E}[\hat{\mu}_m] - \mu \quad (5.31)$$

$$= \mathbb{E}\left[\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m x^{(i)}\right] - \mu \quad (5.32)$$

$$= \left(\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \mathbb{E}[x^{(i)}]\right) - \mu \quad (5.33)$$

$$= \left(\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \mu\right) - \mu \quad (5.34)$$

$$= \mu - \mu = 0. \quad (5.35)$$

5.4 추정량, 편향, 분산

- 예제: 가우스 분포의 분산의 추정량

$$\hat{\sigma}_m^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (x^{(i)} - \hat{\mu}_m)^2. \quad (5.36)$$

$$\text{bias}(\hat{\sigma}_m^2) = \mathbb{E}[\hat{\sigma}_m^2] - \sigma^2. \quad (5.37)$$

$$\mathbb{E}[\hat{\sigma}_m^2] = \mathbb{E}\left[\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (x^{(i)} - \hat{\mu}_m)^2\right] \quad (5.38)$$

$$= \frac{m-1}{m} \sigma^2. \quad (5.39)$$

$$\tilde{\sigma}_m^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (x^{(i)} - \hat{\mu}_m)^2. \quad (5.40)$$

$$\mathbb{E}[\tilde{\sigma}_m^2] = \mathbb{E}\left[\frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (x^{(i)} - \hat{\mu}_m)^2\right] \quad (5.41)$$

$$= \frac{m}{m-1} \mathbb{E}[\hat{\sigma}_m^2] \quad (5.42)$$

$$= \frac{m}{m-1} \left(\frac{m-1}{m} \sigma^2 \right) \quad (5.43)$$

$$= \sigma^2. \quad (5.44)$$

5.4 추정량, 편향, 분산

- 분산과 표준오차
 - 추정량의 분산
 - 훈련 집합이 확률변수일 때의 분산

$$\text{Var}(\hat{\theta}) \quad (5.45)$$

- 추정량의 표준오차
 - 분산의 제곱근 $SE(\hat{\theta})$
- 평균의 표준오차

$$SE(\hat{\mu}_m) = \sqrt{\text{Var}\left[\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m x^{(i)}\right]} = \frac{\sigma}{\sqrt{m}}. \quad (5.46)$$

- 표본이 충분히 클 때, 평균의 분포가 정규분포와 거의 같아진다는 중심극한정리에 근거하여, 기댓값의 참값이 임의의 선택된 구간에 속할 확률을 표준오차를 이용해 계산할 수 있음
 - Ex. 평균이 $\hat{\mu}_m$ 이고, 분산이 $SE(\hat{\mu}_m)^2$ 인 정규분포에서 평균을 포함하는 95% 신뢰구간은 식 5.47처럼 나타낼 수 있음

$$(\hat{\mu}_m - 1.96SE(\hat{\mu}_m), \hat{\mu}_m + 1.96SE(\hat{\mu}_m)). \quad (5.47)$$

- 알고리즘 A의 오차에 대한 95% 신뢰구간의 상계가 알고리즘 B의 오차에 대한 95% 신뢰구간의 한계보다 작다면 알고리즘 A가 알고리즘 B보다 낫다는 분석을 얻을 수 있음

5.4 추정량, 편향, 분산

- 예제: 베르누이 분포

$$\text{Var}(\hat{\theta}_m) = \text{Var}\left(\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m x^{(i)}\right) \quad (5.48)$$

$$= \frac{1}{m^2} \sum_{i=1}^m \text{Var}(x^{(i)}) \quad (5.49)$$

$$= \frac{1}{m^2} \sum_{i=1}^m \theta(1 - \theta) \quad (5.50)$$

$$= \frac{1}{m^2} m \theta(1 - \theta) \quad (5.51)$$

$$= \frac{1}{m} \theta(1 - \theta). \quad (5.52)$$

5.4 추정량, 편향, 분산

- 평균제곱오차의 최소화를 위한 편향과 분산의 절충

- 편향: 함수나 매개변수의 기댓값과 참값의 편차를 측정
- 분산: 자료의 임의의 표본에서 기대할 수 있는 기대 추정값과 특정 표본에 대한 추정값의 편차를 측정


- 편향과 분산을 저울질 할 때 (편향이 큰 추정량과 분산이 큰 추정량이 있을 때 등) 흔히 쓰이는 방법

- 교차검증 적용
- 평균제곱오차(MSE)를 비교해서 선택
 - MSE: 매개변수 θ 의 추정량과 참값 사이의 전반적인 기대 편차
 - MSE가 더 작은 추정량을 선택한다는 것은 편향과 분산 둘 다 모두 작은 값을 유지되는 추정량을 선택한다는 것

- 일반화 오차를 MSE로 측정하는 경우

$$\text{MSE} = \mathbb{E}[(\hat{\theta}_m - \theta)^2] \quad (5.53)$$

$$= \text{Bias}(\hat{\theta}_m)^2 + \text{Var}(\hat{\theta}_m). \quad (5.54)$$



- 수용력 증가: 분산 증가, 편향 감소

5.4 추정량, 편향, 분산

- 일치성

- 자료 집합에 있는 자료점들의 개수 m 이 증가함에 따라 점 추정값이 해당 매개변수들의 참값에 수렴하는 성질을 공식으로 표현하면 식 5.55

$$\text{plim}_{m \rightarrow \infty} \hat{\theta}_m = \theta. \quad (5.55)$$

- 식 5.55의 조건을 일치성 조건이라 부름
 - 식 5.55의 조건: 임의의 $\epsilon > 0$ 에 대해, $m \rightarrow \infty$ 에 따라 $P(|\hat{\theta}_m - \theta| > \epsilon) \rightarrow 0$
 - 식 5.55의 조건을 약한 일치성
 - $\hat{\theta}$ 가 θ 에 거의 확실하게 수렴하는 것을 강한 일치성
- 일치성 조건을 만족하는 추정량의 경우, 자료 건본들의 수가 늘어남에 따라 추정량에 의한 편향은 반드시 줄어들지만, 그 역은 성립하지 않음

Thank You

감사합니다.