2.2 Μέθοδος Αντιστρόφου Πίνακα

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

 $a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$
:

Έστω το γραμμικό σύστημα:

 $a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n = b_m$

Ορίζουμε:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \qquad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix},$$

πίνακας του συστήματος

Τότε το σύστημα γράφεται ισοδύναμα στην μορφή

$$Ax = b$$

 Σ . Δημόπουλος MA Σ 029 1 / 5

Αν ο A είναι τετραγωνικός αντιστρέψιμος πίνακας, τότε:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} \Rightarrow$$

$$A^{-1}A\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} \Rightarrow$$

$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$$

Θεώρημα (Μέθοδος Αντιστρόφου Πίνακα)

Αν ο Α είναι αντιστρέψιμος τετραγωνικός πίνακας τότε το γραμμικό σύστημα $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ έχει μοναδική λύση $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$.

Παράδειγμα

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 5$$

Να λυθεί το γραμμικό σύστημα:
$$2x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 3$$

$$x_1 + 8x_3 = 17$$

Σ. Δημόπουλος ΜΑΣ029 3 / 5

Θεώρημα (Θεώρημα Αντιστρόφου Πίνακα)

Τα παρακάτω είναι ισοδύναμα για έναν η × η τετραγωνικό πίνακα Α.

- (Ι) Ο Α είναι αντιστρέψιμος.
- (II) Η ανηγμένη κλιμακωτή μορφή του A είναι ο I_n .
- (ΙΙΙ) Ο Α γράφεται σαν γινόμενο στοιχειωδών πινάκων.
- (IV) Το ομογενές γραμμικό σύστημα $A\mathbf{x} = \mathbb{O}$ έχει μοναδική λύση (την τετριμμένη).
- (V) Το γραμμικό σύστημα $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ έχει μοναδική λύση για κάθε $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ (την $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$).

Σ. Δημόπουλος ΜΑΣ029 4 / Ι

Θεώρημα (Πλήθος λύσεων γραμμικών συστημάτων)

Κάθε γραμμικό σύστημα έχει καμία, ακριβώς μία ή άπειρες λύσεις.

Απόδειξη:

Σ. Δημόπουλος ΜΑΣ029 5 / 5